X Folio - O [mithologia]

HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY
OF THE
MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY
68.581
GIFT OF
Heirs of Henry Bryant
July 30, 1927

JUL 30 1927

STORIA
DEGLI
UCCELLI

ORNITHOLOGIA

STORIA NATURALE
DEGLI UCCELLI

TRATTATA CON METODO

E ADORNATA

DI FIGURE INTAGLIATE IN RAME

E MINIATE AL NATURALE

TOMO SECONDO.

ALL' ALTEZZA REALE DELLA SERENISSIMA

MARIA LUISA

INFANTA DI SPAGNA

ARCIDUCHESSSA D' AUSTRIA

GRADUCHESSA DI TOSCANA

ec. ec. ec.

IN FIRENZE l' ANNO MDCCLXIX.

NELLA STAMPERIA MOUCKIANA.

Con licenza de' Superiori.

ORNITHOLOGIA

METHODICE DIGESTA

ATQUE

ICONIBUS AENEIS

AD VIVUM ILLUMINATIS ORNATA

TOMUS SECUNDUS.

AD REGIAM CELSITUDINEM SERENISSIMAE

MARIAE ALOISIAE

HISPANIAE INFANTIS

ARCHIDUCIS AUSTRIAE

MAGNAE ETRURIAE DUCIS

ec. ec. ec.

FLORENTIAE ANNO MDCCLXIX.

IN AEDIBUS MOUCKIANIS.

Cum facultate Praesidum.

LIBRARY
COMP. ZOOLOGY
CAMBRIDGE, MASS.

LIBRARY
MUS. COMP. ZOOLOGY.
CAMBRIDGE, MASS.



ALTEZZA REALE

L fregio nobiliſſimo, che l' Altezza Vostra Reale aggiunge a queſta noſtra Opera, accordandole l' onore della ſua Sovrana Protezione, ſarà una gran congettura in noſtro favore per quei tempi remotiſſimi, ne' quali reſo celebre il Voſtro Nome diverrà l' epoca più glorioſa per la Toſcana, e per l' Italia. Si rammenterà con ſtupore la felicità di queſto ſuolo nella guiſa iſteſſa, che di pochi altri ſi rammenta in tutti gli Annali dell' uman genere, e ſi dirà come due Anime eccelſe lungamente de-

ſide-

ſiderate, e per iſpecial privilegio dalla Provvidenza accordate a' voti comuni della Toſcana, s' unirono già in una nobile emulazione, dando alle Arti, alle Lettere, alle Scienze, e ad ogni maniera di bene operare, eſempio, eccitamento, e favore. E' già ſtato frequenti volte ripetuto in lode di tutti coloro; che nel decorſo de' tempi furono per una quaſi ſpecial miſſione del Cielo deſtinati a dover fare la delizia di queſto, o di quel Popolo, che con queſto metodo principalmente giunſero a coltivar quelle Provincie, e quei Regni, che divennero poſcia nelle noſtre memorie i modelli dell' univerſale imitazione. Ma più di rado ſi ſollevarono a tanta celebrità di geſta, e di nome l' Eroine dell' antichità. Cammilla Regina de' Volſci, Zenobia de' Palmireni, Semiramide degli Aſſiri, Tamiri degli Sciti, e tante altre, non divennero invitte, virtuoſe, e famoſe, che a fronte unicamente di temute diſgrazie, e di potenti nemici, che la loro felicità, ed i loro Regni minacciavano. Ma l' ALTEZZA VOSTRA REALE collocata in un poſto ſuperiore ad ogni tentazione di orgoglio, e di vanità, tranquilla in ſeno della ſua Real Famiglia, non per altro dovrà dirſi, che ſi porga all' incoraggimento d' ogni lodevol opra, ed impreſa, che per grandezza d' animo, e d' intelletto. E chi potrà pertanto nell' univerſale ammirazione reſiſtere alle prime impreſſioni, che farà nella ſua opinione tutto ciò, che ſi veda di fatto, o di pubblicato ſotto i Voſtri veneratiſſimi auſpici, fregiato del Voſtro Nome, e dalla Voſtra ſpecial Clemenza favorito, e protetto? Queſta ferma fiducia ſoſtiene in gran parte il noſtro coraggio già capace di perderſi nella vaſtità, e difficoltà dell' impreſa, che abbiamo fra mano; e ci ſembra quaſi un' anticipata ricompenſa di quelle fatiche, che adopreremo per condurla ad onorevole fine, l' avere adeſſo queſta favorevole opportunità di proteſtarci profondamente inchinati appiè del Trono,

Di V. A. R.

Umiliſſimi Servi e Sudditi
Dott. SAVERIO MANETTI.
LORENZO LORENZI.
VIOLANTE VANNI.

BIBLIOTECA ORNITOLOGICA

O SIA

CATALOGO DI TUTTI GLI AUTORI

fino ad ora editi, che hanno trattato tanto in generale, che in particolare degli UCCELLI, o di cose ad essi in special modo attenenti; il qual Catalogo non solo serve a dar notizia degli stessi Autori, la maggior parte de' quali non sono citati in quest' Opera, se non abbreviati, ma ancora per dare intiera informazione delle Opere loro, e delle varie edizioni di esse.

BIBLIOTHECA ORNITHOLOGICA

SIVE

AUCTORUM OMNIUM CATALOGUS,

quorum Opera edita sunt, & qui de AVIBUS vel in genere, vel in specie, rebusque aliis ad Aves signanter spectantibus scripserunt; qui Catalogus non solum ad tradendam eorumdem pleniorem notitiam inserviet, cum plures, dum ipsorum mentio in hoc Opere facta est, contracta forma nominentur, verum etiam ad illorum operum ideam, normam, & editiones declarandas plurimum praestabit.

ACARETE. Rélation des Voyages dans la Rivière de la Plate, & de là par terre au Perou. = *Editionis normam, & tempus non indicamus, quia editionem non vidimus.*

ACUSSIA (*Charles d' Acussia*). La Fauconnerie, avec les portraits au naturel de touts les oiseaux. *Roven* 1644. *in* 8.

ACTA Bononiensia. V. Commentarios.

— Breslaviensia. *Breslaviae. Lingua Germanica conscripta in* 4.

— Dantiscana. *Dantisci. Lingua Germanica in* 4.

— Edemburgensia. *Edemburgi. Lingua Anglica in* 4.

— Eruditorum Lipsiensia. *Lipsiae in* 4. *Quorum Volumen primum prodiit* 1682.

— Hafniensia. *Hafniae in* 4.

— Harlemensia. *Harlemi. Lingua Belgica in* 8.

— Helvetica. *Basileae in* 4. *quorum volumen primum prodiit anno* 1751.

— Physico-Medica Academiae Caesareae Leopoldino-Carolinae, exhibentia Ephemerides. *Norimbergae in* 4. *cum fig.* = Ephemeridum Sinopsis a Kellnero exposita. V. Kellnerum.

— Nova eiusdem Academiae. *Ibidem cum fig.*

— Svetica. *Hamburgi. Lingua Svetica in* 8.

— Academiae Regiae Scientiarum Parisiensis. *Parisiis in* 4. = *Amstelodami in* 8. *Lingua Gallica titulo* Histoire de l' Académie Royale &c.

— Societatis Regiae Scientiarum Upsaliensis. *Holmiae in* 4. = *Regia haec Societas anno* 1720. *Acta sua edere incepit.*

— Societatis Regiae Scientiarum Berolinensis. *Berolini in* 4.

ADANSON. Histoire Naturelle du Sénégal. *Parisiis* 1757. *in* 4. *cum figuris.*

AELIANI (*Claudii*). De Natura Animalium Libri XVII. *Tiguri apud Gesneros fratres in fol.* 1556. *cum aliis* Aeliani *Graecis & Latinis Operibus. Alia extat editio in* 12. 1611. *ex interpretatione* Petri Rillii, & Conradi Gesneri. = *Genevae* 1616. *in* 12. = *Londini* 1744. *in* 4. *Tom.* 2. *cum animadversionibus* Conradi Gesneri, & Danielis Trilleri, *cura* Abrahami Gronovii.

AGNESII (*Io. Baptistae*). De Avibus, quae in Albutera palude prope Valentiam degunt Liber. *Extat in eius operibus Poeticis editis* 1545.

AITINGER (*Conradus*). *Casellis* 1654. 1681. *in* 4. *Lingua Belgica cum tabulis.*

ALBERTUS (*cognomento Magnus*) De Animalium proprietatibus *Lib. XXVII. in fol. Mantuae* 1479. *Editio rarissima litteris initialibus vario colore depictis. Venet.* 1519. *cum Friderici II. Imperatoris de Falconibus. Item:* De virtutibus Herbarum, Lapidum, & Animalium; cum Opusculo de Falconibus, Asturibus, & Accipitribus. *Lugduni* 1596. *in* 12. = Amstelodami 1648. *in* 8. *& alibi.*

ALBERTINUS (*Aegidius*). *Munchen in* 4. 1613. = *Agit Lingua Germanica de feris ac mansuetis Quadrupedibus nec non de Animalibus repentibus, Avibus, & Piscibus.*

ALBINI. The natural History of English Som Birds. *Londini* 1737. 1741. *in* 8. = *Icones continet maris, foeminae, & Ovi, necnon quorumdam addit historiam naturalem in primis canarinorum Passerum, quorum curam praescribit.*

ALBINUS (*Eleasar Pictor*). Natural History of Birds. *London* 1731. *Tom.* 2. = *Hoc est Naturalis Avium Historia, in qua* 101. *Aves coloribus illuminatae repraesentantur* = *Eiusdem Anglica alia extat editio in* 3. *Vol. Londini. Vol.* 1. *&* 2. 1738. *Vol.* 3. 1740 = *Eiusdem Naturalis Avium Historia tribus Tomis, ac* 306. *Tabulis depictis comprehensa, ex Anglico idiomate in Gallicum conversa cum notis Derhamii. Hagae comitum* 1750. *in* 4.

— *Eiusdem Naturalis Historia Avium Angliae, & praecipue cantu aestimatarum, cum illarum ovis. Anglice conscripta.* Londini 1737. in 8.

ALDROVANDI (*Ulysses*). Ornithologia, sive de Avium Historia Lib. XX. *Tomis tribus comprehensa in fol. Bononiae,*

noniae. Tomus primus 1599. *qui Libros XII. comprehendit: Tomus ſecundus Librum XIII. ad XVIII. incluſive. Tomus Tertius* 1603. *& binos ultimos Libros continet.* = *Editio altera prodiit Bononiae* 1634. *Tomi tres pariter iunctim prodiere Francofurti in folio, cum Tabulis ſimiliter ligneis* 1610.

Aldrovandus paulo poſt Bellonii, & Geſneri tempora, anno ſcilicet 1610. *de Avibus ſcripſit. Plura ab iis eximio cum iudicio collegit, plurimaſque novas ſpecies deſcripſit. Quae ad Avium Hiſtoriam ſpectantia habet hic Auctor, multa, aliorum teſtimonio, vel in Auctorum Libris relata, vel a relatoribus quibuſcumque tradita, parum de veritate ſollicitus, cumulavit, doctiſſimus vero nullam antiquitatis eruditionem circa ipſas ſiluit; Icona autem, quae Avium dedit, Geſnerianis aequiparanda ſunt.*

Alpini (*Proſperi*). Hiſtoria Aegypti naturalis *&c. Lugduni Batavorum* 1735. *in* 4. *Vol.* 2.

Analecta Tranſalpina. *Scil.* Epitome Commentariorum Regiae Scientiarum Academiae Sveciae pro annis 1739. 1752. *Venetiis* 1762. *Tom. II. in* 8. *cum Tabulis aeneis.* = *Nonnulla ad Hiſtoriam Avium pertinentia Svecico idiomate in ſupradictis Commentariis deſcripta, in Latinum verſa exponuntur.*

Anderson. Hiſtoire Naturelle de l' Islande, & de Groenlande, du Détroit de Davis, & d' autres Pays ſitués ſur le Nord, traduite de l' Allemand. *Pariſiis* 1750. *Vol.* 2. *in* 12.

Anonymus. Deſcription of three hundred Animals, vix. Beaſts, Birds, Fishes *&c. hoc eſt: Deſcriptio* 300. *Animalium, videlicet Quadrupedum, Avium, Piſcium &c. Londini* 1753. *in* 8. *cum figuris aeneis.*

— A Deſcription of a great variety of Animals *&c. Scil. Deſcriptio magnae varietatis animalium &c. Londini* 1753. *in* 8. *cum Tab. aeneis* 90.

— A new, and complete Dictionary of arts, and Sciences *&c. Scil. Lexicon novum Artium, & Scientiarum &c. Londini* 1754. *in* 2. *Vol. in* 8. *cum Tab.* 300. *aeneis. Quamplurima animalia in hoc opere deſcribuntur, & depinguntur.*

— Claſſes Avium ſecundum methodum Kleinianam, cum additamentis nonnullis Linnaeanis. *Pariſiis* 1754. *in* 8. *cum figuris. V. Bomare.*

— Memoire inſtructif ſur la maniere de raſſembler, de preparer, de conſerver, & d' envoyer les diverſes curioſités d' Hiſtoire naturelle &c. *a Paris* 1758. *& vend. a Lyon in* 8. *cum Tab. aenaeis. Capite primo methodum, qua Aves diverſis praeparationibus accommodari, ipſaſque tueri longius poſſint, docet, loquiturque de ipſarum ovis, atque nidis.*

— Syſteme naturel du Regne animal &c. ſuivant les méthodes de M. Klein, d' Artedi, & de M. Linnaeus. *Pariſiis* 1754. *Vol.* 2. *in* 8. *cum fig.*

Aquavivus (*Beliſarius*). De Aucupio per Accipitres. *Neapoli* 1519. *in* 8. = *Baſileae* 1578.

— *Eiuſdem.* De Venatione, & Aucupio Libri tres. *Neapolis* 1529. *in fol.*

Inſtruction pour elever, nourrir, & dreſſer toute ſorte de petits Oiſeaux *&c. à Paris* 1698. *in* 12. *second. edit.*

Aristotelis Stagiritae Hiſtoria Animalium. *Lugduni* 1590. *in fol. Textu Graeco-Latino ex Bibliotheca Iſaaci Caſauboni, cuius Librum de communi Animalium motione, nec non Librum alterum de Animalium inceſſu interpretatus eſt, eiſque paraphraſes adiecit Nicolaus Leonicenus. Quinque Libri de Generatione Animalium editi ibidem ſunt ex interpretatione Theodori Gazae. In primum huius operis Librum commentaria adiecit Guarinonius. In partes vero Animalium Scholia edidit Epheſius. Libri de Animalibus ſeorſim prodierunt Florentiae* 1520. *in fol. textu Graeco-Latino.*

— *Eiuſdem* Hiſtoria Animalium prodiit, *Pariſiis* 1533. *in fol. per Gazam.* = *Francofurti* 1587. *in* 4. *additis Theophraſti collectaneis de Animalibus; & Toloſae* 1619. *in fol. cum interpretatione, & notis Scaligeri textu Greco, & Latino.*

— *Eiuſdem.* Hiſtoria Animalium, *ſimplici textu Graeco, & Latino. Lutetiae Pariſiorum* 1619 *in fol. Vol.* 2.

— *Eiuſdem.* De partibus Animalium, eorumque cauſis *Lib.* 4. *Pariſiis* 1542. *in* 8. = *Ariſtotelis Operum aliae autem extant editiones, quas brevitatis gratia reticemus. Addere ſufficiat Ariſtotelem Ornithologiae fundamenta ieciſſe, Aves e vicinia, & remotioribus locis collectas deſcribendo, licet deſcriptiones, notaſque characteriſticas, quas dedit, minus completas tradidiſſet. Eiuſdem vero ſectatores ipſius ſcripta explicandi gloriam ambiendo maioris confuſionis Auctores fuerunt. Ariſtoteles Aves omnes a pedum, digitorumque configuratione, qui ſcilicet membrana liberi, vel intertexti ſunt, in duo tantum agmina diviſit, in terreſtres nempe, & aquaticas.*

Baerii (*Nicolaii*). Ornithophonia, ſeu harmonia melicarum Avium, iuxta naturas, virtutes, & proprietates carmine Latino-Germanico, praemiſſis earumdem Iconibus. *Bremae* 1702. *in* 4. = *Recitantur in hoc Libro laudes Luſciniae, Luteolae, Canariae, Alaudae, Carduelis, Linariae, Acanthidis, Fringillae, Merulae, & Rubicillae.*

Balbini (*Bohuslai Aloiſii*), Examen meliſſaeum, ideſt novarum Apicularum Colonia. *Viennae Auſtriae* 1670. *in* 12.

— Miſcellanea Hiſtorica Regni Bohemiae in quibus natura Bohemicae telluris *&c. explicantur. Pragae* 1680. *in fol.* = *Inter naturalia Avis vulgo* Zlatohlauvel, *Latinis* Huricapitella *deſcribitur, Avis Regulo minor dicitur, capite luteis pennis ornato.*

Balk (*Laurentii*), Muſeum Adolpho-Fridericianum. *Upſaliae* 1746. *in* 4.

Barrerae (*Petri*). Ornithologiae Specimen novum. *Perpiniani* 1745. *in* 4.

— *Eiuſdem.* Eſſai ſur l' Hiſtoire naturelle de la France aequinoctiale *&c. a Paris* 1741. *&* 1749. *in* 12. *Compendium huius extat etiam in Actis Acad. Reg. Scientiarum ann.* 1741. = *Ornithologia, ſeu ſeries Avium in Ruſcinone, Pyrenaeis, atque in Gallia aequinoctiali obſervatarum. Perpiniani* 1745. *in* 4.

Bartholini (*Thomae*). De Cygni Anatome, eiuſque cantu Diſſertatio. *Hafniae* 1650. *in* 4. *cum notis Bewerlini* 1668. *in* 8.

— Cygni Anatome. *Hafniae* 1668. *auctius a Gaſparo filio edita*. = *Anatome brevis, plus philologiae, & fabuloſi cantus fere contra meliorem perſuaſionem defenſio. Aſperae arteriae curvaturam, quae huius Avis ſingularitas eſt, ut vocant, dudum obſervaverat Aldrovandus.*

— *Eiuſdem*. Acta medica, & Philoſophica Hafnienſia. *Volumina V. Hafniae in* 4. = *Volumen* 1. *editum* 1673. *cum Tabulis aeneis continet inter alia Aquilae, & Columbae anatomen pag.* 6. *&* 274. = *Vol.* 2. *cum Tabulis pariter aeneis editum* 1675. *habet Cercopitheci anatomen pag.* 14. *De ovis Galli, & Serpentum pag.* 46. *In ovo, & Pullo obſervationes pag.* 109. *De Avium lingua pag.* 191. *De canali alimentorum ululae obſ. pag.* 242. *De canali alimentorum Ardeae cum duplici ductu Pancreatico & Biliario pag.* 288. *Pavonis anatomen pag.* 314. *Anatomen Pſittaci pag.* 320. *Hiſtoriam muſculorum Aquilae. Vol. V. ann.* 1680. *editum cum Tab. pariter aeneis continet anatomen Ciconiae pag.* 249. *De linguae Pici martii ſtructura mirabili pag.* 251.

Bartram (*Io.*). Obſervations on the inhabitans, climate, ſoil, rivers, productions, animals *&c.* at Niagara &c. *Scil. Obſervationes circa incolas, clima, ſolum, producta, animalia, & reliqua Niagarae Fluminis in America Septemtrionali &c. Londini* 1751. *in* 8.

Barboli (*P. Daniello*). Del Ghiaccio, e della Coagulazione. *Bologna* 1682. *in* 4.

— *De demerſione Hirumdinum in mari loquitur: earumdemque demerſionem defendere nititur.*

Behrens (*Rudolphi Auguſti*). Von dem fremden Vogel Cacadu, wie auch wau-waven. in Act. Breslav. 1722. = *Agit de Pſittaco Edwardi Tabulae* 160. *& de Vulture eiuſdem Tab.* 2.

Bellonius (*Petrus*). Hiſtoire de la Nature des Oiſeaux avec leurs deſcriptions, & naifs portraits retirez du naturel, écrite en ſept Livres. *A Paris* 1555. *in fol.*

— *Eiuſdem Bellonii* Portraits d' Oiſeaux, Animaux &c. d' Arabie, & d' Egypte. *A Paris* 1557. & 1618. *in* 4. *Hic Auctor natione Gallus contemporaneus Geſneri longa itinera circa Mediterraneum, Aegyptum, Palaeſtinam &c. inſtituit; multarum Avium novas deſcriptiones adiecit, veteres examinando multa emendavit, amplificavitque, primuſque fuit, qui per configurationis externae, & vitae generis affinitates Avium ſyſtematicam aliquam diviſionem inſtituit, earumque Icona dedit, ſed incongrua, & inconcinna fere omnia.*

Bergeron (*Petri*). Voyages en Aſie. *Hagae comitum* 1735. *Tom.* 2. *in* 4. *cum fig.*

Besleri (*Michaelis Ruperti*). Gazophylacium rerum naturalium. *Norimbergae* 1642. *Lipſiae, atq. Francofurti* 1716. *&* 1735. *in fol. cum Tabulis aeneis num.* 34. *quarum nonnullae, a V. ſcilicet uſque ad XI. Aquilam Montanam, Hirundinem aquaticam Avem mirabili conformatione praeditam, Avem cucullatam aquaticam nuncupatam, ſcolopacem itidem aquaticam, varias Cygni partes, ut ſternum, caput, atque collum, ſummo artificio diſſectas, tandem Rhinocerem Avem, atque Paradiſaeam, ſive Manucodiatam oſtendunt.*

Blasii (*Gerhardi*). Zootomia, ſeu Anatome variorum Animalium figuris variis illuſtrata. *Amſtelodami* 1681. *in* 4. *cum figuris aeneis.* = *Editio prior ibid. in* 8. *cuſa fuerat. Totum opus in V. partes dividitur, quarum ſecunda Avium diſſectiones, earumdemque ova, pullos, ac generationem tractat.*

Blegny (*Nicolai*). Zodiacus Medico-Gallicus, ſive Miſcellaneorum Medico-Phyſicorum *&c.* Opera Nicolai de Blegny, & de la Roque. *Pariſiis in* 4.

Bochart (*Samuelis*). Hierozoicon, ſeu bipartitum opus de Animalibus Sanctae Scripturae ex recenſione Io. Leusden. *Leydae* 1692. *Vol.* 2. *in fol.* = *Francofourti* 1758. *pariter in fol.*

Bomare (*M. Valmont de*). Dictionnaire raiſonné & univerſel des Animaux *&c. Pariſiis* 1749. *Vol.* 4. *in* 4. *Auctoris nomen Literis M. D. L. C. D. B. abſconditur. Animalia omnia inter quae & Aves, in hoc Opere nominantur non ſolum, ſed & deſcribuntur, atque omnium proprietates, atque in ſyſtemate Linnaeano, Kleiniano, & Briſſoniano diviſiones, & propria genera attinguntur.*

— Dictionnaire raiſonné univerſel d' Hiſtoire naturelle. *Pariſiis* 1765. *Tom.* 5. *in* 8.

Bonannus (*Philippus*) editor, atq. illuſtrator Muſei Kirkeriani. *V. Kirkerum.*

Bontii (*Iacobi*). Hiſtoriae Naturalis, & Medicae Indiae Orientalis Libri VI. a Guillelmo Piſone in ordinem redacti. *Amſtelodami* 1658. *in fol.*

Borelli (*Io. Alphonſi*). De motu Animalium. *Romae* 1681. *in* 4. *cum fig.* = *Inter animalium motus, quos magna peritia ac doctrina determinare annititur, Avium in volatu, omnibuſque earumdem directionibus tum in deſcenſu, cum in adſcenſu vires perpendit, atque explicat.*

Borlace (*Will*). The natural Hiſtory of Cornwall &c. *Oxford in fol. Scilicet Hiſtoria Naturalis Cornubiae. Oxonii* 1758. *in fol. cum Tabulis aeneis* 28. *nitidiſſimis. Inter alia rariores Cornuvalliae Aves deſcribuntur.*

Bradley (*Richard*). A Philoſophical account of the Works of nature *&c. Scil. Philoſophicae narrationes Operum naturae &c. Londini* 1721. *in* 4. *Tabulis* 27. *illuminatis.* = *Amſtelodami* 1744. *in* 8. *Belgice translatae cum Tabulis aeneis* 31. = *Has inter nonnullae ſunt, quae mirifice quasdam Aves oſtendunt.*

Brisson (*A. D.*). Ornithologia, ſive Synopſis methodica ſiſtens Avium diviſionem in ordines, ſectiones, genera, ſpecies, ipſarumque varietates, cum accurata cuiuſque ſpeciei deſcriptione, citationibus Auctorum de iis tractantium, nominibus eis ab ipſis & nationibus impoſitis, nominibuſque vulgaribus. *Pariſiis* 1760. *Vol.* 6. *in* 4. *opus figuris aeneis adornatum.*

Browne (*Edwardi*). Relatio de Anatome Struthiocameli in Act. Eruditorum Supplem. Tom. 1. an. 1692. inſerta

— (*Io.*). Nova & genuina Animalium generatio. *Lugduni Batavorum* 1686. *in* 12.

— (*Patricii*). A civil, and natural Hiſtory of Iamaica in three parts *&c. Scil. Hiſtoria civilis, & naturalis Iamaicae tribus partibus digeſta &c. Londini* 1756. *in fol. cum Tabulis aeneis* 50. *nitidiſſimis,*

Pars 2. *deſcribit Foſſilia*, *Vegetabilia*, *Quadrupedes*, *Aves*, *Piſces*, *Inſecta*; *eorumdemque uſus Technici*, *& Medici deſcribuntur*, *ibidemque omnia ſyſtematica pertractantur*.

Bruckmanni (*Friderici*). Tractatus de Venatione, Piſcatione, & Aucupio. *Spirae* 1605. *in* 4.

— (*Erneſti Ludovici*) Epiſtolarum itinerariarum Centuriae tres. *Wolffenbutelae in* 4. *Centuria* 1. 1742. *Centuria* 2. 1749. *cui accedit deſcriptio Muſei Cloſteriani*. *Centuria* 3. *ibidem edita*, *ſed abſque anno*, *neque abſoluta ob Auctoris mortem*. = *Epiſtola* 3. *Centuria* 2. *agit de nidozinariae Avis*. *Epiſtola* 4. *de Halcyone Ave*. *Epiſtola* 5. *De nidis Avium petrefactis*. *Epiſtola* 17. *De Avibus Sylvae Hercyniae*. *Epiſtola* 18. *De Avibus in Germania obviis*. *Epiſt.* 50. *De Regulo criſtato Sylvae Herciniae Epiſt.* 61. *De Ave incognita*.

Büchneri (*Io. Godofredi*). De Ovo Gallinaceo inſolitae figurae in Voigtlandia excluſo. *Extat in Act. Phyſich. med. V.* 6. *obſ.* 81. *cum figur.*

— De rarioribus quibuſdam Animalibus in Voigtlandia degentibus. *Ibid. Vol.* 4. *obſ.* 69.

Burgharti (*Godofredi Henrici*). Iter Sabothicum. *Breslaviae*, *& Lipſiae lingua Germanica editum* 1736. *in* 8. *cum Tabulis æneis*. = *A pag.* 124. *uſq. ad pag.* 137. *Aves Zothembergens enumerantur*.

Burgundius (*Vincentius*). *Agit de Natura Avium tum Volucrum*, *tum Aquatilium in Libro XVI. Tom. I. Operis*, *cuius titulus eſt:* Speculum Naturale. *Duaci* 1624. *in fol. Vol.* 4.

Camelli (*Georgii Joſephi*). De Avibus Philippenſibus Tractatus, in Philoſophicis Tranſactionibus. Angl. *Vol.* 25. *n.* 305.

Carcano (*Franceſco*). Libri tre degli Uccelli da preda, con un Trattato de' Cani. *Venezia* 1586. *edizione ſeconda*.

Catesby (*Marcus*). A natural Hiſtory of Carolina, Florida, and Bahama Islands contening the figures of Birds, Beaſts, Fishes &c. *Scil. Hiſtoria naturalis Carolinae*, *Floridae*, *& Bahamae Inſulae*. *Londini Vol.* 2. *in folio Regio cum Tabulis illuminatis textu Anglico & Gallico*. *Vol.* 1. 1731. *Vol.* 2. 1743 = *Ita pulchre*, *& ſplendide depictae ſunt huius Operis figurarum Tabulae*, *ut ſi pari diligentia & arte rerum deſcriptiones continerentur*, *nullum ſane praeſtantius Opus editum umquam foret*.

— Of Birds of paſſage. *Scil. De Avibus migratoriis*. = *Extat in Anglicis Philoſophicis Tranſactionibus*, *Vol.* 44. *n.* 483. = *Hanc ipſam materiam pertractarunt etiam Derham*, *Allen*, *Stackouſe*, *Kleinius*, *Linneus*, *aliique*.

— De Avibus ſedem mutantibus. *Extat in Tranſ. Angl. n.* 483.

Chardin. Voyages en Perſe, & autres Lieux de l' Orient. *Pariſiis* 1723. *Tom.* 10. *in* 12.

Charleton (*Gualterus*). Onomaſticon Zoicon, plerorumque Animalium differentias, & nomina propria plurimis linguis exponens *&c. Lond.* 1668. *in* 4. *cum figuris nonnullis Avium methodico aliquo ordine diſtributarum*,

— *Eiuſdem*. Exercitationes de differentiis & nominibus Animalium *&c. Oxonii* 1677. *in* 4.

Childrey. Hiſtoire des ſingularités naturelles d' Angleterre, d' Eſcoſſe, & du Pays de Galles traduite de l' Anglois par M. P. B. *Pariſiis* 1667. *in* 12. = *Agitur inter alia in hac Hiſtoria de magna Anatum copia in Scotiae Regno degentium*, *& permagna Bubonum quantitate certis annis in Provincia Effexenſi adventante*.

Chomel (*Noel*). Dictionnaire Oeconomique *&c. à Lyon* 1709. *Vol.* 2. *in fol. cum fig.* = *Quaedam ad Aves domeſticas in hoc opere occurrunt*, *atque plura circa Aucupii artificia*.

Collectanea nova, & memorabilia Itinerum. *Gottingae*, *Germanice edita*, *in* 8. *Volumen primum editum fuit anno* 1750.

Commentarii de Bononienſi Scientiarum & Artium Inſtituto *&c. Bononiae in* 4. *cum Tab. aeneis*.

— Academiae Scientiarum Imperialis veteres, atque novi. *Petropoli in* 4.

— de Rebus in Scientia naturali, & medicina geſtis. *Lipſiae in* 8. *Horum Volumen primum prodiit* 1752. *ac ſingula Volumina quatuor conſtant partibus*.

— Societatis Regiae Scientiarum Gottingenſis. *Gottingiae in* 4. *cum Tab. aeneis*.

— Reg. Scient. Academiae Svecicae. *Lingua Svecica*. *Holmiae*.

Condamine [*Charles Marie de la*]. Voyage dans l' intérieur de l' Amérique Méridionale, *à Paris* 1745. *in* 8. = *Amſtelaedami Belgice verſum* 1746. *in* 8. = *In hoc itinerario nonnullarum etiam Avium Americanarum fit mentio*.

Coppier [*Guillaume Zyonnois*]. Hiſtoire, & Voyage des Indes Occidentales, en deux Livres, *à Lyon* 1645. *in* 8. = *Inter alia inſulam Avium in Oceano Americano poſitam*, *nec non plures Americae Aves*, *licet minus diligenter*, *nimiumque credulus deſcribit*.

Couche [*Franc.*]. Rélation véritable de l' Isle de Madagaſcar, & du Bréſil. *Pariſiis* 1651. *in* 4. = *Pluſcula ad Hiſtoriam Avium Inſulae Madagaſcar pertinentia in hoc itinere continentur*.

Cramer. Elenchus Vegetabilium, & Animalium Auſtriae. *Viennae* 1756. *in fol.*

Crantz [*Henrici Io. Nepomuc.*] Materia Medica iuxta ſyſtema naturae Tom. 3. *Viennae Auſtriae* 1762. *in* 8. = *Editio altera correcta*, *& aucta*, *ibidem* 1765. = *Doctiſſimus*, *& Clariſſimus hic Auctor in Tom.* 1. *Claſs.* 1. *Medicamenta cardiaca*, *& nutrientia deſcribit*, *atque examini ſubmittit*, *inter quae Avium plurimarum ſpecies*, *quae in cibum recipi ſolent*, *enumerantur*, *earumdemque facultates relate ad uſum medicum*, *nutrimentum*, *guſtum*, *& ſanitatem adſignantur*, *adiectis plurium Auctorum & nationum nominibus*.

Cuba [*Io.*] Hortus ſanitatis, ſeu Libri quatuor de Animalibus, de Avibus, & Volatilibus, de Piſcibus *&c. Argentorati* 1536. *in fol. cum figuris ligneis*,

DALE, vel DALAEI [*Samuelis*]. Pharmacologia, ſive manuductio ad materiam medicam, in qua medicamenta officinalia ſimplicia, hoc eſt, mineralia, vegetabilia, animalia, eorumque partes in medicinae officinis uſitata, in methodum naturalem digeſta ſuccincte, & accurate deſcribuntur. *Londini* 1693. *in* 12. *&* 1710. *in* 8. *Vol.* 2. = *Bremae* 1713. *in* 8. = *Londini* 1737. *in* 4. = *Lugduni Batavorum* 1739. *in* 4. = *In hoc Opere nonnullarum Avium deſcriptiones, & varia nomina ab Auctoribus mutuata adinveniuntur.*

DAMPIER (*William*). An account of a new Voyage round the World. *London* 1697. *in* 8. *Scil.* Narratio novi Itineris circa Orbem *&c. Londini* 1697. *in* 8. *cum Tabulis aeneis n.* 5. = *Huius operis extat Belgica verſio edita Hagae Comitum* 1698. *in* 4. = *Enumerantur Aves in Inſulis Avium dictis obviae; inſuper deſcribuntur Avis Tropicorum, Pinguin, ſive Alca Linnaei, atque aliae Promontorii Bonae Spei.*

— (*Guilelmi*). Nouveau Voyage au tour. *Rothomagi* 1715. *Tom.* 5. *in* 12.

DAPPER. Deſcription de l' Affrique. *Amſtelaedami* 1686. *in fol.*

DERHAM (*Wilhelmi*). Adnotationes in Hiſtoriam Avium Albini, quae ſuo loco deſcribitur. V. *Albinum.*

— *Eiuſdem*. A Letter to Doctor Hans Sloane concerning the migration of Birds. *Scil. Epiſtola ad Dominum Hans Sloanem circa Avium migrationem, quae extat in Anglicis Tranſactionibus Philoſophicis, Vol.* 12. *n.* 271. *&* *Vol.* 26. *n.* 315.

DESLANDES. Recueil de differentes traités de Phyſique, & Hiſtoire Naturelle *&c. à Paris, & Bruxelles* 1736. *in* 8. *avec figures.* = *Belgica extat verſio edita Amſtelaedami* 1737. *in* 8. = *Agit clariſſimus hic Auctor inter alia de Avibus marinis.*

Dictionnaire Portatif d' Hiſtoire naturelle contenant l' Hiſtoire, la Deſcription, & les principales proprietés des Animaux, des Végétaux &c. *Francofurti* 1762. *Tom.* 2. *in* 8.

— Raiſonné, & univerſel des Animaux. V. *Bomare.*

— De Trevoux *&c. a Nancy* 1740. *Tom.* 6. *in fol.* = *In hoc plurimae Aves, ſi non omnes, adcurate admodum deſcribuntur.*

DODART. Memoires pour ſervir à l' Hiſtoire des Animaux. *à Paris* 1676. *in* 4. *Hic Auctor optimas nonnullarum Avium iconas aere inciſas in hoc opere dedit.*

EDWARDS (*Georg.*) A natural Hiſtory of Birds, moſt of which have not been figur' d, or deſcrib' d, and others very little Known, or too brief deſcriptions withont figures, or from figures ill deſign' d. *London. Scil. Naturalis Hiſtoria Avium, quarum plures vel figuris omnino, vel iiſdem bonis carebant, ſive accurata carebant deſcriptione. Londini in* 4. *quatuor Tomis, ſive partibus digeſta figuris nitidiſſime illuminatis. Pars* 1. 1743. *Pars* 2. 1747. *Pars* 3. 1750. *Pars* 4. 1751.

— *Eiuſdem extat verſio Gallica per Wilhelmum Derham, cuius titulus:* Hiſtoire naturelle des divers Oiſeaux qui n' avoient point encore été figurés, ni decrits, ou qui n'étoient point connus d'après des deſcriptions obſcures, ou abregées ſans figures fidellement coloriés. *à Londres Par.* 1. 1744. *Par.* 2. 1748. *Par.* 3. *&* 4. 1751. = *Adnotandum eſt in ſingulis huius operis partibus ad Quadrupedia, Piſces, Inſecta, Amphibia, & monſtroſa aliqua Animalia exprimenda reperiri figuras, & integras Tabulas, quae ut reliquae Avium nitidiſſime illuminatae ſunt; verum & de Avium iconibus praecipue dicendum hoc eſt, colores, quibus permultae figurae aeneae adumbratae ſunt, pulchriores, & vividiores eſſe, quam vera & naturalia exemplaria ferre videantur.*

— *Eiuſdem. De Phaſiano Penſylvanico, & Otide minori.* = *Extat in Tranſactionibus Philoſophicis. Angl. Vol.* 48. *pag.* 499. *Tab.* 15. *&* 16.

— *Eiuſdem*. Gleaning. of natural Hiſtory exibiting Figures of Quadrupeds, Birds, Inſects, Plants *&c. Scil. Spicilegium Hiſtoriae naturalis figuras exhibens Quadrupedum, Avium, Inſectorum, & Plantarum, quarum plures vel figuris, vel deſcriptione non ſatis cognitae fuerunt &c. Londini* 1758. *in* 4. *fig. naturalibus coloribus expreſſis, textu Anglico Gallico.*

— *Eiuſdem. Deſcriptio Avis, quae a Phaſiano, & Gallina Africana prognata creditur.* = *Extat in Anglicis Philoſophicis Tranſactionibus Vol.* 51. *Par.* 2. *ann.* 1760.

Ephemerides Academiae Caeſareae Leopoldino-Carolinae Naturae Curioſorum *&c. Vide Kellnerum, qui dictarum Ephemeridum Synopſim edidit.*

ELLIS (*Henrici*). Voyage à la Baye d' Hudſon fait en 1746. & 1747. *Lugduni Batavorum in* 8. *cum Tabulis aeneis* IX. *Quadrupedia, & Aves repraeſentantibus.* = *Extat pariter in Vol. I. Collect. nov. & memorabil. Itiner. Germanice edit. Gottingae* 1750. *in* 8.

England illuſtrated, or a Compendium of the natural Hiſtory &c. of Englad, and Wales &c. *Scil. Britannia illuſtrata, ſive Compendium Hiſtoriae Naturalis &c. Angliae, & Walliae &c. Londini* 1763. *Tom* 2. *in* 4. *max. cum fig.*

ERICIVS (*Ericus*). Epiſtola de Avibus. *Hafniae* 1671. *in* 8.

ESPARON (*d'*) Ars Falconaria. *Francofurti ad Moenum* 1617. *in* 4.

FABRICII (*Phil. Corn.*). De Animalibus quadrupedibus, Avibus *&c. Veteraviae indigenis. Helmſtadii* 1749. *in* 8. = *Satis dives Catalogus cum obſervationibus medicis.*

FASELTI. De primo Avium Ortu. *Wittembergae* 1674. *in* 4.

FERNANDEZ (*Franciſci*). Hiſtoriae Animalium, & mineralium novae Hiſpaniae Liber unicus in ſex Tractatus diviſus. *Romae* 1651. *in folio, ſimul editus cum Franciſci Hermandez Hiſtoria Mexicana.*

FEVILLEE (*Ludovici*). Journal des Obſervations Phyſiques &c. *à Paris* 1714. *in* 4. *Tom.* 2. *cum Tabulis aeneis,* = *Deſcribit inter alia Larum cauda breviſſima, Leucomelaros, Aviculam Colibri dictam, & Tucanum.*

FEVILLEE (*Jo. de*) Journal de Fauconnerie 1567.

FRANKENAU (*Georg. Frider.*) Traité curieux ſur les ongles, ou l' Onychologie. *Jenae* 1695.

FREIGIUS (*Jo. Thom.*) Quaeſtiones Phyſicae Libris 36. digeſtae. *Baſileae in* 8. = *Ex his Liber* 32. *agit de Avibus, & Ornithologia.*

FREXIER. Voyage de la mer du Sud.

FRIDERICUS II. Imperator. De arte venandi cum Avibus, cum Manfredi Regis additionibus. *Auguſtae Vindelicorum* 1596. *in* 8. = *Huc accedit Alberti Magni de Falconibus, Aſturibus, & Accipitribus Liber.*

FRISCH, vel FRISCHII [*Jo. Leonhardi*]. Vorſtellung der Vogel in Teutſchland &c. *Scil. Avium Germaniae Proſpectus, nec non exterarum quarumdam, naturalibus coloribus delineatarum. Berolini* 1734. *in folio.* = *Figurae optimae ſunt, & exacte illuminatae.*

— *Eiuſdem Obſervationes de Pellicano, ſive Ardea roſtro cochleari.* = *Extant in Actis Phyſico-medicis. Vol.* 5. *obſ.* 67.

FROGER. Voyage made in the years 1695. 1697. to the coaſts of Africa, ſtroght of Magellan, Braſil, Cayenna, Antilles *&c. Scil. Iter inſtitutum annis* 1695. *&* 1697. *per Africae oras, fretum Magellanicum, Braſiliam, Guyanam, Antillas Inſulas &c. Londini* 1608. *in* 8. *Pariſiis* 1698. *in* 12. *Amſtelodami recuſum* 1699. 1715. *in* 12. = *Iconas etiam Plantarum & Animalium habet, quorum deſcriptiones ſuo modo, ut miles concinnavit.*

GAUTIER (*Jo. Antonii*) Obſervations ſur l' Hiſtoire naturelle ſur la Phyſique, & ſur la Peinture, avec des Planches imprimées en couleur *&c. à Paris Tom.* 2. *in* 12. *&* 4. = *In Vol.* 2. *Obſervationes habet circa Aves praeſertim rapaces, atque deſcriptiones habet de Buteone ſimpliciter dicto, de Buteone Apivoro, de Milvo aeruginoſo, Lanio minore Molucaerum, & Franci Galbuli.*

— *Eiuſdem*. Collection de Planches d' Hiſtoire naturelle en couleur *&c. à Paris* 1757. *in* 4.

Gazzettiere Americano contenente un diſtinto ragguaglio di tutte le parti del nuovo Mondo, tradotto dall' Ingleſe, e arricchito di aggiunte, note, carte, e rami. *In Livorno* 1763. *Tom.* 3. *in folio* = *Americanae quedam Aves in hoc opere tabulis aeneis oſtenduntur.*

GESNERUS (*Conradus*). Hiſtoriae Animalium Lib. 5. *Tiguri* 1555. *in fol. Tom.* 3. *cum figuris ligneis.* = *In Libro* 3. *agit de Avibus ſub titulo* De Avium natura, *qui ſeorſim prodiit Tiguri pariter in fol.* 1560. = *Germanica extat verſio, Tiguri pariter edita cum figuris ſimiliter ligneis* 1582. = *Editio alia Latina prodiit pariter in fol. cum figuris ligneis Francofurti* 1585. = *Editio altera Germanica Tiguri* 1600. *Editio pariter altera Francofurtana prodiit* 1621. = *Praeclari huius Helveti Auctoris magna extant in Ornithologiam merita. Quoquot Aves Europae viderat, diſtincta conditionis, vitae rationis, & alimentorum deſcriptione perſecutus eſt, illaſque alphabetico ordine diſpoſitas tradidit, & earumdem iconas pro illo tempere non contemnendas dedit.*

GINANNI (*Conte Giuſeppe di Ravenna*). Delle Uova, e de' Nidi degli Uccelli, *Venezia* 1737. *in* 4. *con figure in Rame. Scil. De Nidis & Ovis Avium &c. cum figuris aeneis.*

— Produzioni naturali, che ſi ritrovano nel Muſeo Ginanni in Ravenna metodicamente diſpoſte, e con Annotazioni illuſtrate. *In Lucca* 1762. *in* 4. *Scil. Specimina Hiſtoriae naturalis, quae Ravennae in Muſeo Comitis Ginanni ſyſtematice diſtributa adſervantur, cum adnotationibus &c.* = *In ſecunda parte huius Operis multae enumerantur, ac deſcribuntur Aves, quarum capita, pedes, & ova, vel nidi in ſupradicto Muſeo reperiuntur. Propediem abſolutiſſimam Hiſtoriam naturalem Paludum Ravennatum, opus eiuſdem poſthumum cura fratris eius ſperare licet cum plurimis figuris.*

GOBIEN (*Carolus*). Lettres edifiantes & Curieuſes *&c. à Paris* 1718. *uſque ad* 1743. *Vol.* 24. *in* 12. = *Alia earumdem extat editio. Pariſiis in* 12. *cuius editionis Volumen primum ſub anno* 1707. *praelo prodiit. Italice etiam verſae fuerunt, atque Venetiis editae* 1751. *in* 8.

GRANGER. Relation du Voyage fait en Egypte. *Pariſiis* 1745. *in* 12.

GREW (*Nehemiae*). Catalogue and Deſcription of the natural, and artificial Rarities belonged to the Royal Society *&c. Scil. Deſcriptio Muſei Societatis Regalis Angliae &c. Londini* 1681. *&* 1686. *in fol. cum tabulis aeneis.*

— A deſcription of the American Tomineus, or Humming Bird &c. *hoc eſt: Deſcriptio Avis Colibri, quae extat in Philoſophicis Tranſactionibus Anglicis. Vol.* 17. *n.* 200. *& n.* 202.

— The comparative Anatomy *&c. hoc eſt: Anatomia compartiva ventriculorum, & Inteſtinorum. Londini* 1683. *in fol.* = *De ventriculorum, & inteſtinorum, inter alia, plurium Avium peculiari ſtructura loquitur.*

GRONOVII (*Laurent. Theod.*) Animalium in Belgio habitantium Centuria prima, & ſecunda; *Extant in Actis Helveticis Phyſico-mathematicis &c. figuris aeneis illuſtratis Vol.* 4. *Baſileae* 1760. *in* 4. = *In Centuria prima methodo Linneana diſponuntur, & deſcribuntur Aves. Scil. Accipitres, Picae, Anſeres, Grallae, Gallinae, Paſſeres.*

GRUZMANNI (*M. Danielis*) Diſſertatio de Avibus Paradiſiaeis, & primario harum Rege. *Ienae* 1667. *&* 1688. *in* 4. *cum figuris.*

GUARINONI (*Girolamo*). L' Uccellatura Poema. *Bergamo* 1760. *in* 8.

HALDE (*Le Pere du*). Lettres édifiantes & curieuſes *&c. Pariſis in* 12. *Volumina plura.*

HARTMANNI (*Philippi Iacobi*). Anatome Caponis inedia enecti, atque Carduelis fame peremptae *Ext. in Miſcel. nat. curioſ. Dec.* 2. *ann.* 7.

HASSELQUIST (*Friderici*) Eller Reſa til Heliga Landet förrättad ifrän är *&c. Scil. Iter per Palaeſtinam inſtitutum ab anno* 1749. *ad* 1752. *&c. Stockolmiae* 1758. *in* 8. = *In duas partes diviſum, ſive deſcriptum*

ptum eſt ; in prioreparte ſiſtitur Itineris diarium, in poſteriore Hiſtoria Naturalis Palaeſtinae, cum deſcriptione Animalium, ac praecipue Avium ; ibi itidem continentur Philologia ſacra, materia medica, commercium &c. atque Epiſtolae plures ab Haſſelquiſtio ad Clariſſimum Linnaenm datae exibentur.

— Deſcriptio Turdi ſolitarii, & aliorum Animalium, *in Actis Upſalienſibus* 1744.

— Diſſertatio de Fulica, *in Actis Upſal.* 1751.

— De Falcone capite nudo, montes Aegypti inhabitante ; *Act. Svec.* 1751.

Helbigius (*Io. Otto*). De variis rebus Indicis ; puta de rara quadam Africae Ave, de Ave Manucodiata, ſeu Paradiſaea, de Gallinis Iavanenſibus *&c. In Miſcell. curioſ. natur. Dec.* 1. *ann.* 9. *&* 10. 1678. *&* 1679.

Helwiglus (*Georg. Andr.*). *Nonnulla de Avibus, & ſignanter de Pelecano Geſneri habet in Actis Breslawienſibus* 1719.

Hercsbachii (*Conradi*). De Venatione, Aucupio, & Piſcatione. *Coloniae* 1573. *in* 8.

Hering (*M. Io. Erneſti*). Diſſertatio de Ortu Avis Britannicae, *ſcilicet* de Anſere Scotico. *Wittemberg.* 1665. *in* 4.

Herissant. Obſervationes anatomicae in motus capitis, roſtri, ac mandibularum in Avibus inſtitutae. *Act. Paris anno* 1748.

Hernandez (*Franciſcus*). Hiſtoria Mexicana. *Romae* 1626. *&* 1651. *quae ab editione nihil differt in fol. ad calcem Hiſtoriae novae Hiſpaniae a Fernandez conſcripta, cum figuris.* = *Aves plurimae Mexicanae deſcribuntur.*

Hervieux. Nouveau Traité des Serins de Canaries, contenant la maniere de les elever *&c. à Paris* 1709. *&* 1713. *in* 12. = *Tractatus hic circa hanc materiam accuratiſſimus dici poteſt. De incubatu enim harum Avium, & de adhibendis artificiis ad ſagaciorem, pulchrioremque prolem obtinendam, ipſamque inde ad dulciſſime canendum inſtruendam fuſius agit, nec non de innumeris morbis, quibus hae aviculae obnoxiae ſunt, ipſorumque remediis plenarie tractat. Germanice etiam prodiit Francofurti, & Lipſiae* 1728. *in* 8.

Heunius (*Io.*) Sur l' uſage, & l' efficacité des Hirondelles. 1682. *in* 12.

Hill (*Io.*) The Hiſtory of Animals, containing deſcriptions of the Birds, Beaſts, Fishes, and Inſects *&c. Scil. Hiſtoria Animalium, in qua continentur deſcriptiones Avium, Brutorum, Piſcium, & Inſectorum &c. Londini* 1752. *in fol. cum Tabulis aeneis* 28. = *Doctiſſimus ac diligentiſſimus hic Auctor a pag.* 318. *uſq. ad pag.* 514. *agit de Avibus.*

Hildegardes. Hortus ſanitatis quatuor libris, quae ſubſequuntur, complectens, De Animalibus, & Reptilibus; de Avibus, & Volatilibus; de Piſcibus & Natatilibus. *Argentorati* 1536. *in fol.* = *Singula capita ornata ſunt pulcherrimis ſchematibus, ſive figuris.*

Hiſtoire de l' Academie Royale des Sciences de Paris. *V. Acta &c.*

Hoock. Micrographia, ſeu Phyſiologicae deſcriptiones minutorum corporum factae per vitra maiorativa (Anglice). *Londini* 1667. *in fol. In obſervatione* 36. *pag.* 168. *agit Auctor de Plumarum formatione, una cum coniectura circa cauſas variorum earum colorum, quorum pulchritudinem & fulgorem oriri cenſet ex exiguitate partium reflectentium.*

Horstii (*Danielis*). Phyſica *&c. Francofurti* 1682. *in* 12. = *Multa habentur in hoc opere de internarum partium Avium ſtructura, atque uſu, & nonnullarum in Avibus partium defectu, relate ad Quadrupeda, & alia animalia, ac praecipue de ſplene, ac veſica urinaria in Avibus deficientibus.*

Hughes (*Griffith*). Te natural Hiſtory of Barbados in ten books *&c. Scil. Hiſtoria naturalis Barbadenſis Libris decem comprehenſa. Londini* 1750. *in folio cum fig. aeneis.*

Huth (*Georg. Leonard.*) Beſchreibung zur Arzney dienlichen Pflanzen *&c. h. e. Traductio Itinerum in Peru, Regno Clili &c. annis* 1709. 1710. *atq.* 1711. *a Dom. Ludovico Feuillee inſtitutorum &c. Norimbergae* 1753. *in* 4. *maior.*

Iames Dizionario univerſale di Medicina, Chirurgia, Chimica, Botanica, Notomia, Farmacia, e Storia Naturale &c. tradotto dall' originale Ingleſe da' Sigg. Diderot, Eidous, e Toulsaint. *Venezia T.* 11. 1753. *Editio Anglica prodiit Londini* 1745.

Iacobaei [*Oligerii*]. Muſeum Regium Friderici IV. Daniae Regis *&c. Haumiae in folio abſque anno editionis cum Tabulis pluribus aeneis.* = *In Sectione ſecunda de Avibus pluribus varioribus, praecipue maritimis, & Borealibus agitur, earumdemque plures adnectuntur accuratae icones.*

Ilstroem [*Io.*] Mergus Piſces captans. *Act. Svec.* 1749.

Ionston [*Io.*] Hiſtoriae naturalis Avium Libri 6. *in fol. cum Tabulis aeneis Francofurti* 1649. = *Amſtelaedami* 1657. = *Amſtelaedami cura H. Ruyſchi* 1718. *Heilbrumi* 1756. = *Paulo poſt Aldrovandi tempora vaſtam Avium deſcriptionem edidit hic Auctor, plerumque ex Geſnero & Aldrovando hauſtam, atque earumdem iconas, quae ligno in ſupradictis inciſae fuerant, Tabulis aeneis reddidit, quamquam raro accuratioribus.*

Iosselyn (*Io.*) New Engelands rarities diſcover' d in Birds, Beaſts *&c. Scil. Novae Angliae rariora circa Aves & alia Animalia detecta, ac deſcripta. Londini* 1672. *in* 8. *cum figuris.*

Journal d' Angleterre. *Scil. Diarium Anglicum.*

— Des Sçavans. *Hoc eſt: Diarium Eruditorum totius Europae a Dom. de Hedoville inchoatum anno* 1684. *Pariſiis in* 4. *Amſtelaedami in* 12. *cum fig. & de rebus ab anno* 1665. *actis, libriſque editis exordium facit.*

— *Ou* Memoires de Trevoux.

— Encyclopedique. *Scil. Diarium Encyclopedicum, Bullioni. Extat altera editio Italica. Lucae in* 12.

— Etranger. *Scil. Diarium operum, & rerum ab exteris editis, ſive detectis.*

— Britannique a la Haye (*Scil. Hagae*) *in* 12.

Kae-

KAEMPHERI [*Engelberti*]. The Hyſtory of Iapon, giving an account of the Metals, Minerals, Trees, Plants Animals, Birds, Fishes of that Empire *&c. Scil. Hiſtoria Japoniae, deſcriptiones continens Metallorum, Mineralium, Arborum, Plantarum, Animalium, Avium, & Piſcium, qui in eodem Imperio adinveniuntur &c. Londini* 1727. *in fol. cum Tabulis aeneis. = In Gallicam linguam translata edita fuit Hagae Comitum* 1727. *Vol.* 2. *in fol. & alibi in pluribus Tomis in* 8.

KALM (*P.*) Iter Americanum. *Holmiae* 1753. *Vol.* 3. *in* 8.

KELLNERI [*Andreae*]. Synopſis obſervationum Medicarum & Phyſicarum, quas Decuriae tres, & Centuriae decem Ephemeridum Acad. Caeſ. Leopoldino-Carolinae Naturae Curioſorum ab anno 1670. ad 1722. publicatarum continent, ordine alphabetico, & ad inſtar Lexici expoſita &c. *Norimbergae* 1739. *in* 4. *Synopſis haec plura ad Ornithologiam, quae in ſupradictis Naturae Curioſorum Academiae Ephemeridibus, ac memorato annorum curſu continentur, indicat. Praecipua ſunt -- Anas cornuta -- Anatis ferae, ſive Clangulae Anatome -- Anates auriferae, ſive auri grana in ventriculo habentes -- Anates in quercu natae -- Anates Groellandicae -- Anatum mirabilis digeſtionis in ventriculo vis -- Anatibus Amygdalae amarae lethales -- Anſer cornutus -- Anſer criſtatus -- Anſer quadrupes -- Anſer cranio monſtroſus -- Anſer cum corde triplici -- Anſer maſculus ovum excludens -- Anſer pennis monſtroſus -- Anſer morſu periculoſa ſymptomata excitans -- Anſeres prae reliquis Avibus monſtroſi evadentes -- Anſerum longaevitas, & vivacitas -- Aquila alba Poloniae -- Aquila piſcatrix unico inteſtino caeco rotundo praedita, Aquila vero regalis duobus minimis inſtructa -- Aquilae fel ophtalmicus ac pinguedo nervinus, & reſolvens -- Ardeae vulgaris, & ſtellaris autatome -- Avis rara Africae -- Avis riſum edens -- Aves albae in Epiſcopatu Hildeſheimenſi, & Sicinia, qualis eſt Aureola, Paſſer, Hirundo, Corvus &c. -- Aves Curlandicae -- erectae incedentes -- monſtroſae -- loquaces -- earum ſermo -- quatuor pedibus praeditae -- viviparae -- viſcivorae, ac viſcum progenerantes -- non omnes duobus gaudent inteſtinis coecis -- cur in ventriculis lapides, ſilices, & arenam habeant -- Avium ſingularis digeſtionis vis -- organa concoctionis & reſpirationis coſtarum machina -- cur tempeſtatum imminentium prophetae -- morbus epidemicus -- contiendarum duplex modus cum & ſine eviſceratione -- mirabilia quaedam -- Manucodiatae, ſeu Paradiſiacae -- Corvus loquax -- viviparus -- cornutus -- crocitatu horas indicans -- eorum crocitatus interitus iumentorum praeſagus -- Corvo nigro ex ala pennae albae ſucceſſive excreſcentes -- Corvi albi -- artefacti -- verſicolores -- Spaſmodica ſymptomata adſcripta eſui Coturnicum lolio temulento, quo hae Aves maxime delectantur, ſaginatarum -- vera excluſio pullorum Cuculi, atque huius origo -- Cycni ſterni anatome & ſceleton -- lingua oſsea, & cranii figura -- de ovo eius nonnulla -- Caponis atque Carduelis fame enectae anatome -- Fulicae hiſtoria & anatome -- Gallinarum memorabilia quaedam -- Gallina ovum edens Pullo toto genere a Gallina diſtincto, ſcil. Anate impraegnatum, aliaque -- Gallina quadrupes -- mactata reviviſcens -- Pullum pariens -- ſuperfoetans -- morboſarum diſſectiones anatomicae, & obſervationes plures -- inteſtino caeco gaudent duplici -- plumarum colores mutant -- Iavanenſes -- earum foecunditas quomodo promovenda -- ab Amygdalis amaris iugulantur -- deplumatae ac vivae cordis regioni applicatae diverſis morbis ſuccurrunt -- aliarum ipſarum partium uſu medico Gallinae Indicae, lui epidemicae obnoxiae -- Gallinagines candidae -- quomodo in Curlandia capiuntur -- Gallus ſine corde -- cornutus -- Indicus hydropicus -- monſtroſus -- quadrupes - oviparus &c. -- Gallorum irritatorum morſus venenati -- Gallopavonis ovum rarum, & monſtroſum -- Hirundo alba -- de Hirundinum excoecatione, & reſtitutione ſpontanea a Celſo deſcripta -- Hirundines ſale volatili ſcatent -- comeſtae epilepticos non iuvant -- earum uſus medici polychreſti -- Milvi anatome -- noctuae vulgaris atq. ſaxatilis anatome -- earum oculorum mira fabrica -- earum virtus antiparalytica &c. Ova plura Avium praecipue monſtroſa, & inſolita norma excluſa deſcripta -- Paſſer albus -- Canarienſis -- tripes &c. Pavonis albi excluſio notabilis -- Perdix alba -- nonnulla de Perdicis interna ſtructura, & noxa ab earumdem comeſtione -- Picae glandariae anatome -- Pica loquax &c. -- Picus maior niger, eiuſque anatome -- Picus vix uno inteſtino coeco praeditus -- Picus viridis, eiuſque anatome -- de pullis Gallinaceis plura -- de metallis a Struthione deglutitis, eorumdemque effectu -- Turturis anatome -- de Turdo ſaxatili memorabilia quaedam -- Turdi an excremento viſci generationi inſerviant -- eorum ventriculus ob hyoſcyamum, quo vivi veſcuntur, non edendus -- De Urogalli humoris oculorum aquei facultate medica.*

KIRANUS. Kiranides *&c.* 1638. *Libri* 4. *in* 8. *abſque editionis loco = In Libro* 1. *agit de Gemmis, Herbis, Avibus, & Piſcibus.*

KIRCHMAYER (G. C.) Zoologia phyſica, & de Baſiliſco, Unicornu, Phoenice *&c. Wittembergae* 1669. *in* 8. *Collectanea.*

KIRCHMAIERUS (Georg. Gaſp.) *De Ave Paradiſi differit in Libro da Paradiſo, imperio antediluviano, deſcriptione Diluvii &c. Wittembergiae* 1662. *in* 8.

KIRKERI (*Athanaſii*). Romani Collegii Societatis Ieſu Muſeum celeberrimum. *Amſtelaedami* 1678. *in fol.*

— Muſeum Kirckerianum reſtitutum, auctum, deſcriptum, & iconibus illuſtratum. *Romae* 1709. *in fol. In hac editione nonnulla de Avibus agit Bonannus, ac praeſertim Pendulinum, ſive Remix aviculam ab ipſo Lithuanicam dictam deſcribit, eiuſdemque nidum delineat.*

KLEIN (*Iacob Theod.*) Hiſtoriae Animalium Prodromus cum Praefatione de ordine Animalium in genere. *Lubecae* 1750 *in* 4. *cum Tabulis aeneis. Lipſiae* 1751. = *Opus hoc in tres diſtinctum eſt partes, quarum prima agit de origine Avium, utrum e Terra, an vero ex aqua ſurrexerint. Secunda de ordinibus Avium. Tertia de Avibus erraticis & migratoriis. Avium ordinis ſyſtematici compendium Belgice ſiſtitur in* de Vitgez Verhand. *Vol.* 1. *pag.* 455. .... *Latine vero verſum in Commentariis de ſcientia naturali*

rali , & medicina geſtis Lipſiae editis . Gallice pariter redactum prodiit ab Anonymo editum in Syſteme naturel du Regne animal . *à Paris* 1754. *in* 8.

KNOX (*Roberti*) . Relation of Ceylon . *Scil. Deſcriptio Inſulae Zeylanicae, Londini* 1681. *in fol.* = *Inter alia animalium etiam huius feliciſſimae Inſulae non inutilem deſcriptionem continet .*

KOLBE , *vel* KOLBEN (*Petri*) . Deſcription du Cap de Bonne Eſperance , avec l' Hiſtoire naturelle du peys. *Amſterdam* 1741. *Vol.* 3. *in* 8. *cum figuris aeneis* = *Germanice Nurembergii* 1719. = *Belgice Amſtelaedami* 1727. *Vol.* 2. *in fol.* = *Deſcribuntur in hoc opere plurima naturalia in Promontorio Bonae Spei obvia , praeſertim plurimae Aves ,*

— Hiſtoire general des Voyages ,

KOLBE (*Petri*) . Itinera . *Nurembergae prodierunt Germanice* 1719. *in folio* . = *Editum vero eſt huius Libri compendium , inutilibus reiectis , Amſtelodami* 1741. *in* 8. = *Inter alia Animalia Capenſia in hoc opere deſcribuntur . Compendium pariter hoc recuſum inde fuit Germanice Norimbergae* 1745. *in* 4.

KRAMER (*Gui'elmus Henricus*) . Elenchus Vegetabilium & Animalium per Auſtriam inferiorem obſervatorum, ſiſtens ea in Claſſes , ordines , genera , & ſpecies redacta . *Viennae . Pragae , & Tergeſti in* 8. = *In hoc opere , ſi non omnes , plurimae ſaltem Aves Auſtriae inferioris deſcribuntur .*

LABAT (*Pere du*) . Nouveau Voyage aux Isles de l' Amerique . *Pariſiis* 1721. *in* 12. *Vol.* 6. *cum figuris , &* 1722. *pariter in* 12. *Vol.* 8. *cum Tabulis aeneis* . = *a la Haye* 1724. *in* 8. *Vol.* 6. *cum Tabulis pariter aeneis . Animalia plura , & Aves inter alia in iis Inſulis obviae hic deſcribuntur* . = *Nova & aucta editio* 1742. *in* 8. *Vol.* 12. = *Multa ex P. du Tertre , aliiſq. excripſit , praecipue ad animalium hiſtoriam ſpectantia .*

— Nouveau Voyage de l' Afrique Occidentale . *Pariſiis* 1728. *in* 8. *Vol.* 5. = *Multa ex priori itinere , & ex aliis repetita , aliqua tamen peculiaria , & in primis ex commentariis Dom. Compagnon & Brue , de Avibus ,* & *Animalibus rarioribus , nec alibi deſcriptis adiecit .*

— Voyage de Guinée , par le Chev. des Marchais. *Pariſiis* 1730. *in* 8. = *Guineae Regna , deinde Guinam deſcribit . In iſta in primis varia Animalium , & Avium genera illuſtrare conatur , ſed omnis methodi in Hiſtoria naturali ignarus fuit.*

— Rélation hiſtorique de l' Ethiopie Occidentale . *Pariſiis* 1732. *in* 12. *Vol.* 5. = *In primo huius Hiſtoriae Tomo aliqua ad Hiſtoriam naturalem pertinentia continentur. Eiuſdem itinera per Hiſpaniam , & Italiam inſtituta. Pariſiis* 1730. *& Amſtelodami* 1731. *edita in* 10. *Vol. in* 8. *Tacemus , quae praecipue minuta plurima , & monaſtici argumenti continent .*

LACHMUND (Frider.) . De Ave Diomedea Diſſertatio . *Amſtelaedami* 1674. *in* 12. *cum Avis effigie .*

— De Cygni lingua oſſea , & cranio Anſeris monſtroſo . *In Miſcellan. Nat. Curioſ. Dec.* 1. *ann.* 4. *&* 5. 1673. 1674. *obſerv.* 179. 181.

— De Avibus praeter naturam candidis in Epiſcopatu Hildesheimenſi , & vicinia , qualis eſt Aureola , Linaria , Paſſer , Hirundo , Alauda , Corvus . *In Miſcel. Nat. Curioſ. ibid. obſerv.* 184.

— De Ovo ab Anſere a Februario uſque in menſem Septembrem retento . *In Miſcel. Natur. Curioſ. ibid. obſerv.* 181.

— De Anſere domeſtico criſtato . *In Miſcel. Nat. Curioſor. Dec.* 1. *ann.* 6. *&* 7. 1675. 1676. *obſerv.* 182.

LADE (*Ruperti*) . Voyages de l' Afrique , de Aſie , & de l' Amerique . *Pariſiis* 1744.

LAET (*Jo. de*) . Novus Orbis , ſeu Deſcriptionis Indiae Occidentalis Libri 8. Tabulis Geographicis, & variis Animantium, Plantarum , Fructuumque iconibus illuſtrati. *Lugduni Batavorum* 1633. *in fol.* = *Innumerae Aves , praeſertim Pſittaci , & cicures aliae, ſive domeſticae Regni Peruani , Praefecturae Luitenſis , & novae Hiſpaniae deſcribuntur .*

LAET (*Io. de*) . Deſcriptiones Indiae Orientalis *&c. Amſtelodami* 1633. *in fol.* = *Quamvis Patria non exceſſiſſet Auctor , uſus priorum operibus , ut Herrera , & Ximenez inprimis , Hiſtoriam Civilem , & Naturalem per regiones deſcripſit bono ordine , & ſimplici ſermone .*

LAMBERT . [*l' Abbè*] . Hiſtoire generale , Civile , Naturelle , Politique , & Religieuſe de tous les peuples du monde . *à Paris* 1750. *Vol.* 15. *in* 12.

Lapeyronie ſur les petits oeufs de Poule ſans jaune , qu' on appelle vulgairement oeufs de coq. *Extat in Act. Acad. Sc. Paris* 1710.

LAUNAY (*Carolus*) . Nouveau Syſteme ſur la generation de l' Homme , & celle de l' oiſeau. *à Paris in* 12.

LEDELIUS (*Samuel*) De Gallo Gallinaceo oviparo . *In Miſcell. Nat. Curioſ. Dec.* 2. *an.* 1682. *obſerv.* 145.

LEEUWENHOEK (*Antonii a*) Arcana naturae *&c. Delphis Batavorum ex Belgico Latine verſa* 1695. *in* 4. *cum Tabulis plurimis aeneis* = *Epiſtola* 76. *ſive pag.* 350. *huius editionis nonnulla habet de coloribus in plumis Avium . Epiſtola* 74. *pag.* 313. *& ſeq. de formatione calamorum Avium , & cur quidam dentati findantur ; item de formatione plumarum earumdem . In Epiſt.* 67. *pag.* 213. *circuitum ſanguinis in Avibus metiri ſtuduit Auctor , ſed dignoſcere ipſum non potuit ob magnum numerum vaſorum ſanguiferorum, quae corpus , quod inſpiciebat , rubrum faciebant . Atque Epiſtola* 68. *pag.* 230. *de curſu ſanguinis , eiuſque multiplicibus vaſis in palea Galli Gallinacei obſervationes aliquas exponit .*

LEMERY (*Nicolai*) . Traité univerſel des Drogues &c. en ordre Alphabetique . *Pariſiis* 1699. *in* 4. = *Nova editio aucta , atque Tabulis aeneis exornata* 25. *prodiit Pariſiis* 1714. = *De Avibus pluribus in hoc opere ſermo habetur , quoad medicas facultates . Operis eiuſdem editio altera extat in Italicam Linguam verſa , Venetiis cuſa* 1751. *in fol. cum fig.*

Lerius . . . . . Historia Americana.

Lettres édifiantes, & curieuses, écrites de Missions Etrangeres, par quelques Missionaires de la Compagnie de Iesus. *&c. Parisiis in* 12. *Volumina plura = Nonnulla in hac Epistolarum collectione ad Aves praecipue Indicas, Freti Hudsonis &c. spectantia occurrunt. Harum primus Auctor fuit Halde* [*le Pere.*]

— Edifiantes, & curieuses *&c. Videatur Gobien* (*Carolus.*)

Linocier. Histoire des Animaux a quatre pieds, des Oiseaux, des Poissons, des Serpents *&c. à Paris* 1584. *in* 12. *cum Tabulis ligneis.*

Linnei (*Caroli*). Systema Naturae, sive tria regna naturae. *Lugduni Batavorum* 1735. *in fol.* = *Holmiae* 1740. *in* 8. *editio aucta cum nominibus Sveticis. Halae* 1740. *in* 4. *ob longo, cum nominibus Latino-Germanicis, opera Io. Laugen. Parisiis* 1744. *in* 8. *editio auctior cum nominibus Gallicis a Bernardo Iussieu adiunctis -- Halae Magdeburgicae cum nominibus Latino-Germanicis in* 8. *editionis secundae tantummodo recusio -- Stockholmiae* 1748. *in* 8. *cum nominibus Sveticis, editio 6. multo auctior ab auctore edita -- Lipsiae* 1748. *in* 8. *cum nominibus Germanicis secundum sextam Stoeckholmiensem editionem -- Holmiae* 1753. *in* 8. *-- Lugduni Batavorum* 1756. *in* 8. *editio multo auctior, & emendatior cum nominibus Gallicis -- Holmiae editio* 10. *reformata in tres Tomos in* 8. *quorum primus, qui prodiit* 1758. *sistit Regnum Animale. Ab hac editione denominationes Avium Linnaeanas, quas in hac Ornithologia retulimus, desumpsimus, eiusdemque Auctoris Systematis Synopticam dispositionem Volumine primo inter reliquas Systematum adumbrationes adposuimus. Celeberrimus hic Auctor usque dum vitam duxerit, quam diutissimam ei precamur, nullam imponet mutationum finem, quod ad naturae characteres enucleandos, & Systema absolutissimum tradendum novis iugiter institutis experimentis, & adquisitis cognitionibus quantum faciat quilibet videt; verum pro exteris ac longinquis Scriptoribus molestiae plena evadit res, cum nec Libros omnes huius clarissimi viri adquirere, ac perlegere plures possint, non tantum expensarum gravitate retenti; sed etiam difficultate ob distantiam asportationis: quamplures de una vel altera editione, quae forte a Bibliopolis committitur, illisq. ostenditur contenti sunt. Aliud profecto facere varius concessum est. Tantumdem fere, & nobis accidit sub remotissimo ab Auctoris caelo degentibus, qui difficulter & longo tempore multas Linnaei operas potiti fuimus, tandem non paucas inter desideratas habere necessario contigit, ut praecipue de undecima, & duodecima Systematis naturae editione accidit, quas ante operis nostri Ornithologici principium consulere non licuit.*

— Systematis naturae editio 11. *Lipsiae in* 8. *quae furtim prodiit, & vitiosa dicitur. Duodecima autem reformata, & ab Auctore recognita prodiit Holmiae* 1766. *in* 8.

— *Eiusdem editio* 12. *-- Distributio Avium Systematica in hac editione stabilita pluribus in locis quoad genera & species a* 10. *editione differt, ideoque & de hac notitiam hic dedimus.*

— Animalia Sveciae. *In Act. Upsal.* 1736. *-- Lugduni Batav.* 1743. *in* 8.

— Fauna Svecica sistens Animalia Sveciae Regni, distributa per classes, & ordines, genera, & species &c. *Stockholmiae, & Lugduni Batavorum* 1746. *in* 8. *maiori cum Tabulis aeneis -- Stockholmiae* 1761. *editio altera auctior.*

— Amoenitates Academicae, seu Dissertationes variae Physicae, Medicae, & Botanicae antea seorsim editae sub praesidio eiusdem Linnaei. *Holmiae, Lipsiae, Amstelaedami, & Lugduni Batavorum in* 8. *cum Tabulis aeneis. Vol.* 1. 1749. *-- In his plura ad historiam, naturam, & descriptiones Avium habentur, quae singillatim recensere longius quidem foret.*

— Museum Adolphi Friderici Regis *&c. Holmiae* 1754. *in fol. cum Tabulis* 33. *nitidissimis aeneis -- Describuntur Animalia rariora inprimis, & exotica quadrupedia, Aves &c. adiectis nominibus Latinis & Svetic.*

— *Iter Oelandicum, & Gothicum. Stockholmiae* 1742. *in* 8. *Lingua Svecica.*

— *Iter Westrogothicum. Stockholmiae* 1747. *in* 8. *ac* 1750. *Lingua Svecica.*

— *Itinera per diversas Sveciae Provincias, Svecica lingua descripta, & primum Stockholmiae edita, Germanice inde conversa. Lipsiae* 1756. *in* 8. *cum figuris.*

— De Pico pedibus tridactylis. *Act. Svec. ann.* 1709.

— De Passere nivali. *Ibidem.*

— De Procellaria Ave. *Act. Svec.* 1745.

— De Passere Indico. *Act. Svec.* 1750.

— De Ampelide, seu Pico nidum suspendente. *Ibidem.*

— De Fringilla dorso viridi abdomine fulvo. *In Act. iisd. Svecicis.*

— De Phryganea alis flavo, nigroque variegatis. *Ibidem -- Descriptiones hae omnes Avium in Actis Svecicis insertae Svecica extant lingua, nonnullae vero Latine conversae editae sunt in Analeptis Transalpinis. Venetiis.*

Listeri (*Martini*). Additamentum in Synopsim Avium Raii, *Extat in Transationibus Philosoph. Anglicis Vol.* 15. *num.* 175.

— Philosophical Letters bebwin the learned Mr Ray and Several of the ingenious correspondents, tho which are addet those of Willugby *&c. Scilic. Epistolae Philosophicae inter doctissimum Virum Dominum Raium, & sapientes varios amicos, quibus adiunctae sunt Willugbei Epistolae. Maxima harum pars de praecipuis, & selectis Historiae naturalis argumentis agunt, ac signanter de Quadrupedibus Avibus, Insectis &c. Londini* 1718. *in* 8. = *Opus est posthumum a W. Derham in lucem editum.*

— Historia Animalium Angliae. *Londini* 1678. *in* 4. *cum figuris.*

— Adnotationes in Caelii Apicii de Opsoniis & condimentis, sive Arte Coquinaria libri decem *&c. cum notis*

tis Humelbergii, Barthii, Reineſii Vander Linden, & aliorum. Editio ſecunda, longe auctior atque emendatior. Amſtelodami 1709. *in* 8.

Lithenius, & Rorerg. De Lagopode. *Upſaliae* 1732.

Locheri (*Michel. Frider.*) De Ananaſa, ſive Nuce Pinea Indica *&c. Norimber.* 1716. in 4. *cum Tab. aeneis.* De Ave Melliſuga, *aliter* Colibri, *vel* Ave Muſca *nuncupata, accuratam habet deſcriptionem, atque de eiuſdem nido agit magna ex parte materia ab Ananaſae fructu ab Ave decerpta conſtructo.*

Lock (*Io.*) a collection of Voyages *&c. Scil.* Collectio Itinerum *&c. Londini* 1752. *Vol.* 8. *cum figuris -- Inter alia Animalia quadrupeda, Aves, Piſces, Serpentes, Arbores, Flores, & Fructus deſcribuntur.*

Loeflingi [*P.*] Iter Hiſpanicum. *Holmiae* 1758. *in* 8.

Long (*Iacobi le*). De Scriptoribus Hiſtoriae naturalis Galliae. *Vide* Scheuchzeri *&c.*

Lonicerus (*Adamus*). *Nonnulla habet de Plantis, de Avibus, de Piſcibus, & Metallis in Opere Germanico cum iconibus in folio. Francofurti ad Moenum* 1582. *&* 1630. -- *Ulmae* 1737. *cum additamentis Balth. Ehrhanti.*

Longolius. Dialogus de Avibus 1544.

Lopes [*Ferdinando*]. Iſtoria dell' Indie Orientali. *Venezia* 1758. *in* 4.

Loubere. Deſcription du Royaume de Giam. *Amſtelodami* 1714. *Tom.* 2. *in* 4.

Lucas [*Pauli*]. Voyage dans la Turquie, l'Aſie, Sourie, Paleſtine, Egypte *&c. Amſtelodami* 1720. *T.* 2. *in* 12.

— Voyage an Levant. *Hagae* 1709. *T.* 2. *in* 12.

— Voyage dans la Grece, l' Aſie Mineure, la Macedoine, & l' Afrique. *Amſtelodami T.* 2. *in* 12.

Ludolfi (*Iobi*), *aliis* Levtholf. Hiſtoria Aethiopica. *Francofurti ad Moenum. Ann.* 1681. *in folio cum Tabulis aeneis.*

— Commentarius ad Hiſtoriam ſuam Aethiopicam. *Francofurti ad Moenum* 1691. *in fol. cum figur.*

— Appendix prima ad Hiſtoriam Aethiopicam Iobi Ludolfi, *Francofurti ad Moenum* 1693.

Magazin. Bremes Magazin. *Hoc eſt Promptuarium Bremenſe. Bremae Lingua Germanica in* 4.

— Hamburgiſches Magazin. *Scil. Promptuarium Hamburgienſe.*

— Hollands Magazin *&c. Scil. Promptuarium Belgicum. Harlemi Lingua Belgica exaratum in* 8.

— London Magazin *&c. V.* Urban *&c.*

— Allgemeines Magazin der natur, Kunſt und Wiſsenſchaften. *Hoc eſt: Promptuarium univerſale naturae, Artis, & Scientiorum. Lipſiae* 1753. *in* 8. *T.* 2. -- *In volumine* 2. *agitur de Paſſerum noxa, & Io. Sloani rerum naturalium Theſauro.*

Maii [*Io. Henrici*]. Hiſtoria Animalium in Sacro in primis Codice memoratorum *&c. Francofurti, & Spirae* 1686. -- *Ab hoc Auctore per ſingula fere capita opus Samuelis Bocharti augetur, & emendatur.*

Maier [*Mich.*] De volucre arborea in Inſulis Orcadibus proveniente. *Francofurti* 1719. *in* 8.

Maillet. Deſcription de l' Egypte, par Mr l' Abbè le Maſcrier, *in* 4. *&* *in* 12.

Marcgravii [*Georgii*]. Hiſtoria rerum naturalium Braſiliae libri 8. *Extat poſt Guilelmi Piſonis de Medicina Braſilienſi libros* 4. *in fol. Lugduni Batavorum, & Amſtelaedami* 1648. *cum figuris ligneis -- Marcgravii liber* 5. *agit de Avibus.*

Marsilii (*Aloyſ. Ferd.*) Prodromus operis Danubialis. *Amſtelaedami, & Hagae Comitum in* 8. *abſq. anno.*

— Danubius Pannonico Myſicus. *Hagae* 1726. *& ſeq. in fol. Vol.* 6. *cuius Prodromus anno* 1700. *in fol. prodiit. Hiſtoria naturalis, ac praeſertim plurium Avium deſcriptiones, & icones in ultimo Tomo continentur. Volumen* 5. *Aves Danubiales ſiſtit. Vol.* 6. *obſervationes nonnullas anatomicas continet in Animalibus, inter quae Aquila Melanaëtos, & Onocrotalus examini ſubiiciuntur.*

— [*A. P.*] *Aves Hungaricas inprimis deſcriptas, & depictas dedit.*

Martens [*Friderici*]. *Italice* Martini. Viaggi di Spizberga, o Groenlanda, fatto da Fed. Martens Amburgheſe l' anno 1671. portato nuovamente dalla lingua Alemanna nell' Italiana. *Bologna* 1683. *in* 12. *Germanice prodiit Hamburgi* 1675. *in* 4. *& variis aliis linguis, Londini, & Amſtelodami recuſus, egregius ſane liber -- Diverſarum marinarum Avium illius regionis notitiam tradit, & quarumdam etiam icones exponit. Alia extat editio Germanica lingua exarata, ſed de hac notitiam non habuimus.*

Matthiolus (*Petrus Andreas*). *Nonnulla habet de Avibus in libro ſecundo Commentariorum Dioſcoridis de materia medica -- Innumerae extant Matthioli operis editiones, ac in plures linguas verſae, & pluribus etiam normis; extant pariter eiuſdem operi a pluribus addita commentaria, ut a Camerario, & Bauhino, & nonnullae pariter prodierunt editiones contractae, ſive operis ipſius compendia; omnes vero editiones figuris refertiſsimae ſunt.*

Meyer [*Io. Daniel*]. *Lingua Germanica, tractat de Quadrupedibus, Avibus, Amphibiis, & Piſcibus. Norimbergae* 1748. *in fol. cum figuris -- Animalia, quae hic Auctor exhibet, illa nullo ordine ſyſtematico proponit, ſed ipſorum nitidiſsimas & coloribus accuratiſsime illuminatas tradit figuras, additque Animalium omnium in opere contentorum proprium Sceleton. Pictor Norimbergenſis numeroſa animalia, inter quae plures Aves, edidit vivis coloribus picta, cum ſceletis, ab anno* 1749. *utili omnino inſtituto.*

Melanges d' Hiſtoire naturelle. *Lugduni* 1763. *Tom.* 2. *in* 12.

Mémoires pour ſervir à l' Hiſtoire des Animaux. *Pariſiis ann.* 1676. *in fol.* -- *Cuius aliqua pars Pariſiis annis* 1667. *&* 1682. *in* 4. *prodierat. Plenior vero, multiſque animalibus aucta editio inſerta eſt in* Mémoires de l' Academie avant l' an. 1699. *partemq. tertiam conſtituit. Deſcriptiones ſunt, & diſsectiones quadrupedum Animalium, Avium, & Piſcium paucorum, qui in Regiis vivariis conſervati, ab Academicis*

micis, Perrolto maxime, & Duverneyo, diſsecti ſunt. Splendidae icones, dimenſiones ſollicitae, & anatome, ſed hinc inde paulo vitioſior, ut in poſterioribus monumentis paſsim corrigi oportuerit. Eas deſcriptiones Anglice reddidit Alex. Pitfield, & edidit Londini 1687. in folio.

Merredti [*Chriſtopbori*]. Pinax rerum naturalium Britannicarum *&c. Londini 1667. 1677. & 1704. in 8. Nonnullae in hoc opere optimae Avium icones oſtenduntur.*

Miſcellanea Berolinenſia ad incrementum Scientiarum *&c. Berolini in 4.*

— Curioſa, ſive Ephemeridum Medico.Phyſicarum Germanicarum Academiae Naturae Curioſorum. *Francofurti, & Lipſiae in 4.*

Monti [*Caietani*]. De Paro minimo, Bononienſium Pendulino, *In Actis Scientificis Inſtituti Bononienſis T. 2. Part. 2. pag. 56.*

— De Naſuto, ſive Rhinocerote Ave, *Ibid. T. 3. pag. 298.*

Moehringi [*Paul. Henr.*] Avium genera. *Auricae 1752. in 8. -- Amſtelaedami 1758. -- Belgice vertit, & notas adiecit Corn. Nozeman, atque cum notis ulterioribus edidit Arn. Voſmaer -- Paulus Henricus Moebringius Avium genera, & ſpecies nova methodo a ſe excogitata tradit, cuius methodi, ſive Syſtematis Synopticam Tabulam Italice & Latine verſa ſiſtitur ſupra in operis huius Vol. 1. ubi de variis Syſtematibus ſermo habetur.*

Moulini. In capitibus Avium obſervationes anatomicae. *Extant in Tranſact. Angl. num. 137.*

Nierembergii [*Io. Euſebii*]. Hiſtoria naturae maxime peregrinae libris *16.* diſtincta *&c. Antuerpiae 1635. in fol. cum figuris -- In hoc opere rariſsima naturae arcana, & ignota Indiarum Animalia, inter quae Aves deſcribuntur. Accedunt etiam de miris & miraculoſis naturis in Europa Libri 2. &c.*

Nicrisolii [*Franc.*] De Onocrotalo. *In exercitationibus Ferrariae 1720.*

Norrelius (*Andreas*]. De Avibus Israëlitis in cibum conceſſis. *Amſtelodami 1720. in 8.*

— De Avibus eſu licitis. *Upſaliae 1746. in 4. -- Erudita eſt Diſsertatio ex antiquitatibus praecipue deſumpta.*

Oeconumiſch-Phyſicaliſche Abhandlungen *&c. H. e. Oeconomico-Phyſicae Diſſertationes. Lipſiae. Partes plures in 8. diverſis annis editae. Pars 5. 1753. prodiit. In hac quinta operis parte continetur Hiſtoria naturalis Columbarum, agiturque de diverſis earumdem ſpeciebus, vitae genere, cibo, concubitu, ſtructura partium, qualitatibus, & proprietatibus.*

Olearii [*Adami*]. Gottorffiſche Kunſt-Kemmer, Warinnen allerhand ungemeine ſachen, ſo theils die natur *&c. Scil. Muſeum &c. Sleſvici 1666. & 1674. in 4. cum Tabulis aeneis.*

Olina [*Gio. Pietro*]. Uccelliera, ovvero Diſcorſo della natura, e proprietà di diverſi Uccelli, e in particolare di quei, che cantano, con il modo di prendergli, conoſcergli, allevargli, e mantenergli, con le figure cavate dal vero, e diligentemente intagliate dal Tempeſta, e dal Villamena. *In Roma 1622. in 4. appreſso Andrea Fei. 1684. appreſso M. Angelo de' Roſsi -- In hoc libro 40. Avium accuratiſsimae extant icones.*

Osbeck [*P.*] Iter Indiae Orientalis. *Holmiae 1757. in 8.*

Pecklini [*Io.*] De Aeris & Alimenti defectu & vita ſub aquis. *Kiloni 1667. in 8. -- Loquitur de vita Hirundinum ſub aquis, quas Aves in Mare demergi, non in alias regiones migrare exiſtimat.*

Pennat. Explanation of the Plates contained in the firſt publication of the British Zoology. *Scil. Explicatio Tabularum ad primam Zoologiae editionem Britannicam pertinentium. Londini 1763. in 8. -- Tabulae in hac prima collectione editae atque diſtributae numero fuerunt 24. in folio maximo figuris mirifice ad naturae normam coloratis, inde aliae prodierunt uſque ad numerum 135. in quibus non ſolum Aves, ſed & Quadrupeda animalia totius Britanniae depinguntur. Integrum Opus in 5. dividitur partes, quae in unico volumine adligari poſſunt, & ad eaſdem pertinent perbreves, atque diſiunctae, Anglico ſermone exaratae explicationes. Naturalis Hiſtoriae amantiſſimus, & accuratiſſimus hic Auctor duo Volumina in octavo edere quamprimum decrevit, in quorum primo ampliores deſcriptiones memorati ſupra operis tradentur, in ſecundo vero Appendix eorum animalium, quorum ſpecies bis diebus deperdita in Britanniae, eſt habebitur. In horum cenſu ex. gr. Lupus inter Quadrupeda, Orogallus maior inter Aves ſunt.*

Perrault. Memoires pour ſervir a l'Hiſtoire naturelle des Animaux. *a Amſterdam, & Leipſie 1758. T. 4. in 4. -- Ornithologica in hoc opere contenta ſunt, Deſcriptio, & Anatome Corvi aquatici, Galli Indici, ſive Mituporange Marcgravii, Gruis Numidicae, Meleagridis, Aquilae, Otidis, Struthionis, Caſuarii, Plateae, ſive Ardeae albae maioris Willughbeii, Phoenicopteri, Porphyrionis, Ibidis, Ciconiae, Pelecani, Gruis Balearicae, & Vulturis magni Ariſtotelis.*

— Eſsais de Phyſique *T. 3. Pariſiis 1680. in 12. -- Multa circa peculiares partes Animalium, & ſignanter de Avium interna, ac diverſa ſtructura continet.*

Petini. Epiſtola de Avibus Germaniae, praeſertim Sylvae Herciniae ad D. Fr. Erneſt. Bruckmannum. *Pappenheim 1745. in 4,*

Petiveri (*Iacob*). Muſei Petiveriani Centuriae decem, rariora naturae continentes, videlicet Animalia, Foſſilia, Plantas, ex variis mundi plagis advecta, ordine digeſta, & nominibus propriis ſignata. *Londini in 8. -- Centuria prima edita eſt 1695. Centuria ſecunda & tertia 1698. Centuria quarta, quinta, ſexta, & ſeptima 1699. Centuria octava 1700. Centuria nona, & decima 1703.*

— Gazophylacii naturae & artis Decades decem, in quibus Animalia quadrupedia, Aves, Piſces &c. deſcriptionibus brevibus, & iconibus illuſtrantur. *Londini 1702. in folio -- Eiuſdem Petiverii extant adnotationes & illuſtrationes circa nonnulla animalia ad ipſum miſsa e Marylandia a Dom. Hugone Iones in Tranſactionibus Philoſophicis Anglicanis Vol. 20. n. 246.*

PEUCERI [*Caſpari*]. Appellationes Quadrupedum, Inſectorum, Volucrum *&c. Lipſiae* 1550. *in* 8. *Wittembergae* 1551. *pariter in* 8.

PHILE [*ſive* PHILETES]. Του Σοφωτατου Φιλη Στικοι Ιαμβικοι Περι Ζωων Ιδιοτητος. *Verſus Iambici de Animalium proprietate, cum Auctario Ioachimi Camerarii. Expoſita primum eodem metro extat verſio latina a Georgio Berſmanno Annaebergenſi, Lipſiae* 1575. *in* 4. *& Traiecti ad Rhenum* 1730. *in* 4. *Quarumdam Avium proprietates, licet infirme, in hoc Poemate expendit Auctor. Loquitur de Aquilis, Vulturibus, Struthione magna, Ardeis, Corvo, Ciconiis, Pavone, Pelecano, Cycno, Gruibus, Perdicibus, Gallinaceo, Anate, Anſere, Ibi, Luſcinia, Hirundine, Palumbis, Turturibus, Noctua, & Cuculo. Excripſit fere Aelianum.*

PICTORII [*Georgii*]. Medicina ſimplex & compoſita, acceſſit de natura Leporum, Animalium Quadrupedum, & Avium, item cum Conſtantini Africani eiuſdem argumenti Libello, & Appiani Tractatu de Piſcibus. *Baſileae* 1560. *in* 8.

PIGAFETTA [*Filippo*]. Relazione del Reame del Congo, e delle circonvicine contrade. *Roma* 1591. *in* 4. *In hoc opere nonnulla animalia Aſiatica, praecipue Aves deſcribuntur. In collectione Aſiatica itinerum Theodori de Bry prodiit Francofurti* 1598. *in fol. & acceſſerunt icones Plantarum, & Animalium.*

LISONIS [*Guilielmi*]. De Indiae utriuſque re naturali, & medica libri 14. *Amſtelaedami* 1658. *in fol. cum figuris ligno inciſis -- Agit hic Auctor praeter multa alia de Animalibus etiam aquatilibus, volatilibus, & terreſtribus edulibus. Hiſce ſubſequuntur nonnulla ſcripta Marcgravii, & Bontii.*

— Hiſtoriae naturalis, & medicae Indiae Occidentalis libri 5. *Amſtelodami* 1650. *in fol.*

— De Medicina Braſilienſi libri 4. ſimul cum Marci Gravii Hiſtoria Braſiliae a Laetio. *Lugduni, & Amſtelodami* 1648. *in fol.*

PITCARNII [*Archibaldi*]. Diſſertatio de Legibus Hiſtoriae naturalis. *Edimburgi* 1696. *in* 12. *Edita inde fuit Roterodami* 1714. *in* 4. *in eius operibus medicis; iterum Venetiis cum reliquis Auctoris operibus* 1716. *in* 4. *atque Lugduni Batavorum* 1737. *pariter in* 4. -- *In memorata hac Diſſertatione acerrimam agit Pitcarnius cenſuram contra Robertum Sibbaldum Scotum, qui Scotiam illuſtratam, ſive Prodromum Hiſtoriae Naturalis Scotiae edidit.*

PIVATI [*Io. Franciſci*]. Nuovo Dizionario Scientifico, e curioſo *ec. Venezia* 1749. *Tom.* 10. *in fol. cum fig.*

PLINIUS [*Caius Secundus*]. *Hiſtoriam Mundi libris* 37. *conſcripſit. Huius Hiſtoriae praecipuas, atque permultas editiones, & in alias linguas translationes enumeravit ordine Seguierius in ſua Bibliotheca Botanica, nec non Gronovius in Bibliotheca Regni Animalis, ideoque earumdem notitia ſupervacaneum omnino eſt, ut hic inferatur, cum praecipue nullus ſit, qui in domeſtica ſua Bibliotheca Plinianae Hiſtoriae aliqua careat editione. Naturae hic contemplator omnia, quae ex ſcriptis, relationibuſque aliorum colligere potuit, Hiſtoria ſua naturali perſcripſit. Huius libro* 10. *varia de Avibus, eaque lectu digniſsima traduntur, exiguo tamen ſcientiae augmento, ſiquidem notae Avium characteriſticae a roſtro, pedibus, pennis &c. deſumendae quaſi ubivis deſunt. Iuſuper mirabilium cupidus atque credulus plurima in Hiſtoria ſua inſeruit, quae peritum naturae ſcrutatorem, & verum Phyſicum haud parum dedecebant.*

PLUCHE. Spectacle de la Nature, ou Entretiens ſur les particularités de l' Hiſtoire naturelle *in* 8. *quae ſunt cum Tabulis aeneis pluribus Voluminibus digeſtae -- Plurimae huius operis extant editiones, nempe Gallica. Pariſiis Vol. IX. Ultraiecti* 1735. *Tom.* 8. *Belgica Hagae Comitum* 1737. *&* 1748. *Tom.* 10. -- *Hiſpanica Metriti* 1752. *in* 4. -- *Italica Venetiis* 1743. *in* 8. *Tom.* 14. *Tomus ſecundus editionis Gallicae, & Italicae agit de Avibus in genere, & de Avibus rapacibus.*

POMET [*Petri*]. Hiſtoire générale des Drogues. *Pariſiis* 1694. *in fol. Plurima de Avibus occurrunt.*

PONTOPPIDANS [*Enrich*]. Verſuch einer naturalichen Hiſtoirie von Norwegen &c. *Scil. Hiſtoria naturalis Norvegiae. Hafniae* 1752. *in* 4. -- *Ex Danico in Germanicum vertit idioma Io. Adolphus Schlieben Hafniae in* 8. *Tomis duobus, ſive partibus; pars prior* 1752. *pars poſterior* 1754. *Anglice pariter verſa edita eſt Londini* 1755. *in* 8. -- *Norvegiae Aves hic deſcribuntur, & Tabulis aeneis illuſtrantur. Animadverſiones nonnullae in hunc Librum leguntur in Gentlem. Magaz. Vol.* 25. *pag.* 321.

PRAETORII [*Io.*] De Crotaliſtria tepidi temporis hoſpite. *Lipſiae* 1672. *in* 4. -- *Avem hanc hyeme non avolare, ſed latere cum Kleinio docet.*

PREVOST. *Hiſtoire des Voyages. Pariſiis* 1753. *& ſeq. Tom.* 64. *in* 12. *cum fig.*

RABANI [*Mauri*]. *Exemplar vetuſtiſſimum, abſque titulo, ac litteris initialibus, impreſſum vidit Laurentius Theodorus Gronovius, in* 22. *libros diviſum, de Animalibus, & Foſſilibus, ac Mineralibus. In libro* 8. *agit hic Auctor de Avibus.*

RAII [*Io.*] Synopſis methodica Avium, & Piſcium opus poſthumum. *Londini* 1710. *&* 1713. *in* 8. -- *Haec Raii Synopſis breves & diſtinctas plurium Avium deſcriptiones plauſibili ordine diſpoſitas continet, ut videre eſt in Vol.* 1. *noſtrae Ornithologiae, ubi diverſorum Auctorum methodos perſtrinximus. Memoratus hic Auctor Aves ex omni Telluris parte in colligendo a Sloanio, aliiſque huius ſcientiae amatoribus haud leviter adiutus eſt.*

— Collectio itinerum ab eodem inſtitutorum [*Anglice*]. *Londini* 1738. *in* 8.

— A collection of English Words not generally uſed, with Catalogues of Engliſd. Birds, and Fishes, metals, minerals *ec. Hoc eſt Collectio nominum minus in Anglia uſitatorum cum Catalogo Avium, Piſcium, Metallorum, & Mineralium Angliae ec. Londini* 1671. *in* 12.

RAMUSIO [*Gio. Batiſta*]. Delle Navigazioni, e Viaggi Vol. 3. edizione ſeconda corretta, ed ampliata, *in fol.*

fol. Venetiis Vol. 1. 1554. *Vol.* 2. 1559. *Vol.* 3. 1556. -- *Volumen enim tertium ante ſecundum editum fuit. Multa de Avibus Indicis, tum terreſtribus, tum maritimis, earumque per Inſulam Cubam ingenti, ac memorabili tranſitu explanantur.*

RAIMONDI (*Eugenio Breſciano*) Delle Cacce libri quattro, *a Breſcia in* 4. *con fig. In Napoli* 1626. *parimente in* 4. *con figure, nuova impreſſione coll' aggiunta del quinto libro della Villa. Ab hoc multa mutuavit Olina.*

Rei Accipitrariae Scriptores. *Lutetiae* 1612. *in* 4.

REAMUR (*Made*) L' art de faire eſclorre & d'elever en toute ſaiſon des Oiſeaux domeſtiques de toutes eſpéces *ec. in* 12. *Vol.* 2. -- *Extat prima, & ſecunda editio, utraque cum figuris. Pariſiis, & Hagae Comitum* 1750. 1751. *Anglice pariter prodiit in* 8.

ROBERT (*Nicolai*) Recueil des Oiſeaux les plus rares tirez de la Menagerie Royale du Parc de Verſailles, deſtinez, & gravez d' apres la nature. *à Paris* 1676. *in fol.*

ROBERG, & LITHENIUS. De Lagopode. *Upſaliae* 1732. *in* 4.

ROCHEFORT. Hiſtoire des Isles Antilles. *Roterodami* 1662. *in* 4.

ROQUE [*de la*]. Voyage de Syrie, & du Mont Liban *a Amſterdam* 1725. *Tom.* 2. *in* 12.

—— Zodiacus Medico-Gallicus, ſive Miſcellaneorum Medico-Phyſicorum *ec.* Opera Nicolai de Blegny, & de la Roque. *Pariſiis in* 4.

RORARII [*Henrici*]. Quod animalia ratione melius utantur. *Helmſtadii* 1728. *in* 8. *cum notis uberrimis I.H.Ribovii.*

RUDBECKII. Avium picturae, de quibus frequenter ſermonem agit Linnaeus in Fin. Svec.

RUYSCH [*Friderici*]. Theatrum univerſale omnium Animalium. *Amſtelodami* 1718. *Vol.* 2. *in fol.*

—— Theſaurus Animalium primus *Amſtelodami* 1710. *in* 4.

—— Auctarium Hiſtoriae naturalis *ec. Gedani* 1745. *in* 4.

RUSSEL [*Alexandri*]. A natural Hiſtory of Aleppo and parts adiacents &c. *Londini* 1756. *in* 4. *cum tab.* 16. *aeneis* -- *Plurima animalia, inter quae & Aves, incognita, & rara deſcribuntur, atque iconibus nitidiſſimis illuſtrantur.*

RUTENSCHIOELD. De Tetraone Spurio. *Act. Svec.* 1744.

RZACZINSKY (*Gabrielis*). Hiſtoria Naturalis curioſa Regni Poloniae *ec. in Tractatus* XX. *diviſa*. Sandomiriae 1721. *in* 4. *Omnes fere Aves huius Regni in hoc opere deſcribuntur.*

SCHELHAMERI [*Guntberi Chriſtoph.*]. Ciconiae Anatome. *Miſcell. Nat. Cur. Dec.* 2. *ann.* 1. 1682. *obſ.* 130.

—— De Avibus erectis incedentibus. *Miſcell. Nat. Cur. Dec.* 2. *ann.* 9. 1690. *obſ.* 145. & 147.

SCHEUCHZERI [*Io. Caſp.*] Phyſica ſacra. *Auguſtae Vindelicorum* 1735. *Tom.* 4. *in fol. cum Tabulis* 750. *nitidiſſimis aeneis* -- *Amſtelaedami* 1735. *textu Belgico Tom.* 15. -- *Hiſce tabulis plures Aves exhibentur, Deſcribuntur vero Aquila, Gyrfalco, Alietus, Milvus, Vultur, Corvinum genus, Struthio, Noctua, Accipiter, Bubo, Onocrotalus, Ardea, Ibis, Cycnus, Pelecanus, Ardea ſtellaris, Meros, Vultur aureus. Ardea caerulea, Pulica, Milvus ceruginoſus, Chryſaeton, Ciconia, Hirundo, Graculus, Falco, Charadrion, Pſittacus, Urogallus, Upupa, Pygargus, Grus, Paſſer, Pavo &c.* -- *Inſuper celeberrimi huius Auctoris extat Anatome Ardeae Stellaris, & Colimbi maximi caudati, in Actis Breslavienſibus ann.* 1725. *Anatome Vulturis Boëtici in Actis iiſdem ann.* 1726.

SCHEUCZERI (*Io. Iac.*) Bibliotheca Scriptorum Hiſtoriae naturalis omnium Terrae regionum *&c.* & Iacobi Le Long Tractatus de Scriptoribus Hiſtoriae naturalis Galliae. *Tiguri* 1716. in 4. *Ibid.* 1751. *in* 8.

SCHOTTI (*P. Caſp.*) Phyſica curioſa, ſeu mirabilia naturae. *Herbipoli* 1667. *in* 4. -- *Agitur in hoc opere de Monſtris, Quadrupedibus, Avibus, Piſcibus &c.*

SCHWENCKFELD [*Caſp.*]. Therco-Tropheum Sileſiae, in quo Animalium, hoc eſt Quadrupedum, Reptilium, Avium *&c. natura, vis, ac uſus ſex libris perſtringuntur. Lignicii* 1603. *in* 4. -- *Libro* 4. *comprehenduntur Aves ordine alphabetico. Deſcriptiones harum optimae ſunt, licet nimis compendiariae, paucioreſque notas, ut facile diſtinguantur, attingentes, cum figuris praecipue careat opus.*

SEBA (*Albertus*). Locupletiſſimi rerum naturalium Theſauri accurata deſcriptio *&c. Amſtelodami* 1734. & 1735. *Vol.* 2. *in fol.*

SELIGMANN [*I. Mich.*] *Aves ex Catesby naturali Hiſtoria excerpſit, & ſeorſim excuſas dedit Norimbergae* 1749. & 1750. *in fol. adiectis ex Georgii Edwardi iconibus - Plurimae Aves naturalibus coloribus in hoc opere repraeſentantur.*

SHAW (*Thom.*) Travels and obſervations relating to ſeveral parts of Barbary and the Levant. *Scil. Itinera & Obſervationes in diverſis Africae, & Orientis partibus inſtitutae. Oxonii* 1738. *in fol.* -- *Vir doctus & veri amans Africae Septemtrionalis, in qua multis annis vixit, Aegypti, & Paleſtinae Hiſtoriam naturalem tradit, cum iconibus nonnullis.*

SIBBALDI (*Roberti*). Scotia illuſtrata, ſive Prodromus Hiſtoriae naturalis Scotiae. *Edimburgi* 1684. *atque* 1696. *in fol. cum tabulis aeneis, rudibus tamen n.* 22. -- *Binae hae editiones omnino eaedem ſunt, in poſteriore anno impreſſionis tantum mutato. In hunc librum ſeveriſſimam criticam Archibaldus Pitcarnius conſcripſit. Sibbaldus revera, abſque criterio & examine omnia ab aliis mutuatus eſt, & errores innumeros praxi atque iudicio commiſit, ut quiſque in Hiſtoria naturali vel minimum edoctus ab ipſa operis lectione, vel a Pitcarni cenſura erudiri facile poteſt.*

SIDREN. De materia medica, & regno Animali Diſſertatio. *Upſaliae* 1750. *in* 4.

SLOANE (*Hans*). A Voyage to the Islands Madera, Barbados, Nieves, St. Chriſtophers, and Iamaica, with the

the natural Hiſtory of the Herbs and Trees, Four-footed Beaſts, Fishes, Birds, Inſects, Reptiles &c. *Hoc eſt : Iter ad Inſulas Maderam, Barbados, Nivium, S. Chriſtophorum, atque Iamaicam, cum naturali deſcriptione Herbarum, & Arborum, Quadrupedum, Piſcium, Avium, Inſectorum, Reptilium &c. Londini Vol. 2. in fol. cum fig. Tom. 1. 1707. Tom. 2. 1725.*

— **An** account of prodigiously large feather on the Bird Cuntur brought from Chili, and ſupposed to be a Kind of Vultur. *Scil. Hiſtorica Deſcriptio permagnae Avis, nomine Cuntur, e Regno Chili allatae, atque pro ſpecie Vulturis exiſtimatae. Extat in Tranſactionibus Philoſophicis Angl. Vol. 18. num. 208. p. 61.*

— Muſei Sloanii Index generalis in Anglico Promptuario. *Scil. Gentl. Magaz. exhibetur in V. 22. p. 101.*

STALPARTI VANDER WIEL (*Cornelii*). Obſervationes rariores medicae. *Leidae 1727. in 8. cum Tabulis aeneis pag. 463. atque Tab. 1. deſcribitur oſtenditurque Indica Avis* Topan *dicta.*

Storia generale de' Viaggi, o Raccolta di Relazioni di Viaggi per Mare, e per Terra. *Venezia 1751. Tom. 30. in 8.*

TERTVE [*Le P. du*]. Hiſtoire des Iles Antilles *&c. Pariſiis 1654. in 4. & plenius 1667. & 1671. in Vol. 4. Volumen ſecundum noſtri ſcopi tantum eſt, reliqua fere Hiſtorica ſunt, & in minutiis verſantur ; volumen vero id perutile eſt, & ex eo reliqui ſcriptores multa hauſerunt. Inter naturalia producta, animalia ſatis copioſe deſcribit, & depingit ex propria obſervatione.*

TESDORPF [*Petri Henrici*]. Verſuch einer beſchreibung von dem *&c. Scil. Deſcriptio Colibri Avis. Lubecae 1753. in 4. -- Deſcriptio huius Avis poetica eſt, atq. ſuppreſſo Auctoris nomine prodiit.*

TITIUS [*Io. Daniel*]. De Paro minimo, Polonorum Remiz, Bononienſium Pendulino ; *Lipſiae 1755. in 4. cum Tabulis aeneis -- Huius Avis deſcriptionem dedit pariter doctiſſimus Caietanus Monti in Commentariis Inſtituti Scientiarum Bononienſis T. 2. P. 2. pag. 56.*

TOLLOT. Nouveau Voyage fait au Levant dans les annés 1731. & 1732. *Pariſiis* 1742. in 12.

TOREN (*O.*) Iter Surattenſe. *Holmiae 1757. in 8. cum Oſbechii Itinere Indiae Orientalis.*

TOURNEFORT [*M. Piton de*]. Relation d' un Voyage du Levant fait par ordre du Roy *&c. à Paris Tom. 2. in 4. cum Tabulis aeneis -- à Lyon 1727. T. 3. in 8. max. -- Diarium ſui Itineris in Epiſtolas 22. dividit Auctor. In Epiſtola 10. de Attagene loquitur, cuius Avis accuratiſſimam addit iconem. In Epiſtola 6. 9. & 22. de magna atque incredibili Perdicum copia, qua Inſulae Scio, Samos, & Nanfio ſcatent, diſſerit, cum notitia venationis, pretii, & cicurationis earumdem apud praedictarum Inſularum inhabitantes. Item in Epiſtola 19. Avem ſingularis pulchritudinis* Roy des Corbeaus *ab ipſo nominatam, & in Armenia cum aliis Avibus e genere Ardeae, & Ardeolae viſam deſcribit.*

Tranſactions (The Philoſophical Tranſactions *&c.*) *Londini in 4.*

— Philoſophiques de la Societé Royale de Londres depuis l' année 1665. juſque en 1735. *Pariſ. T. 11. in 4. cum fig.*

TURNERUS [*Wilhelmus*]. Avium praecipuarum, quarum mentio fit apud Plinium, & Ariſtotelem brevis Hiſtoria. *Coloniae 1544. in 8.*

VALENTINI [*Mich. Bernard.*]. Amphitheatrum Zootomicum, tabulis aeneis exhibens Hiſtoriam Animalium anatomicam. *Giſsae, & Francofurti 1720. in fol. -- Ibidem 1742. editio ſecunda. --- Pars operis ſecunda ſiſtit Anatomicam deſcriptionem Aquilae, Struthionis, Caſuarii, Domicellae Numidicae, Tetraonis, Ardeae, Ciconiae, Cycni, Anatis, atque Anſeris, Gallinae, Meleagridis, Galli Indici, Pavonis, Columbae, Pſittaci, Cornicis, Picae, Milvi, Corvi, atque Coracis, Noctuae, Pici, Garruli &c.*

— Oder Natur-und Mineralien Kammer *&c. Scilicet Muſeum Muſeorum Francofurti ad Moenum T. 3. in fol. cum Tab. aeneis Tom. 1. 1704. Tom. 2. & 3. 1714. -- Latine redditum prodiit Francofurti 1716. pariter in fol. -- In Vol. primo continentur de Pavone nonnulla, de Avibus Paradiſiacis, Manucodiatis, & Regiis -- Contenta editionis originalis Germanicae multum a Latina differunt -- In Vol. 2. Germanico ex. g. de Ave Colibry, & aliis Aviculis, de Avibus monſtroſis, ac de Ovis pariter monſtroſis, plura continentur, quae in Latino deſiderantur. His accedit recitatio Rariorum, quae in Muſeis Curioſorum variis exhibentur.*

— Prodromus Hiſtoriae naturalis Haſſiae. *Giſsae-Haſsorum 1707. in 4.*

VALENTYN [*Franc.*] Beschryving van oud en Niew Ooſt-Indien. *Scil. Deſcriptio Sylvarum Americae, ſive Indiarum Occidentalium Amſtelaedami 1724. & 1726. in Tom. V. Tomus tertius huius operis Hiſtoriam naturalem totius Indiae Occidentalis pertractat, ac plures Aves inter alia deſcribit, earumdemque aliquas tabulis repraeheſentat.*

VALVASONE [*Eraſmo*], La caccia ricorretta, e ampliata Libri V. in ottava rima, con annotazioni di Olimpio Marcucci. *Venezia 1602. in 8. -- Nel libro V. ſi ragiona degli Uccelli di rapina, delle regole di ammaeſtrarli, di ſervirſene, e di medicarli, con più, e diverſe notizie ſopra i Cani da penna.*

VARGETIN [*Petrus*]. *Nonnulla Ornithologica habet in Actis Acad. Sveticae Vol. 13. pag. 167.*

VOIGTII [*M. Godofredi*]. Curioſitates Phyſicae *&c. Lipſiae 1698. in 12. -- Inter alia de cantu Cygneo, an Cycnus ſuaviter cantet, & prae primis cum morti eſt vicinus, agit.*

VOTTON [*Eduardi*]. De differentiis Animalium Libri decem, in quibus omnium Animalium nomenclaturae, item ſingulae eorum partes recenſentur tam Grecae, quam Latine. *Lutetiae Pariſiorum 1552.*

ULLOA [*Antonius de*]. An account of the Condore a monſtrous Bird in South America. *Scil. Hiſtoria Condoris monſtruoſae Avis (Vulturis ſpecies) Americae Meridionalis. Extat ex Hiſpanico ſermone in Anglicum verſa in Gentl. Magaz. Vol. 23. Editionem Hiſpanicam videre non licuit, ut eiuſdem normam, & editionis annum indicare potuiſsemus.*

URBAN [*Sylvani*]. The London Magazine, or Gentleman Montly intelligencer. *Scil. Promtuarium Londinense, ſive nobilibus viris dicatae Chemeriades ſingulis menſibus prodeuntes. Londini in* 8. *maiori* -- *Quamplurima ad Hiſtoriam naturalem ſpectantia in hoc Promptuario, ſive Diario habentur, cuius duodecim particulae, una ſingulis menſibus prodeunte, Volumen conſtituunt. Volumen primum anno* 1730. *prodiit, ac deinceps uſque ad hanc diem alia volumina periodice quotannis edita ſunt.*

WAGNERI [*Io. Iac.*]. Hiſtoria Naturalis Helvetiae curioſa in 7. Sectiones digeſta. *Tiguri* 1680. *in* 12. *cum fig.*

— De Fringilla candida. *Miſcell. Nat. Cur. Dec.* 2. *ann.* 8. 1689. *obſ.* 147.

WALLER (*Ricardi*). Obſervations made in the diſsection of a Peroquet. *Scilic. Obſervationes in anatome Pſittaci minoris, vel Pſittaculae inſtitutae. Extant in Tranſactionibus Philoſophicis Anglicis Vol.* 18. *n.* 211.

WALLIN [*Georg.*] De Hirundine alba. *Upſaliae* 1733. *in* 4.

WATSON [*Frider.*] The Animal World. *Scil. Regnum animale. Londini* 1754. *in* 8. *cum Tab. aeneis. Exponit proprietates, & nomina Avium, Piſcium &c. ibidemque ad eorumdem cognitionem e pluribus Auctoribus multa decerpſit, & errores quamplures detexit, atque correxit.*

WEGNER. Diſſertatio de Avium origine.

WILLIUS (*Io. Valentinus*). De ovariis & ovis Animalium. *Extat in Act. Hafnienſibus Vol.* 3. *pag.* 147.

WILLUGHBY [*Franc.*] Ornithologiae Libri tres. *Londini* 1676. *in fol. cum Tabulis aeneis* -- *Ibidem* 1678. *Anglice, & Tabula una praecedente editione auctior* -- *In hoc opere Aves omnes ad ea uſque tempora cognitae in methodum naturis ſuis convenientem redactae accurate deſcribuntur. Deſcriptiones iconibus maxima ex parte Aves ad naturam exprimentibus illuſtrantur. Totum opus recognovit, digeſſit, ſupplevit Io. Raius. Willughbeius maximam Europae partem cum ſocio Raio ſtudioſiſſimus peragravit, Aves ex aliorum deſcriptione cognitas ſuis ipſe oculis obſervando, novas adcuratioreſque deſcriptiones compoſuit, atque ipſas ordine naturali in aliquot ſpecies diſtribuit, & ſpecierum ſubdiviſionem addere tentabat, licet ſaepius criteria conſtantia quaerere nequiviſſet. Raius vero poſt obitum Willughbei Ornithologiam reformatam, & Synopſim ſuam methodicam eduxit.*

WITZELIUS [*Io. Ludov.*]. De Corvis albis. *Miſcell. Nat. Cur. Dec.* 1. *ann.* 3. 1672. *Obſerv.* 57.

WORMII [*Olai*). Muſeum Wormianum, ſeu Hiſtoria rerum rariorum tam naturalium, quam artificialium *&c. Variis & accuratis iconibus illuſtrata. Lugduni Batavorum, atque Amſtelodami* 1655. *in fol.* -- *A capite* 16. *ad* 21. *incluſive de pluribus Avibus loquitur Auctor, ac nonnullarum figuras proponit, nunc ligno, nunc aere inciſas.*

ZIEGRAE [*Coſtantini*]. Diſſertatio phyſica de Rege Avium Aquila. *Wittembergae* 1667. *in* 4.

— De Halcyone. *Wittembergae* 1677. *in* 4.

ZORNII (*Io. Henrici*). Epiſtola de Avibus Germaniae, praeſertim Sylvae Herciniae. *Pappenheim* 1745. in 4.

BUONFANTI (*Prete Iacopo Antonio.*) Del Pollaio, e della Colombaia Trattato Ruſtico Economico ec. *Livorno* 1768. *in* 8. = *De alendis, riteque cuſtodiendis Gallinis, & Columbis, atque maxima, quae ex iis in oeconomicis uſibus obtineri poteſt, utilitate comprobatis, firmisque regulis agit Auctor.*

Deſcription (*Anonymi*) philoſophale de la nature des Oiſeaux. *Roven* 1541. *in* 12. -- *rarus ſane liber, ſed inconcinnus.*

CAVALERIUS (*Io. Bapt.*) Aves aeneis typis inciſae. *Romae* 1595. *in* 4.

CORTES (*Geronimo*) Tratado de los animales terreſtres y volatiles. *Valenciae* 1672. *in* 8.

LANGOLIUS (*Gisbertus.*) Dialogus de Avibus cum nominibus Graecis, Latinis, & Germanicis. *Coloniae* 1544. *in* 8.

LONICERUS (*Adamus.*) Hiſtoria naturalis, ubi de Volatilibus &c. *Francofurti* 1551. *in fol. cum fig.*

MARSCHALEUS (*Nicolaus.*) Aquabilium, & Piſcium Hiſtoria. *Roſtochii* 1520. *in fol. cum fig.*

TURNERUS (*Guil.*) Hiſtoria Avium, quarum apud Plinium, & Ariſtotelem fit mentio. *Coloniae* 1543. *in* 8.

Acciocchè il preſente Catalogo non compariſſe una Biblioteca quaſi univerſale, ſi ſono a bella poſta tralaſciati non pochi Autori, e Libri, come ſono: molti Dizionarj, o Leſſici, incluſive il grandioſo Leſſico intitolato *l' Enciclopedia* tanto dell' Edizione di Parigi, che di Lucca, con ſplendidiſſimi rami, perchè non anco ultimato; parimente molti Viaggiatori, alcuni Giornali, e ogni ſorta di Gazzetta; ſiccome diverſi Cataloghi di Muſei, e le opere che trattano d' Agricoltura, o della Villa, e per conſeguenza degli Animali ad eſſa attenenti; parimente ogni Trattato di materia cibaria, o ſolita a cucinarſi per le menſe; diverſe Farmacopee, e Trattati di materia medica, tutti i Filologi, e quaſi tutti i Poeti, nell' opere de' quali ſi trattano molte coſe che attengono agli Uccelli, e ſpecialmente intorno alla loro origine, ſcelta, e prerogative. Finalmente abbiamo omeſſo di citare tutti i manoſcritti, tutti i diſegni, e tutte le carte miniate, molte delle quali ſi trovano in diverſe Librerie tanto di Univerſità, o d' Accademie, che di Sovrani.

Ne Bibliothecae potius univerſalis nomine Catalogus hic ſalutaretur, permultos Auctores, atque Libros conſilio omiſimus, ut Dictionaria fere omnia ſunt, illo percelebri excepto tum Pariſiis, cum Lucae, nitidiſſimis & accuratiſsimis adiectis figuris, & ſub Encyclopediae *titulo edito, quia typis non adhuc abſoluto; multas pariter peregrinantium Relationes, ſive Itineraria; Diaria extera, vel noſtra, aliaque huius generis periodica Opera; Muſeorum aliquot Catalogos; de agricultura, atque ruris oeconomia, & animalibus ad ipſam facientibus Exercitationes; De re cibaria, vel culinaria, atque alimentorum facultatibus Tractatus; Pharmacopaeas nonnullas, & de materia medica Libros; Philologicos omnes Auctores, & Poetarum permulta opera, in quibus non paucae deſcribuntur, laudanſelectum, qualitates & facultates Aves, quoad ortum, turque. Tandem opera omnia manuſcripta, Chartas, & Tabulas manu delineatas, vel depictas, quarum copia in Academiarum, & Principum Bibliothecis aſſervatur, praetermiſimus.*

STORIA DEGLI UCCELLI

La quale comprende non ſolo una ſommaria notizia di quelli che vengono rappreſentati dalle Figure, o Tavole di queſt' Opera, ma che ſi ſtende ancora a deſcrivere, e ſimilmente illuſtrare tutti gli altri ſinora cogniti, e ſtatici deſcritti da' più celebri Autori.

I numeri Romani indicano le ſpecie, e le ſpiegazioni di quegli Uccelli, le figure de' quali quì ritrovanſi aggiunte; gli Arabici appartengono alle ſpecie, e varietà non ſtate figurate, ma che trovanſi tuttavolta deſcritte, e aggiunte ſotto i reſpettivi loro Generi.

AVIUM HISTORIA

Quae Aves illas non ſolum ab Operis huiuſce Iconibus, ſive Tabulis demonſtratas breviter illuſtrat, verum earum etiam omnium, quarum a celebrioris notae Auctoribus ad hanc uſque diem notitiam habemus, concinnam deſcriptionem, atque non abſimilem comprehendit illuſtrationem.

Romani numeri ad Aves Tabulis demonſtratas, ipſarumque hiſtoricas illuſtrationes deſignandas inſerviunt; Arabici autem illas Avium ſpecies ac varietates indigitant, quae Iconibus non oſtenduntur, ſed ſingulis, ſuiſque tamen generibus adiunctae & deſcriptae adinveniuntur.

T. CXXI. B. -- 10. 1. ½

PAPPAGALLO col capo giallo, e roſſo. — *Pſittacus luteo, ac rubro capite.*

Vien queſto da alcuni annoverato tra i *Parrucchetti* egualmente che gli altri delle Tav. CXXII. e CXXVII. e appreſſo gl' Indiani portano tutti indiſtintamente il nome di *Scincialo*, e di *Sciabiſi*, e tutti queſti ſono nativi dell' Indie.

I Paeſi dove trovanſi originalmente i *Pappagalli* ſono la nuova Spagna, l' Iſola di Banda, l' Iſola Ternata una delle Molucche, il Braſile, il Malabar, la China, il Giappone, ſpecialmente preſſo Giava, il Regno di Calecut, la Guiana, l' Etiopia, il Senegal, la Guinea, e più Provincie dell' America, ſpecialmente Meridionale. Nel Regno di Calecut ſpeſſo dalla loro quantità ſono divorate le ſemente del Riſo. Trovaſi parimente un paeſe nell' America, che dalla quantità de' *Pappagalli*, che vi ſi trova, ha preſo il nome di *Terra de' Pappagalli*. Quei *Pappagalli*, che nel Braſile ſono chiamati *Marganas*, vi ſono in quell' iſteſſa quantità, che appreſſo di noi ſi vedono i *Piccioni*, e perciò non ſono ivi molto ſtimati. Se ne trovano alcuni nel Meſſico di colore verde chiaro, col becco nero, che abitano intorno le cime de' Monti, e ſtanno ſugli alberi più alti, e particolarmente ſu i Pini. Queſti di Montagna ſono meno belli di corpo, e non ſi addomeſticano, nè ſi rilevan per le caſe, e ſchiamazzano molto forte, e continovamente. Nel Meſſico trovanſene però altri tutti roſſi, fuorchè nel primo tratto dell' ala, e nella coda, dove ſo-

Inter Pſittaculas *ab aliquibus hic quoque ponitur, una cum reliquis Tabularum CXXII. & CXXVII. appellanturque indiſcriminatim ab Indis, apud quos nidificant*, Scincialo, *ac* Sciabiſi.

Pſittacorum *feraces Regiones, ſive nativa loca ſunt Hiſpania nova, Inſula Banda, Ternata Moluccarum una, Braſilia, Malabaria, China, Iaponia, praeſertim circa Iavam, Regnum Calecut, Guiana, Aethiopia, Regnum Senegae, Guinea, aliaeque Americae Meridionalis praecipue Provinciae. In Regno Calecut ab ipſorum copia ſaepius Oryzae ſata depaſcuntur. Regio in America pariter eſt, quae tanta* Pſittacorum *copia ſcatet, ut* Pſittacorum Terra *dicta fuerit.* Pſittaci *ſpeciei illius a Braſilianis* Marganas *dicti non minus Braſiliae frequentes ſunt, quam apud nos* Columbae, *ideoque non magno in pretio illic ſunt. Nonnulli in Mexico reperiuntur virore diluto tincti, roſtro nigricante, qui iuxta Montium cacumina vivunt, excelſiſque in arboribus degunt, praeſertim Pinis. Hi Montani minus formoſo ſunt corpore, nec cicurantur, aut domi aluntur, ſed clamitant vehementer, atque iugiter. Mexicani alii adinveniuntur toti rubri, praeter humeros, & caudam, quae cyanea ſunt,* qui

fono di color blù, i quali benchè si rilevino, ed imparino a parlare, non ostante vi riescono malamente. Se ne trova de' tanto belli in Giava, e in altre Isole dell' Indie Orientali, che più belli non si possono dipingere, i quali sono molto apprezzati anco in quei paesi, e molto più ancora sarebbero apprezzari ne' nostri, se ci fossero portati, ma essendo molto delicati non reggono ad esser trasportati in Europa, come i Portughesi hanno più volte, per asserzione di Linscot, fatto sperimento. Dagli Olandesi però essendo state raddoppiate le diligenze n' è stato alcuna volta portato qualcuno vivo a Amsterdam. Uno di questi, sebbene non fosse de' più scelti, fu venduto 170. Fiorini d' Olanda. I *Pappagalli* delle specie maggiori vanno a coppie, i piccoli volano molti insieme.

qui licet cicurentur, & humanum sermonem imitentur, incondite tamen idipsum agunt. In Iava, aliisque Orientalibus Indiae Insulis elegantissimi adinveniuntur Psittaci, *qui venustiores depingi non possunt, & apud Indos ipsos magno in pretio sunt, plurimique aestimarentur pariter a nostris, si transferrentur, sed delicatuli nimium sunt, ac difficillime vivi in Europam transferri possunt, ut pluries, Linscotto teste, Lusitanis periculo de ipsis facto contigit. A Batavis tamen tanta adhibita est quandoque industria, ut aliquis ipsorum vivus adlatus Amsteledamum sit. Horum unus, tametsi non esset e selectissimis, Florenis Hollandicis 170. venundari potuit.* Psittaci *maiores fere omnes bini incedunt, minores turmatim volant.*

T. CXXII. B. - 11. -

PAPPAGALLO giallo, nelle ale e nella coda verdeggiante — *Psittacus flavus, alis & cauda virideſcentibus.*

SEcondo il Cadamosto appendono i *Pappagalli* i loro Nidi a' rami degli alberi più alti, e gli costruiscono di figura tonda con una molto piccola apertura per impedirvi l' accesso de' *Serpi*; per altro quelli delle specie minori, per osservazione del Clusio, gli fanno di figura tonda, e molto stabili, e gli accomodano dentro le buche degli alberi.

SI Cadamusto credimus Psittaci *Nidos ad procerarum arborum ramos pensiles construunt, exiguo foramine relicto, ut* Serpentum *insidiis viam praecludant; verum* Psittaci *minores illos ponunt in ipsarum arborum cavis, eosque orbiculari forma, sive in pilae modum rotundos, satisque firmos struunt, Clusii observatione.*

T. CXXIII. B. -- 12. --

PAPPAGALLO minore, o Parruchetto verde, con il collare, o collana. — Perrocchetto dell' Olina — *Psittacus, Psittacula viridis torquata dictus.* — *Psittacus torquatus macrourus antiquorum* Aldrov. & Willugh. — *Psittacus macrourus* Inston. & Charlet. — *Psittacus* Alexandri *macrourus viridis, collari pectoreque rubro, gula nigra* Linn. Syst. Nat. sp. 9. — *Psittaca torquata* Briss. Sp. 55. — Gall. *Perruche a collier, ou Perruche a collier noir* — Angl. *Perroquet.*

LA specie osservata e descritta da Linneo appartiene piuttosto alla nostra descritta più sotto al num. 79. come si potrà ivi vedere, e questa da noi in questa Tavola rappresentata si crede una varietà di quella. Questo *Pappagallo* appunto, cioè di color verde col collare rosso, fu portato dall' Indie in Europa per testimonianza di Plinio al tempo della spedizione di Alessandro Magno, e per tal ragione è stato da diversi chiamato *Pappagallo d' Alessandro*. Le susseguenti osservazioni hanno fatto vedere, che la patria di questo sia la China, Bengala, e l' Etiopia. L' Jonston dice, che ritrovisi anco nell' Isola Spagnuola, e il Brisson in più altri luoghi dell' America.

SPecies a Linnaeo observata, ac descripta potius ad speciem infra a nobis descriptam num. 79. pertinere videtur, quam loco indicato vide; ea vero, quae a Tabula hac nostra ostenditur, illius tantum varietas videtur.

Psittacus *hic torquatus* [*scilicet totus viridis torque miniato*] *omnium primus in Europam ex India allatus fuit, ac Plinio teste, sub expeditione Alexandri Magni innotuit, ideoque ab aliquibus* Psittaci Alexandri *nomine insignitus fuit. In China, Bengala, atque Aethiopia habitare subinde compertus est. Teste Ionstono in Hispaniola etiam Insula reperitur, & Brissonii asserto in aliis Americae regionibus.*

T. CXXIV. B. -- 11. --

PAPPAGALLO, detto Parrucchetto, con collana, di capo e petto vinato. — *Pſittacus, Pſittacucula torquata, capite & pectore vinaceo dictus.*

IL *Pappagallo* di Bengala dell' Albino da noi deſcritto al num. 77. e l'Indiano noſtro col collare nominato al num. 76. non differiſcono gran coſa da queſto. Senza dubbio alcune varietà non da altro procedono, che dalla diverſità del ſeſſo, e da altre caſualità, e perciò non meritano di eſſer regiſtrate tra le ſpecie reali, o legittime.

PSittacus *Bengalenſis Albini a nobis ſub num. 77. deſcriptus, atque torquatus Indicus noſter num. 76. non multum ab hoc ipſo abludunt. Varietates ſane plures a ſexu aliiſque accidentibus emergunt, quae diſtinctas ſpecies efficere vix poſſunt.*

T. CXXV. B. -- 16. --

PAPPAGALLO, detto Parrucchetto d' America, tutto verde, di coda lunga, — *Pſittacus, Pſittacula Americana dictus, totus viridis macrourus.* — *Pſittacus minor macrourus totus viridis* Aldrov. Willugh. Rai. & Sloan. — *Pſittacus minor viridis, cauda producta* Brown. — *Pſittacus minor viridis, cauda longiore* Edw. — *Pſittaca* Briſſ. ſp. 54. — *Pſittacus* rufiroſtris *macrourus viridis, roſtro pedibuſque rubris, rectricibus apice caeruleſcentibus* Linn. Syſt. Nat. ſp. 13.

DIce il Ximenes, che nell' Iſola Spagnuola ſi trova una gran quantità di *Pappagalli* verdi macchiati di roſſo, o di color di porpora, e ve ne ſono de' grandi, de' mezzani, e de' piccoli. I maggiori ſon chiamati in Indiano *Higuarae*, i quali differiſcono dagli altri per avere una macchia bianca alla radice del becco, e queſti quando vengono inſtruiti rieſcono molto parlatori. I mezzani ſono chiamati *Xaxavis*, e ſono di un verde più carico, e pochiſſimo tramezzati da penne di altro colore. Queſti ſono più inquieti, e collerici, continovamente gracchiano, e mai non imparano a parlare. Dieci di queſti aſſaltano, e mettono in fuga cento de' maggiori, eſſendo fra di loro una nimicizia continua. I piccoli ſono muti, e più degli altri manſueti.

IN Hiſpaniola Inſula, inquit Ximenes, innumeri ſunt Pſittaci *virides rubro vel purpureo maculatos, maiores, minores, & minimi. Maiores ab Indis dicuntur* Higuarae, *qui in eo diſcrepant ab aliis reliquarum Inſularum, quod maculam albam ſupra roſtrum geſtent, & valde loquaces ſint ſi humanos inſtruantur ſermone. Minores autem dicuntur* Xaxavis, *qui intenſius virideſcunt, pauciſque miniatis plumis interſtinguuntur. Hi inquieti, turbulenti, mordaciores, iracundiores, & garruli ſunt, ſed humanis loqui vocibus nunquam diſcunt. Decem ex his invadunt & fugant centum* Higuararum, *ſive maiorum, cum quibus nulla eſt pax. Minimi ſilent, & pacatiores ſunt.*

T. CXXVI. B. -- 9. --

PAPPAGALLO, detto Parrucchetto, verde ſcuro, con la fronte roſſiccia. — *Pſittacus Pſittacula dictus, ex fuſco viridis, fronte rufeſcente.*

IL Braſile è la patria di queſto, dove vive in compagnia d'altri molti della ſua ſpecie, ed ivi è chiamato *Maitaccha*. Tra i *Pappagalli* molti ve ne ſono, che non ſolo imitano l' uomo nella voce, ma ſuperano di gran lunga gli altri uccelli tutti nell' ingegno, come ſi può rilevare da molte iſtorie riportate intorno a ciò dall' Aldrovando, dal Geſnero, e dall' Ionſton. A voler che facilmente ed eſplicatamente imparino a parlare, biſogna inſtruirli prima che abbiano paſſato i due anni. I più infingardi ſono inſtruiti a forza di eſſer battuti con una verghetta di ferro ſul capo, eſſendo duri di ſenſo. Le femmine tutte d' ogni ſpecie, ſiccome i *Pappagalli* delle ſpecie minori, e tra i maggiori le *Arare*, non ſono, che raramente loquaci. I piccoliſſimi poi ſon muti ſempre.

HAbitat in Braſilia, ubi turmatim volat, diciturque ab incolis Maitaccha. Pſittacorum *plurimi non ſolum humanam vocem imitantur, verum etiam ingenio aliis omnibus Avibus excellunt, ut hiſtoriis & exemplis permultis probat Aldrovandus, Geſnerus, & Ionſtonus. Facilius accipiunt verba, & articulate fere omnia pronunciant, ſi eos intra alterum aetatis annum docueris. Segniores ferrea in caput verberantur virgula, aliter ictus non ſentiunt propter duritiem.* Pſittacorum *omnium foeminae, pariterque ſpecies minores, & maiores,* Ararae *dictae, raro, vel nunquam humanas reddunt voces; minimi autem certo nunquam.*

T. CXXVII. B. –. 6. 2.

PAPPAGALLO, minore, o Parrucchetto, con la ſommità del capo blù, e la fronte gialla. — *Pſittacus, Pſittacula dictus, vertice caeruleo, fronte lutea.*

ALla campagna ſi cibano i *Pappagalli* d' ogni ſpecie di frumento, e di legume, ma particolarmente di ſeme di Cartamo, detto da noi volgarmente *Grogo*, che gl' ingraſſa, tuttochè a riguardo dell' uomo ſia purgativo; parimente non recuſano qualunque frutto tanto di ſcorza tenera, che dura. Nell' Iſola di Banda ſono molto avidi delle Noci moſcade. Gli addomeſticati poi mangiano tuttociò che venga loro dato, come pane e carne, e ſoprattutto gradiſcono lo zucchero. Bevono acqua, ma più volentieri aſſai il vino, per il di cui uſo non ſolo divengono laſcivi, e più loquaci del ſolito, ma non diverſamente che gli uomini s' imbriacano ancora.

VIctus Pſittacis *adhuc feris, frumentacea omnia ſemina, & legumina ſunt, praeſertim ſemen Carthami, vulgo apud nos* Grogo, *quo pingueſcunt, cum homo purgetur, fructus inſuper omnigeni, cum molli tum duro cortice tecti. In Inſula Banda ad Nucem etiam myriſticam avide advolant, Cicuribus vero quidquid porrigitur, caro, panis, ſaccharum imprimis. Bibunt aquam, ſed vinum multo libentius, cuius potu non ſolum laſcivi, & ſolito loquaciores redduntur, ſed & humano inebriantur more.*

T. CXXVIII. B. -- 13. --

PAPPAGALLO detto Parrucchetto nero del Madagaſcar, — *Pſittacus Pſittacula nigra Madagaſcarienſis dictus. — Pſittacus ex nigro caeruleus roſtro breviſſimo* Klein. — *Pſittacus Madagaſcarienſis niger* Briſſ. ſp. 53. Gall. *Perroquet noir de Madagaſcar.* — Angl. *Blak Parrot from Madagaſcar.*

VEruno de' *Pappagalli* è di carne buona a mangiarſi, eſsendo nera, e di cattivo ſapore. Vero è che l' Imperatore Eliogabalo diede alcuna volta a' ſuoi commenſali de' capi di *Pappagallo*, ma ciò non fu fatto per ragione di guſto, ma per luſſo, e divertimento, eſsendo egli dietro al luſso perduto, e di null' altro trovandoſi contento ſe non delle rarità, delle coſe nuove, e di ſommo prezzo, ſecondo che c' informa Lampridio. Per queſta medeſima ragione vedevanſi ſulle menſe di queſto Imperatore anco delle fiere, come Leoni, Pantere, e altre. Siamo per altro accertati da diverſi, che gli Americani un tempo fa gli mangiavano, mentre dagli Orientali erano ſoltanto apprezzati come ſacri.

NUllius Pſittacorum *caro eſt edulis, nam & atra eſt, & guſtus iniucundi. Heliogabalus capita ipſorum in conviviis exhibuit, non guſtus cauſſa, ſed luxus, & oblectamenti apparatu, cum in luxu perditiſſimus eſſet, nihilque niſi rarum, novum & pretioſum ſibi placeret, teſte Lampridio; hac ipſa de cauſſa Leones, Pantherae, aliaque fera animalia in eiuſdem conviviis imponebantur. Apud Occidentales tamen in cibo uſum olim habuiſſe, apud Orientales vero ſacros exiſtimatos Pſittacos fuiſſe a nonnullis intelligimus.*

T. CXXIX. B. -- 10. ½

PAPPAGALLO minore, o Parrucchetto dell' Indie Orientali col capo turchino. — *Pſittacus minor, ſive Pſittacula, Orientalis, capite ex caeruleo violaceo.* — *Pſittaca cyanocephalos* Briſs. ſp. 70. — Gall. *Perroquet ou Perruche a tête bleue.*

LE penne de' *Pappagalli* ſono in grande uſo appreſso gl' Indiani. Di eſse ne formano diverſe figure, e pitture, farfalle, fiori, erbe, cappelli, e parati, inoltre le rapportano, e le teſsono nelle robe de' loro veſtimenti, degli ſtrati, e tappeti, ſiccome oltre a molte altre galanterie, e utenſili ancora, che con eſse ſanno formare, o con eſſe abbelliſcono, ſe ne ſervono per ornato delle loro ſcimitarre, e cimieri.

INdis Pſittacorum *pennae in magno ſunt uſu. Ex his imagines varias, papiliones, flores, herbas, pileos, & periſtromata conficiunt; veſtes, aulaea, & tapetes contexunt; enſes & clypeos exornant, aliaque utenſilia miro artificio conficiunt, vel exornant.*

T. CXXX. B. --. 11. --.

PAPPAGALLO minore, o ſia Parrucchetto, dell' Iſola di Lucon — *Pſittacus minor, ſive Pſittacula, Lucionenſis* - — *Pſittacus Lucionenſis, Incolis Kilakil* Briſſ. ſp. 41. — Gall. *Perroquet de l' Isle de Luçon.*

† T. CXXXI. B. --. 7. 1.

PAPPAGALLO detto Parrucchetto col ciuffo del Meſſico. — *Pſittacus Pſittacula Mexicana criſtata dictus:* — *Pſittacus collo rubro, plumis in capite purpureis* Klein. — *Avis de cocho, Pſittaci ſpecies, Mexicana, vario colore* Seb. *cum icone, licet non ſatis accurata.* — *Pſittacula Mexicana criſtata* Briſſ. ſp. 95. — Gall. *Petite Perruche hupée du Mexique*

† T. CXXXII. B. --. 10. --.

PAPPAGALLO minore, o ſia Parrucchetto col capo roſſo del Regno di Gingì. — *Pſittacus minor, vel Pſittacula Ginginiana erythrocephalos* - — Gall. *Perruche a tête rouge de Gingì.*

TRovaſi nel Regno di Gingì nell' Indie Orientali. Un' altra ſpecie che trovaſi parimente in queſto paeſe ſi vedrà deſcritta al num. 88.

HAbitat in Ginginiano Regno in India Orientali. Alia eiuſdem Regni ſpecies videatur infra ſub num. 88.

T. CXXXIII. B. --. 5. --.

PAPPAGALLO piccoliſſimo con la fronte, e la gola roſſa. — *Pſittacus minimus fronte ac gula rubris* — *Pſittacus viridis minimus fronte & gula rubris* Friſch. & Klein. — *Pſittacus minimus* Cluſ. & Auct. *ac* Nieremberg. — *Pſittacus puſillus viridis Aethiopicus* Rai. — *an Pſittacula Guineenſis* Briſſ. ſp. 85. — Gall. *Petite Perroquet verd des Indes Orientales; ou Perruche de Guinée.* — Angl. *Little red-headed Parrakeet; Guinea Perroquet; Smalleſt green and red Indien Perroquet; Small green Perroquet from Eaſt-India.*

FOrſe è una varietà di quella ſpecie detta da Linneo *Pappagallo pullario* ſp. 35. mentre queſt' Autore non diſtingue il minimo del Cluſio, che ſi crede queſto noſtro, dal ſuo in tal maniera detto. La ſpecie propria Linneana ſi troverà deſcritta al num. 111. Il *Pappagallo* piccolo verde, e femmina, d' Etiopia del Raio, differiſce dal maſchio per la fronte più sbiadita di colore, e per il bordo delle ali giallo. Il noſtro fu portato dall' Iſola di S. Tommaſo.

AN Pſittaci pullarii *Linn. ſp.* 35. *varietas? Linnaeus enim minimum Cluſii, qui noſtrae hic deſcriptae ſpeciei reſpondet, a ſuo pullario non diſtinguit. Linnaeana ſpecies videatur infra ſub num.* 111. *deſcripta.* Pſittacus *puſillus viridis Aethiopicus foemina Rai diſcrepat a mare capite anterius non ita vivide rubente, & marginibus alarum luteis. Noſter ab Inſula S. Thomae delatus fuit.*

T. CXXXIV. B. --. 4. 2.

PAPPAGALLO piccoliſſimo con la fronte, e la groppa roſſa. — *Pſittacus minimus fronte ac dorſo inferiore rubris.* — *Pſittacus minimus viridis & ruber Indicus* Edw. — *Pſittacula Indica* Briſſ. ſp. 86. — *Avicula Cechini* Aldrov. — *Pſittacus* Galgulus *brachyurus viridis, uropygio pectoreque coccineis, vertice caeruleo* Linn. Syſt. Nat. ſp. 36. — Gall. *Petite Perruche des Indes, ou Perroquet Indien verd & rouge de la plus petite eſpece.*

DA Linneo è ſtato dato a queſta ſpecie di *Pappagallo* l' epiteto di *Galgulo*, o ſia *Rigogolo*, perchè ha il coſtume di dormire come quello con un piede alzato. Non arriva alla grandezza di una *Paſſera*, e quello, che fu deſcritto dall' Aldrovando gli era ſtato mandato dall' Iſola di Malacca da Martino Cechini di Ravenna, che trovavaſi a viaggiare in quelle parti, e di particolare aveva il becco, e i piedi bianchicci. Che anche in queſta ſpecie ſi

ALinnaeo Pſittacus Galgulus *dicitur, quia pede altero ſuſpenſo dormit* Galgulorum *more. Magnitudine* Paſserem *non adaequat, & qui ab Aldrovrando deſcribitur, miſſus illi fuit ex Malaca Inſula a Martino Cechino Ravennate illuc peregrinante, & roſtro, pedibuſque erat candicantibus. Varietates aliquas huius dari comper-*

dieno

dieno delle varietà è cosa manifesta. Quello descritto da Linneo differisce per il petto cremisi, e la sommità del capo celeste. E' credibile però, che una tal varietà nasca particolarmente dalla diversità del sesso.

pertum habemus. Qui a Linnaeo describitur, pectore coccineo, ac vertice caeruleo praecipue differt; huiusce modi vero varietatem a sexus diversitate pendere credibile est.

† T CXXXV. B. —. 10. —.

PAPPAGALLO minore verde e cremisi d'America — *Psittacus minor e coccineo viridis Americanus* — *Psittacus viridis minor occidentalis* Edw. — *Psittacus* autumnalis *brachyurus viridis, fronte remigumque macula coccinea, vertice remigibusque primoribus caeruleis* Linn. Syst. Nat. sp. 31. — *Psittacus Americanus* Briss. sp. 40 — Gall. *Perroquet d' Amerique* — Angl. *Lesser green Parrot*.

NElla grandezza si accosta appresso a poco a quella di un Piccione.

Columbam magnitudine circiter aequat.

37. PAPPAGALLO detto Arara di Giammaica. = *Ara Iamaicensis*. Briss. sp. 2. *Idem est ac Brasiliensis a nobis dictus* Tab. CII. *& in Guiana, Brasilia, & Iamaica habitat.*
38. PAPPAGALLO detto Arara blù, e gialla di Giammaica. = *Psittacus, Ara ex luteo & caeruleo varia Iamaicensis dictus.* = *Ara Iamaicensis cyaneo crocea* Briss. sp. 3. = *Psittacus caeruleo luteus* Klein. = *Superioris, sive* Tab. CII. *varietas, reputaturque eius foemina.*
39. PAPPAGALLO detto Arara di color vario dell' Isole Mollucche. = *Psittacus Ara Moluccensis varia dictus.* = *Ara Moluccensis varia* Briss. Sp. 5. = *Psittacus Orientalis exquisitus Loeri dictus* Seb. cum accurata Icone, *licet perperam ibi depictus cum digitis tribus anticis.* = *Psittacus capite nigro collari viridi, Loeri dictus* Klein. = *Longicaudus est, superne saturate cyaneus, inferne saturate viridis rubro variegatus, capite superne nigro, collo superiore torque viridi ex rubro cincto, collo inferiore & pectore dilute rubris, rectricibus viridibus subtus rubris, marginibus nigricantibus.* = *Crassitie Columbam domesticam maiorem, sive Romanam circiter aequat.*
40. PAPPAGALLO detto Arara verde del Brasile descritto dal Brisson. *Ara Brasiliensis viridis* Briss. sp. 6. = *Psittacus* feverus *macrourus viridis, genis nudis, remigibus, rectricibusque caeruleis subtus purpurascentibus* Linn. Syst. Nat. sp. 5. = *Plurimum cum specie sub* Tab. CI. *depicta convenit, si non eadem. Synicipite insignitur, & taenia utrinque secundum maxillam inferiorem castaneo purpurascentibus; vertice caeruleo, marginibus alarum coccineis, calcaneis rubro circumdatis; genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; rectricibus superne in exortu viridibus, apice caeruleis, subtus obscure rubris; oculorum Iridibus, rostro, & unguibus nigris, pedibus vero fuscis. Longitudo bujus ab apice rostri ad caudam extremam unum pedem Parisiensem, & quinque pollices aequat.*
41. PAPPAGALLO detto Arara verde, e rossa del Brasile. *Psittacus Ara Brasiliensis ex viridi, & rubro varia. Ara Brasiliensis Erythrochlora* Briss. sp. 7. = *Maracana Brasiliensibus* Marcgr. Willughb. = *Maracana Ararae, id est Macai species minor* Rai. = *Psittacus minor prolixa cauda, maculis flammeis conspersus* Barr. = *Columbam domesticam maiorem crassitie adaequat, & in Iamaica, Guiana, & Brasilia habitare dicitur. Saturate viridis est macula in sincipite fusca, vertice viridi caerulescente, macula in alarum exortu miniacea; genis nudis, candidis, lineis plumosis nigris striatis; rectricibus superne prima medietate viridibus, altera cyaneis, subtus saturate rubris. Rostro nigro, pedibus fuscis.*
42. PAPPAGALLO detto Cacatua tutto bianco. = *Psittacus Cacatua tota alba dictus.* = *Cacatua* Briss. sp. 8. = *Psittacus albus cristatus* Aldrov. Ionst. Charlet. Willugh. Rai. & aliorum. = *Kakatoeha tota alba* Klein. = *Est varietas tantum nostri* Tab. CXVII. *Toto corpore & crista niveus est, remigibus tamen maioribus, & rectricibus lateralibus interius prima medietate sulphureo colore imbutis; rostro, pedibus, unguibusque nigris. In Moluccis habitat.*
43. PAPPAGALLO cremisi dell' Isola di Ceram, con le ale e la coda di diversi colori. *Psittacus Ceramensis coccineus, remigibus, rectricibusque varie pictis.* = *Psittacus coccineus, alis ex nigro & viridi variis* Willugh. = *Psittacus coccineus Orientalis, alis ex viridi & nigro variis* Rai. = *Psittacus purpureus* Charlet. = *Lory* Rai. = *Noyra* Clus. Ionston. Nieremberg. = *Psittacus rufus, femoribus aliisque viridibus* Frisch. & Klein. = *Lorius Ceramensis* Briss. sp. 13. = *Psittacus* Aurorae *brachyurus coccineus, alis viridibus nigrisque, rectricibus flavis medietate postica virescentibus* Linn. Syst. Nat. sp. 22. = *Hic Turturem crassitie adaequat* Brissonii *sententia, & rostro donatur rubro, pedibus fuscis.* Raius *idipsum describit rostro flavo.* Linnaei *vero iudicio Turdum non superat. Ergo huius plures observantur varietates, sive plures quae exstant diversae species ab Auctoribus perturbantur.* = *A* Brisonio *Psittacus rufus, femoribus aliisque viridibus* Frischii *non seiungitur a suo* Ceramensi; Linnaeus *vero eumdem facit cum Psittaco suo* garrulo sp. 21. *qui dicitur* Psittacus brachyurus ruber, *genibus aliisque viridibus, rectricibus medietate postica caeruleis* Syst. Nat. sp. 21. = *Ceramensis* Brissonii *descriptione brevicaudus est, coccineus, rectricibus alarum superioribus minimis luteis, remigibus maioribus exterius superne viridibus, inferne cinereo albis, interius coccineis, apice saturate cinereo; rectricibus quatuor utrinque extimis superne primum coccineis, dein saturate violaceis, apice saturate viridibus. Ergo diversus a Moluccensi nostro* Tab. CVI *quem vide. Ergo Moluccensis noster idem ac* Garrulus *Linnaei.*

44. Pappagallo cenerino sbiancato con le ale e la coda rossa. = *Psittacus sordide albus ad cinereum vergens, alis & cauda rubris.* = *Psittacus erythroleucos* Aldrov. Willugh. & Charlet. = *Cacatua alis & cauda rubris* Briss. sp. 12. = *Psittacus erythroleucus brachyurus cinereus, uropygio, rectricibus remigibusque coccineis* Linn. Syst. Nat. sp. 19. *Gallinam crassitie adaequat, sordide albus, ad cinereum vergens, uropygio, remigibus, rectricibusque miniaceis; rostro nigro, pedibusque subnigris donatur.*

45. Pappagallo rosso e nero del Brasile. = *Psittacus e coccineo & nigro varius Brasilienſis.* = *Paragua* Marcg. Ionst. Willugh. & Rai. -- *Lorius Brasilienſis* Briss. sp. 17. = *Cum Columba maiori domestica magnitudine convenit, brevicaudus, capite, collo superiore, imo ventre, alis, & cauda nigris; coccineus in reliquis; rostro, pedibusque obscure cinereis.*

46. Pappagallo rosso con collana gialla, e coda porporina. = *Psittacus coccineus, collari luteo, cauda purpurascente.* = *Lorius torquatus Indicus* Briss. sp. 18. = *Psittacus capite cyaneo, collari luteo* Alb. & Klein. = *Brevicaudus ac Turturis crassitie; uropygio & imo ventre ex albo & roseo variegatus, rostro flavescente, pedibus cinereis, unguibus nigris. Brasiliam frequentat* Albini *iudicio; In India potius Orientali eum inveniri censet* Brissonius.

47. Pappagallo superiormente di color cremisi pieno, e di sotto di color violetto cupo d' Amboina. = *Psittacus superne saturate coccineus, inferne obscure violaceus Amboinenſis.* = *Lorius Amboinenſis* Briss. sp. 19. = *Psittacos omnes* Lorios *dictos crassitie superat. Brevicaudus est, ac rostro donatur obscure rubro, pedibus fuscis, unguibus nigris.*

48. Pappagallo di testa e petto giallo, di Giammaica. = *Psittacus capite & pectore luteis, Iamaicenſis.* = *Psittacus melanorinchos* Charleth. -- *Psittacus viridis melanorinchos* Aldrov. Willugh. Ioston. & Barr. = *Psittacus Iamaicenſis Ictherocephalos* Briss. sp. 20. = *Psittacus viridis, & luteus Barbadenſis* Alb. = *Psittacum Guineenſem cinereum crassitie circiter aemulatur; brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, syncipite & gutture caeruleo-viridibus, capite & pectore luteis, marginibus alarum, & tectricibus caudae inferioribus coccineis, rectricibus viridi-luteis; rostro, & unguibus nigris, pedibus fuscis. Conferatur Psittacus num. 62.*

49. Pappagallo col capo celeste del Brasile. *Psittacus capite caeruleo Brasilienſis.* -- *Psittacus Brasilienſis cyanocephalos* Briss. sp. 21. = *Aiuru-curuca* Rai. = *Aiuru-curuca Psittaci tertia species* Marcgr. = *Praecedentem crassitie adaequat, brevicaudus, viridis, capite superius caeruleo, nigro mixto, vertice & maculis infra oculos luteis, gutture caeruleo; rectricibus superne dilute viridibus, inferne viridi-luteis; rostro ad basim cinereo, ad apicem nigro, pedibus cinereo-caerulescentibus.*

50. Pappagallo verde e giallo dell' Isola di Barbados. = *Psittacus viridis & luteus Barbadenſis* -- *Psittacus viridis & luteus, capite cinereo Barbadenſis* Klein. -- *Psittacus Barbadenſis* Briss. sp. 22. = *Crassitie Columbam domesticam maiorem aemulatur, toto corpore luteus, sincipite dilute cinereo, remigibus intermediis prima medietate exterius rubris, rectricibus viridibus; rostro colore carneo imbuto, pedibus cinereis.*

51. Pappagallo verde, giallo, e celeste dell' Isola di Caienna. = *Psittacus viridis luteus, ac caeruleus Cayanenſis* = *Psittacus, subtus flavescens, superne ex viridi caeruleus* Barr. = *Psittacus minor viridis* Edw. = *Psittacus Cayanenſis* Briss. sp. 23. = *Psittacus* agilis *submacrourus viridis, tectricibus remigum primorum caerulescentium fulvis, cauda subtus rubra* Linn. Syst. Nat. sp. 15. Linnaeus *hunc -- magnitudine facit Coccothraustis*, Edwardus *vero*, & Brissonius *idipsum Columbae crassitie dicunt. Cauda constat parum elongata cuneiformi, rostro, pedibusque dilute cinereis, atque in Cayana, variisque Americae locis habitat.*

52. Pappagallo col capo rosso del Brasile. = *Psittacus capite rubente Brasilienſis. Psittacus Brasilienſis erythrocephalos* Briss. sp. 24. = *Tarabe Brasilienſibus* Marcg. Ionst. Willugh. & Rai. = *Magnitudine Columbam domesticam maiorem superat, brevicaudus; viridis capite, gutture, collo inferiore, pectore & tectricibus superioribus minimis alarum rubris; rostro pedibusque obscure cinereis.*

53. Pappagallo di coda rossa, o col collare, di Giammaica. = *Psittacus Iamaicenſis gutture rubro, sive torquatus.* = *Psittacus minor, collo miniaceo* Rai. = *Psittacus minor, collo, seu torque miniaceo* Sloan. = *an Xaxabes Oviedi?* = *Psittacus Iamaicenſis gutture rubro* Briss. sp. 25. = *Psittacus* collarius *brachyurus, viridis, collo rubente* Linn. Syst. Nat. sp. 34. *Articulate loquitur; cauda est lata, ac brevi; crassitie vero Columbam ferme adaequat.*

54. Pappagallo colla fronte bianca della Martinicca. *Psittacus fronte alba Martinicanus.* = *Psittacus Martinicanus* Briss. sp. 26. = *Psittacus* leucocephalus *brachyurus viridis, remigibus caeruleis, fronte alba* Linn. Syst. Nat. sp. 26. = *Psittacus leucocephalus* Aldrov. = *Psittacus viridis fronte alba, collo rubro* Frisch. = *Psittacus viridis, capite albo* Edw. = *Magnitudine cum Turture convenit* Brissonii *observatione, sincipite est albo, vertice caeruleo, rubris maculis vario, corpore viridi, medio ventre rubro mixto, genis, gutture, & collo inferiore coccineis, rectricibus lateralibus rubris, apice viridibus, rostro pallide carneo, pedibus saturate fuscis.*

55. Pappagallo della Martinicca con la gola rosa, o sia il Pappagallo descritto dall' Olina. = *Psittacus Martinicanus gutture rubro* Briss. sp. 27. = *Psittacus maior* Ionst. Willugh. & Rai. = *Psittacus maior albicans capite luteo* Barr. Histor. = *Synonimis a* Linnaeo Psittaco leucocephalo *appositis, hunc varietatem superioris esse apparet. Columbam domesticam maiorem magnitudine aequare dicit* Brissonius, *pennis in apice nigro marginatis; sincipite albo, collo inferiore dilute rubro, pennarum marginibus albis; ventre obscure purpureo; rectricibus quatuor utrinque extimis interius prima medietate rubris, altera luteis, viridi luteo terminatis, extima exterius caerulea; rostro pedibusque carneo colore imbutis, unguibus griseis. In Martinica non solum habitat, sed etiam in Guiana, & Iamaica.*

56. Pappagallo della Martinicca con la testa celeste. = *Psittacus Martinicanus cyanocephalos* Briss. sp. 29. = *Crassitie cum Columba circiter convenit, brevicaudus sincipite albo, vertice cinereo-caeruleo, ventre rubris maculis vario; rectricibus interius ex rubro & luteo notatis; rostro albo, pedibus griseis.*

57. Pappagallo con la testa turchina della Guiana. = *Psittacus Guianensis Cyanocephalos* Briss. sp. 28. = *Crassitie Turturem non multum antecellit, brevicaudus, viridis, pennis in collo superiore, & dorso supremo nigricantibus, in pectore caeruleo-violaceo marginatis, capite, gutture, & collo inferiore caeruleo-violaceis; rectricibus quatuor utrinque extimis interius prima medietate rubris, altera viridibus, caeruleo superne terminatis, tribus extimis superne exterius caeruleo-violaceis; rectricibus ex viridi caeruleis; rostro cinereo-nigricante, macula superius quadrata pallide rubra, pedibus carneis. In Guiana, aliisque Americae locis habitat.*

58. Pappagallo con la fronte rossa del Brasile. *Psittacus Brasilienſis fronte rubra* Briss. sp. 30. = *Idem ac Psittacus variegatus Brasilienſis noster* Tab. CXVI. quem vide.

59. Pappagallo del paese delle Amazzoni. = *Psittacus Amazonicus* Briss. sp. 31. = *Psittacus viridis, capite luteo fronte caerulea* Frisch. cum accurata Icone. *Psittacus viridis, capite croceo, fronte cyanea* Klein. = *Aiuru*. = *Curau Brasilienſibus* Marcgh. Ionst. Willugh. & Rai. = *Columbam domesticam maiorem crassitie circiter aequat, brevicaudus, viridis, sincipite caeruleo ad violaceum inclinante; vertice, genisque luteis, remigibus 5. intermediis exterius superne prima medietate rubris, rectricibus 3. utrinque extimis interius rubris, taenia transversa saturate viridi notatis, apice viridi-luteis, 4. extimis rubra macula utrinque exterius insignitis, rostro cinereo, pedibus cinereo-albis. In regione Amazonum, & Brasilia habitat.*

60. Pappagallo del Paese delle Amazzoni con la fronte gialla. = *Psittacus Amazonicus fronte lutea* Briss. sp. 32. = *Cum praecedente crassitie corporis, & caudae longitudine convenit; viridis syncipite pallide flavo, vertice, genisque luteis, taenia supra oculos caerulea, remigibus 4. intermediis prima medietate rubris, caudae utrinque extima caeruleo-violacea, tribus utrinque proximis rubra macula insignitis, rostro in exortu lutescente, apice cinereo, pedibus cinereo-albis, unguibus nigricantibus.*

61. Pappagallo del Paese delle Amazzoni con la gola gialla. *Psittacus Amazonicus gutture luteo* Briss. sp. 38. = *Psittacus viridis alius capite luteo* Frisch. -- *Psittacus capite, humeris, & femoribus luteis* Klein. = *Rostro est candicante, pedibus cinereo-albis, unguibus cinereis.*

61. * Pappagallo del Paese dell' Amazzoni variegato, o sia macchiato di giallo, e di rosso. = *Psittacus Amazonicus varius, sive ex luteo, & rubro maculatus. Psittacus maior viridis maculis luteis, & rubris* Frisch. cum accurata Icone. = *Psittacus viridis maior, maculis rubris, luteisque, fronte caerulea* Klein. = *Psittaci secunda species* Marcgr. = *Psittaci maioris, seu mediae magnitudinis* Marcg. sp. 2. Willugh. & Rai. = *Psittacus viridis maior occidentalis* Edw. = *Psittacus Amazonicus varius* Briss. sp. 37. = *Psittacus* aestivus *brachyurus viridis, fronte caerulea, humeris sanguineis* Lin. Syst. Nat. sp. 27. = *Crassitie Columbam Romanam, sive domesticam adaequat, rostro est nigro, vel cinereo, dorsi pennis luteo adspersis. Habitat in America, praecipue in Amazonum regione, & Brasilia.* = Linnaeus aestivum *eumdem facit cum Psittaco Olinae superius a nobis indicato num.* 55. *cum Psittaco viridi melanorhynchos Aldrov. num.* 48. *& viridi ac luteo Barbadense num. ipso* 48. *atque idem est ac noster* Tab. CXV. *depictus.*

62. Pappagallo del Paese delle Amazzoni meno macchiato di giallo e di rosso, della specie antecedente. = *Psittacus Amazonicus, minus speciei superioris ex luteo, ac rubro maculatus.* = *Psittacus Amazonicus Brasilienſis* Briss. sp. 35. = *Crassitie cum specie superiori convenit, rostro est cinereo, basi mandibulae superioris rosea, pedibus cinereo albis, unguibus nigricantibus. In Amazonum regione & Brasilia habitat.*

63. Pappagallo del paese delle Amazzoni, e della Giammaica del Brisson sp. 36. = *Psittacus Amazonicus Iamaicenſis* Briss. sp. 36. = *Cum Psittaco nobili* Linn. sp. 4. *convenit, atque idem est ac noster* Tab. CVIII. *sive Psittacus viridis alarum costa superne rubente* Aldrov. Ionst. Charlet. Rai. & Barr. *qui in Amazonum regione, Guiana, Brasilia, & Iamaica habitat.*

64. Pappagallo del Paese delle Amazzoni col becco variegato. = *Psittacus Amazonicus rostro variegato.* = *Psittacus Amazonicus poikilorynchos* Briss. sp. 34. = *Psittacus poikilorinchos* Aldrov. Ionston. Charlet. Willugh. & Rai. = *In hoc mandibula rostri superior ex viridi ad caeruleum, ad basim, inclinat, ad latera ochrae est colore, versus vero apicem taenia transversa candida notatur; mandibula vero inferior in medio lutescente, in circumferentia plumbeo colore tingitur.*

65. Pappagallo della China. *Psittacus Chienſis* Briss. sp. 39. = *Crassitie Gallinam mediocrem aemulatur, viridis, lateribus & tectricibus alarum inferioribus rubris, marginibus alarum caeruleis; oculorum iride vivide aurantia; mandibula superiore in exortu rubra versus apicem flavicante, mandibula vero inferiore nigra, pedibus nigris. Habitat tum in Sina, tum in Amboinenſi Insula.*

66. Pappagallo della Guadaluppa. = *Psittacus Aquarum Lupiarum Insulae* Briss. sp. 44. = *Columbam erasitie simulat, brevicaudus, superne viridis, inferne cinereo-caeruleſcens; capite & collo cinereo-caeruleſcentibus, viridi & nigro variegatis; alis viridibus luteo & rubro variegatis, cauda viridi.*

67. Pappagallo scuro del Messico, o della nuova Spagna. = *Psittacus fuscus Mexicanus, vel novae Hispaniae.* = *Psittacus fuscus Mexicanus* Edw. = *Psittacus novae Hispaniae* Briss. sp. 45. = *Psittacus* Sordidus *brachyurus subfuscus, gula caerulea, alis caudaque viridibus, rostro anoque rubris* Linn. Syst. Nat. sp. 18. = *Praecedentem crasitie circiter aemulatur, rostri basi lutea, mandibulae superioris medio nigro, reliquis rostri partibus coccineis; pedibus plumbeis, unguibus nigris. Habitat in Mexico & in illa Americae parte Hispania nova dicta.*

68. Pappagallo celeste della Guiana. *Psittacus Guianenſis caeruleus* Briss. sp. 46. = *Psittacus verſicolor, seu erythrocyanos* Aldrov. Willugh. & Rai. = *Psittacus violaceus* Barr. = *Psittacus caeruleocephalus brachyurus, capite, pectore, dorsoque caeruleis; ventre, uropygio, caudaque viridibus, vertice flavo* Linn. Syst. Nat. sp. 25. = *Ab Indis dicitur Kiankia. Columbam crasitie adaequat, rostro subnigro, pedibus cinereis.*

69. Pappagallo giallo del Messico, e del Brasile. = *Psittacus luteus Mexicanus, & Brasiliensis.* = *Psittacus lu-*

luteus Brisſ. ſp. 47. -- *Cum Columba domeſtica maiore craſſitie convenit, brevicaudus, luteus, marginibus alarum, & remigibus maioribus in medio rubris; roſtro, pedibus, & unguibus candidis.*

70. Pappagallo giallo dell' Iſola di Cuba. -- *Pſittacus luteus Inſulae Cubae* Briſ. ſp. 48. -- *Pſittacus mediominor, pectore & ventre rubello mixtis, vertice albo* Brown. -- *Pſittacus Paradiſi ex Cuba* Catesb. Klein. *Pſittacus* [*Paradiſi*] *brachyurus luteus, angulo abdominis, rectricibuſque baſi rubris* Lin. Syſt. Nat. ſp. 28. -- *Parumper Pſittaco Guineenſi cinereo* Tab. CXII. *craſſitie cedit; brevicaudus, luteus, pennis in apice rubro marginatis, gutture, collo inferiore, & ventre coccineis, remigibus maioribus albis, rectricibus lateralibus prima medietate rubris, roſtro, pedibus & unguibns albis.* -- *Huius certe varietas Pſittacus ſuperior 69.*

71. Pappagallo di Guinea con le ale roſſe. *Pſittacus Guineenſis alis rubris* Briſs. ſp. 49. variet. -- *A Pſittaco* Tab. CXII. *alis tantum rubro maxime variegatis diſcrepat. Hic aeque ac Pſittaci* Tab. CXII. & CXIII. *non articulate loquitur, ſed fortiter ſibilat, nonnullaſque animalium voces effingit.*

72. Pappagallo verde del Meſſico col petto bianco. -- *Pſittacus viridis Mexicanus pectore albo* Briſs. ſp. 42. *Pſittacus* [*melandcephalus*] *brachyurus viridis, ſubtus luteus, pileo nigro, pectore albo* Lin. Syſt. Nat. ſp. 33. -- *Turturem craſſitie circiter aemulatur; macula infra oculos viridi; genis & collo inferiore luteis; collo ſuperiore & imo ventre aurantiis, rectricibus viridibus; roſtro carneo colore imbuto, verſus apicem obſcuriore; oculorum pupilla nigra, iridibus ſaturate avellaneis; pedibus cinereo fuſcis, unguibus nigricantibus.*

73 Pappagallo cenerino del Braſile. -- *Pſittacus Braſilienſis cinereus* Briſs. ſp. 50. -- *Maracana Braſilienſibus* [*prima*] Marcg. Ionſt. Willugh. & Rai. -- *Magnitudine Guineenſem* Tab. CXII. *antecellit, brevicaudus, in toto corpore cinereo-caeruleſcens.*

74. Pappagallo ſcuro. -- *Pſittacus fuſcus* Briſs. ſp. 51. -- *Pſittaco Guineenſi nonnihil craſſitie cedit, brevicaudus, in toto corpore cinereo fuſcus; roſtro pedibus, & unguibus griſeo fuſcis.*

75. Pappagallo bruno. -- *Pſittacus nigricans.* -- *Pſittacus Maſcarinus* Briſs. ſp. 52. -- *Pſittacus* obſcurus *macrourus niger, genis nudis, vertice cinereo-nigreſcente vario, cauda cinerea* Linn. Syſt. Nat. ſp. 3. -- *In Africa habitare creditur.*

76. Pappagallo verde (feſtoſo) di coda corta, porporino in fronte, di color celeſte ne' ſopraccigli e nella gola, di color ſanguigno nel dorſo. -- *Pſittacus* (feſtivus) *brachyurus viridis, fronte purpuraſcente, ſuper ciliis gulaque caeruleis, dorſo ſanguineo* Linn. Syſt. Nat. ſp. 29. -- *Indicus eſt, magnitudine Columbae.*

77. Pappagallo verde di coda lunga, col becco bianco della Guadaluppa. -- *Pſittacus viridis, longicaudus Aquarum Lupiarum Inſulae* Briſs. ſp. 58. -- *Aiuru-catinga Braſilienſibus* Marcg. Ionſt. & Willugh. -- *Aiuru-Apara* Rai. -- *Magnitudine Pullum mediocrem adaequat. In Braſilia, & Aquarum Lupiarum Inſula habitat.*

78. Pappagallo minore della Guiana. -- *Pſittacus minor Guianenſis.* -- *Pſittaca Guianenſis* Briſs. ſp. 59. cum optima Icone. *Turturem craſſitie circiter adaequat, longicaudus, viridis, inferne dilutis genis rubro maculatis, calcaneis rubro circumdatis, tectricibus alarum inferioribus minoribus coccineis, maioribus luteis; rectricibus ſuperne ſaturate viridibus, inferne obſcure luteis; roſtro candicante apice cinereo.*

79. Pappagallo minore, giallo, d' Angola, e di Guinea, con la coda lunga biforcata. -- *Pſittacus minor Angolenſis & Guineenſis luteus, cauda longa forficata.* -- *Pſittacus Angolenſis* Alb. -- *Pſittacus croceus cauda longa, oculis in circulo rubris, extremis remigibus, & penna infima caudae caeruleis* Klein. -- *Pſittacus luteus cauda longa* Friſch. -- *Pſittaca Angolenſis lutea* Briſs. ſp. 76. -- *Pſittacus* [*Solſtitialis*] *macrourus luteus, alarum tectricibus viridibus, cauda forficata* Linn. Syſt. Nat. ſp. 7. -- *Turturis magnitudine, in excelſas arbores nidum ſtruit; turmatim volat, magnum voce edens ſtrepitum; arte manſueſcit, & humanas aliquas voces, ſive vocabula exprimere addiſcit.* Albini *figura parum accurata videtur, neque eiuſdem Auctoris deſcriptioni reſpondens.*

80. Pappagallo detto Parrucchetto d' America di coda lunga, col capo roſſo, e celeſte. -- *Pſittacus, Pſittacula Americana dictus, longicaudus, capite e coccineo-caeruleo.* -- *Pſittacus minor capite e coccineo caeruleo occidentalis* Edw. -- *Pſittaca Braſilienſis fronte rubra* Briſs. ſp. 62. -- *Tui-apute-iuba* Macgr. -- *Pſittacus* [*caniculari*] *macrourus viridis, fronte rubra, occipite, remigibuſque extimis caeruleis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 11. -- *Cum Pſittaco* Tab. CXXV. *magnitudine & forma convenit, excepto ſincipite coccineo, vertice caeruleo, cauda tota viridi, ac remigibus extimis caeruleſcentibus. In America habitat, ſignanterque in Braſilia.*

81. Pappagallo minore, o Parrucchetto con collana, dell' Indie. -- *Pſittacula torquata Indica.* -- *Pſittaca Indica torquata* Briſs. ſp. 56. -- *Pſittaculam* Tab. CXXIV. *craſſitie fere dupla antecellit, longicauda, dilute viridis, ad flavum inclinans, vertice viridi caeruleſcente, torque purpureo, gutture nigro, collo inferiore & pectore roſeis, rectricibus dilute viridibus ad flavum inclinantibus; mandibula ſuperiore aurantia, inferiore nigra; pedibus dilute cinereis, unguibus nigris.* -- *Videtur vera Linnaeana ſpecies Pſittaci Alexandri* Syſt. Nat. ſp. 9. *cuius varietas tantum eſt Pſittacus torquatus a nobis expreſſus* Tab. CXXIV. Linnaeus *pariter, aliique nec inſequentem num.* 80. *ab ipſo ſpecie diſtinxerunt.*

82. Pappagallo minore, o Parrucchetto con collana, di Bengala. -- *Pſittacus minor, ſive Pſittacula torquata Bengalenſis.* -- *Pſittacus Bengalenſis* Alb. -- *Pſittaca Bengalenſis* Briſs. ſp. 66. -- *Pſittaculam torquatam* Tab. CXXIV. *craſſitie paullulum antecellit, longicaudus, viridis, inferne ad flavum inclinans, vertice roſeo, occipitio caeruleo, gutture & torque nigris, macula in alis obſcure rubra; rectricibus ſuperne caeruleis, inferne obſcure flavicantibus, mandibula ſuperiore crocea, inferiore nigra, pedibus & unguibus cinereis* Briſsonii *obſervatione; Kleiniana vero deſcriptione dicitur ſub mento niger, capite rubro, cervice purpurea, pedibus caeruleis.*

83. Pappagallo minore, detto Parrucchetto con collana, dell' Iſola di Borbone. -- *Pſittacus minor, Pſittacula torquata Borbonica dictus.* -- *Pſittaca Borbonica torquata* Briſs. ſp. 57. cum icone. -- *Cum Turture craſſitie circiter convenit, longicaudus, viridis, inferne ad flavum inclinans, torque roſeo, taenia tranſverſa ſub*

gutture lutea, ad colli latera nigra, mandibula ſuperiore coccinea, apice nigricante, inferiore ad baſim obſcure rubra, ad apicem nigra, pedibus plumbeo colore infectis, unguibus nigris.

84. Pappagallo minore, dell' Iſola di Caienna .. -- *Pſittacus minor Cayanenſis.* -- *Pſittaca Cayanenſis* Briſs. ſp. 60. -- *Sturnum craſſitie non ſuperat, longicaudus, viridis, inferne dilutius, remigibus intermediis candidis apice luteo adumbratis; roſtro candicante, pedibus & unguibus griſeis.*

85. Pappagallo minore del Braſile. -- *Pſittacus minor Braſilienſis.* -- *Pſittaca Braſilienſis* Briſs. ſp. 61. -- *Cum Pſittaco torquato* Tab. CXII. *circiter convenit, longicaudus, viridis, inferne dilutius, & ad flavum inclinans, vertice vivide aurantio, collo inferiore viridi-flavicante rubro obſcuro mixto, remigibus intermediis caeruleis, roſtro nigro, pedibus rubeſcentibus, unguibus nigricantibus.*

86. Pappagallo verde minore, di coda lunga, con le ali roſſicce, e gola cremiſi, dell'Indie. -- *Pſittacus minor viridis, longicaudus, alis rufeſcentibus, gula coccinea Indicus.* -- *Pſittacula Indica* Briſs. ſp. 63. -- *Craſſitie Alaudam criſtatam non multum antecellit; roſtro, pedibus, & unguibus pallide carneis.*

87. Pappagallo minore, o Parrucchetto, della Carolina. -- *Pſittacus minor, vel Pſittacula Carolinenſis.* -- *Pſittacus capite luteo, fronte rubra, cauda longa* Klein. -- *Pſittacus viridis capite luteo, & fronte rubra* Friſch. *cum* ſatis accurata Icone -- *Pſittacus Carolinienſis* Catesb. & Klein. -- *Pſittaca Carolinenſis* Briſs. ſp. 67. -- *Pſittacus (Carolinenſis) macrourus viridis, capite, collo, genibuſque luteis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 8. -- *Pſittacum torquatum, ſive Pſittaculam* Tab. CXXIV. *craſſitie paullulum ſuperat, longicaudus, viridis, capite anterius, marginibus alarum, & calcaneorum ambitu aurantiis, occipitio, gutture & collo ſupremo luteis; remigibus maioribus in exortu luteis, dein viridibus, apice ad caeruleum vergentibus, rectricibus viridibus; roſtro albo luteſcente, pedibus & unguibus cinereo-albis. Varietas certe Pſittaci* Tab. CXXIII.

88. Pappagallo minore, o Parrucchetto del Regno di Gingì. -- *Pſittacus minor ſive Pſittacula Ginginiana.* -- *Pſittaca Ginginiana* Briſs. ſp. 64. cum Icone ſatis accurata. -- *Pſittaculam torquatam* Tab. CXII. *craſſitie non multum ſuperat, longicaudus, viridis, ad flavum inclinans, pauco rubro obſcuro in dorſo mixto, gutture & collo inferiore nonnihil ad cinereum vergentibus; tectricibus alarum ſuperioribus minoribus corpori finitimis obſcure rubris; tectricibus ſubtus pallide luteis; roſtro coccineo, pedibus rubeſcentibus, unguibus cinereis. Habitat in Regno Ginginiano in India Orientali.*

89. Pappagallo minore o Parrucchetto di coda lunga, verde, e macchiato di giallo. *Pſittacus minor, vel Pſittacula, macroura, viridis, aurantio colore maculata.* -- *Pſittacus viridis cauda longa malis croceis* Klein. & Friſch. cum accurata Icone -- *Pſittaca Illiniaca* Briſs. ſp. 68. -- *Pſittacus [pertinax] macrourus viridis genis fulvis, remigibus rectricibuſque caneſcentibus* Linn. Syſt. Nat. ſp. 10. -- *Tui Apute Iuba* Marcgr. Willugh. & Rai. -- *Apud Braſilienſes Tui idem ſonat ac Pſittacus minor, vel Pſittacula apud Latinos, atque* Parrucchetto *apud Italos. Merulam craſſitie circiter adaequat, ſuperne viridis, inferne viridi-luteus, ſincipite, genis & gutture aurantiis, collo inferiore cinereo-viridi, ventre maculis aurantiis vario, rectricibus ſubtus obſcure luteis, ſuperne viridibus, lateralibus interius dilute luteo marginatis; roſtro dilute cinereo, pedibus ſaturatius cinereis, unguibus fuſcis. In Braſilia, & Illinorum Regno habitat.*

90. Pappagallo minore, o Parrucchetto della Martinicca con la fronte, e la gola ſcura. -- *Pſittacus ſive Pſittacula Martinicana ſincipite & gula fuſcis.* -- *Pſittacus minor gutture fuſco occidentalis* Edw. -- *Pſittacus [aeruginoſus] macrourus viridis, vertice remigibuſque primoribus caeruleis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 12. -- *Pſittaca Martinicana* Briſs. ſp. 69. -- *Craſſitie cum praecedente convenit, longicaudus, ſuperne viridis, inferne viridi-luteſcens, roſtro cinereo, pedibus & unguibus cinereo fuſcis, fronte & gutture fuſcis, ſed colore fuſco ad fulvum inclinante. Habitat in Martinica, aliiſque Americae regionibus.*

91. Pappagallo minore, o Parrucchetto del Giappone. -- *Pſittacus minor, ſive Pſittacula Iaponica.* -- *Pſittacus erythroclorus macrourus* Aldrov. Willugh. Carlet. & Rai. -- *Pſittaca Iaponenſis* Briſs. ſp. 71. -- *Merulam craſſitie circiter adaequat, cauda longa, ſuperne viridis, inferne rubro tinctus, gutture ferrugineo ad ſubrubrum vergente macula utrinque ante, & pone oculos caerulea, remigibus intenſe caeruleis; rectricibus intermediis viridibus, lateralibus rubris; roſtro rubro, pedibus & unguibus nigerrimis,*

92. Pappagallo minore variegato d' Amboina. -- *Pſittacus minor Amboinenſis varius.* -- *Pſittaca Amboinenſis varia* Briſs. ſp. 72. -- *Superiorem paullulum craſſitie ſuperat, longicaudus, ſuperne viridis, capite anterius ſaturate caeruleo, collo ſuperiore torque luteo cincto, collo inferiore & pectore rubro-aurantiis, marginibus pennarum ſaturate caeruleis, ventre ſupremo ſaturate viridi maculato, rectricibus ſuperne ſplendide, inferne ſordide viridibus; roſtro ex albo flaveſcente, pedibus & unguibus nigricantibus.*

93. Pappagallo minore variegato dell' Indie Orientali. -- *Pſittacus minor Indicus varius.* -- *Pſittacus minor e coccineo viridis Orientalis* Edw. -- *Avis Paradiſiaca Orientalis vario colore elegantiſſima* Seb. -- *Avis Paradiſi Orientalis* Klein. -- *Buteo* Moerh. -- *Pſittacus [ornatus] maerourus luteo-viridis, occipite gula pectoreque rubris, vertice auribuſque caeruleis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 14. -- *Pſittaca Indica varia* Briſs. ſp. 73. -- *Merulam craſſitie adaequat, longicaudus, viridis, marginibus pennarum in dorſo & ad latera ventris luteis, capite ſuperius, & macula ad aures nigro-caeruleis, occipite, genis, gutture, collo inferiore, & pectore coccineis, marginibus pennarum in pectore viridi-nigricantibus, taenia utrinque longitudinali in collo lutea; roſtro dilute aurantio, pedibus & unguibus ſaturate cinereis.*

94. Pappagallo minore giallo del Braſile. -- *Pſittacus minor luteus Braſilienſis.* -- *Pſittaca Braſilienſis lutea.* Briſs. ſp. 74. -- *Qui Iuba Tui Braſilienſibus* Marcgr. Ionſton. Willugh. & Rai. -- *Guiaruba* Io. de Laet. -- *Magnitudine & craſſitie Merulae cedit, longicaudus, luteus, remigibus maioribus obſcure viridibus; roſtro griſeo, pedibus unguibuſque incarnatis.*

95. Pappagallo cremiſi dell' Iſola di Borneo. -- *Pſittacus coccineus Bonarum Fortunarum Inſulae.* -- *Pſittacus coc-*

coccineus cauda longiore Edw. -- *Pſittacus (Borneus) macrourus ruber, remigibus rectricibuſque apice viridibus, alis macula caerulea* Linn. Syſt. Nat. ſp. 6. -- *Pſittaca coccinea* Briſs. ſp. 77. -- *Craſſitie Merulam paullulum antecellit, coccineus, longicaudus, collo inferiore & pectore dilute coccineis, marginibus pennarum luteis, remigibus apice viridibus, tribus corpori finitimis caeruleis, rectricibus ſordide rubris, apice virideſcentibus, extima utrinque virideſcente; roſtro aurantio, pedibus & unguibus nigricantibus. In India, & praeſertim in Bonarum Fortunarum Inſula habitat.*

96. Pappagallo minore cremiſi dell' Indie. -- *Pſittacus minor coccineus Indicus* -- *Pſittaca Indica coccinea* Briſs. ſp. 78. cum Icone ſatis accurata. -- *Praecedentem craſſitie multum ſuperat, longicaudus, coccineus, ſuperne ſaturatius, inferne dilutius, fuſco & caeruleo violaceo variegatus, capite & collo ſuperioribus, pectore, & taenia pone oculos caeruleo-violaceis; remigibus maioribus dilute fuſco, minoribus fuſco-violaceo terminatis; rectricibus fuſco-violaceis, lateralibus interius coccineis; roſtro rubeſcente, pedibus, & unguibus fuſcis.*

97. Pappagallo minore cremiſi d' Amboina. *Pſittacus minor Amboinenſis coccineus. Pſittaca Amboinenſis coccinea* Briſs. ſp. 79. -- *Turturem craſſitie nonnihil antecellit, longicaudus, ſuperne caeruleo-violaceus, inferne coccineus, capite & collo coccineis, remigibus ſaturate viridibus, rectricibns ſaturate violaceis, lateralibus nigricantibus; roſtro rubicundo unco nigricante, pedibus & unguibus rubris.*

98. Pappagallo minore cremiſi col ciuffo dell' Iſola di Giava. -- *Pſittacus minor Iavenſis, criſtatus, coccineus. Pſittaca Iavenſis* Briſs. ſp. 80. -- *Pſittacus parvus* Bontii, Willugh. & Rai. -- *Alaudam craſsitie aemulatur, longicaudus, criſtatus, coccineus, gutture griſeo, collo inferiore & pectore dilute roſeis, remigibus viridibus luteo & roſeo colore variis, rectricibus binis intermediis coccineis, lateralibus dilute roſeis apice caeruleis, viridi mixtis; oculis nigris, cute nuda albo-argentea cinctis, roſtro griſeo ad baſim cute nuda candida cincto, pedibus & unguibus cinereis. Verticis pennas, ſive criſtam, nunc erigit, nunc deprimit.*

99. Pappagallo aſſai piccolo, o Parrucchetto, col capo roſſo del Braſile. -- *Pſittacus parvus, ſive Pſittacula Braſilienſis erythrocephalos.* -- *Pſittaci minoris* Marcgravii ſeptima ſpecies -- *Tui para Tupinambis* Willugh. Ionſt. & Rai. -- *Pſittacula Braſilienſis* Briſs. ſp. 82. -- *Magnitudine & craſſitie cum Alauda convenit, brevicaudus, dilute viridis, ſincipite rubro, macula in alis lutea; roſtro incarnato, pedibus & unguibus griſeis. Nidificat in arborum foraminibus a formicis relictis.*

100. Pappagallo aſſai piccolo, o Parrucchetto tutto verde del Braſile. -- *Pſittacus minimus, vel Pſittacula Braſilienſis omnino viridis.* -- *Pſittacus minimus totus viridis* Brow. -- *Pſittaci minoris tertia ſpecies* Marcgravii Willugh. -- *Tui tirica* Willugh. & Rai. -- *Pſittacula Braſilienſis* Briſs. ſp. 81.

101. Pappagallo aſſai piccolo, o Parrucchetto del Braſile col codrione celeſte. -- *Pſittacus minimus, vel Pſittacula, Braſilienſis, uropygio cyaneo.* -- *Pſittaci minoris* Marcgravii ſexta ſpecies (*Braſilienſibus Tuiete*) Willugh. -- *Pſittacus* [*Paſſerinus*] *brachyurus luteo-virens, macula alarum aliſque ſubtus caeruleis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 37. -- *Pſittacula Braſilienſis uropygio cyaneo* Briſs. ſp. 83. -- *Craſsitie Paſſerem domeſticum non excedit, brevicaudus, viridis uropygio cyaneo, tectricibus alarum ſuperioribus maioribus ſaturate caeruleis, rectricibus viridibus; roſtro, pedibus, & unguibus aurantiis.*

102. Pappagallo aſſai piccolo di Malacca. -- *Pſittacus parvus, vel Pſittacula Malacenſis.* -- *Avicula ex Malaca Inſula, ſeu Pſittacus marinus* Aldrov. -- *Pſittacula Malacenſis* Briſs. ſp. 84. -- *Hic quoque ad Paſſerem domeſticum craſsitie vix accedit, brevicaudus, viridis, vertice cyaneo, rectricibus caudae ſuperioribus coccineis; roſtro, pedibus, & unguibus candicantibus.*

103. Pappagallo piccolo, o Parrucchetto, dell' Iſole Filippine. *Pſittacus parvus, vel Pſittacula Philippenſis.* -- *Pſittacula Philippenſis* Briſs. ſp. 87. -- *Ab* Edwardo *in opere, cui titulus* Glanures *dicitur* Perrique couronnée de Saphir Part. II. cum optima Icone Tab. 293. fig. 1. -- *Craſsitie Paſſerem domeſticum non multum antecellit, brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, ſincipite, gutture, collo inferiore & uropygio rubris, taenia tranſverſa infra occipitium aurantio-rubra, rectricibus ſuperne viridibus, inferne caeruleo beryllinis; roſtro, pedibus & unguibus rubris. Foemina ſincipite & uropygio rubro minus vivido tingitur, & maculam utrinque inter roſtrum & oculum viridi-caeruleam habet. Qui ab* Edwardo *deſcribitur, differt in eo quod in ſincipite nil rubri habeat, ſed in capitis vertice macula eleganter caerulea notetur; pedes ungueſque nigricantes obtineat. Habitat in Philippenſibus Inſulis, praeſertim in Lucionenſi Inſula, circa Manillam ubi appellatur* Coulaciſſi. *Qui vero ab* Edwardo *deſcribitur, pingiturque, captus fuit in Inſula Sumatra.*

104. Pappagallo piccolo, o Parrucchetto del Madagaſcar. -- *Pſittacus parvus, vel Pſittacula Madagaſcarienſis* -- *Pſittacula Madagaſcarienſis* Briſs. ſp. 88. cum accurata Icone. -- *Craſſitie cum praecedente convenit, brevicaudus, viridis, inferne ad luteum vergens, capite, gutture, & collo inferiore cinereo-albis ad viridem inclinantibus, rectricibus dilute viridibus, taenia tranſverſa nigra notatis; roſtro pedibus, & unguibus cinereo-albis.*

105. Pappagallo piccolo, o Parrucchetto colla gola gialla. -- *Pſittacus parvus gutture luteo.* -- *Pſittacula* Briſs. ſp. 89. -- *Alaudam criſtatam craſsitie non multum excedit, brevicaudus, viridis, inferne dilutius & ad luteum inclinans; macula ſub gutture aurantia; taenia in alis tranſverſa caſtaneo-aurea ad viride vergente; tectricibus alarum inferioribus luteis; rectricibus viridibus, oris interioribus ad luteum inclinantibus; roſtro dilute griſeo, pedibus, & unguibus griſeis.*

106. Pappagallo piccolo, o Parrucchetto con la teſta gialla, del Braſile. -- *Pſittacus parvus Braſilienſis Ictherocephalos.* -- *Pſittacula* Briſs. ſp. 90. -- *Pſittaci minoris* Marcgravii quarta ſp. Willugh. -- *Tui* quarta ſpecies Marcgr. Ionſt. & Rai. -- *Magnitudine & craſsitie cum Sturno convenit, brevicaudus, ſuperne viridis, inferne viridi-luteus, ſincipite aurantio; oculorum ambitu luteo; roſtro nigro.*

107. Pappagallo piccolo, giallo del Braſile. -- *Pſittacus parvus Braſilienſis luteus.* -- *Pſittacula* Briſs. ſp. 91. -- *Pſittaci minoris* Marcgravii quinta ſpecies, *Iendaya* Willugh. & Rai. -- *Merulam craſsitie adaequat, brevi-*

vicaudus, ſuperne viridis, inferne luteus, imo ventre viridi, capite & collo luteis; remigibus maioribus apice ad nigricantem colorem vergentibus, rectricibus viridibus; roſtro, pedibus, & unguibus nigris.

108. PAPPAGALLO piccolo del Senegal. -- *Pſittacus parvus Senegalenſis.* -- *Pſittacula* Briſs. ſp. 92. cum accurata Icone. -- *Craſsitie Merulam non multum antecellit; brevicaudus; ſuperne viridis, inferne aurantius, ad latera luteus, capite & gutture cinereis; collo viridi, rectricibus ſuperne ſaturate cinereis ad viridem vergentibus, viridi marginatis; roſtro, & unguibus cinereo nigricantibus, pedibus cinereo-rubeſcentibus.*

109. PAPPAGALLO piccolo bruno del Braſile. -- *Pſittacus Braſilienſis fuſcus. Pſittacus minor vulgaris* Barr. -- *Anaca Braſilienſibus* Marcgr. Ionſt. Willugh. & Rai. -- *Magnitudine & craſsitie Alaudam aemulatur; brevicaudus, ſuperne viridis, inferne fuſco rufeſcens; vertice ſaturate caſtaneo; oculorum ambitu fuſco; gutture cinereo marginibus alarum ſanguineis, extremitatibus thalaſſini coloris; macula in dorſo, dilute fuſca, rectricibus pariter dilute fuſcis; roſtro fuſco adunco, pedibus cinereis, unguibus nigricantibus. Habitat in Guiana, & Braſilia; elegans plane Avis.*

110. PAPPAGALLO piccolo, o Parrucchetto col ciuffo. -- *Pſittacus erythrochloros criſtatus* Aldrov. Ionſt. Rai. & Willugh. -- *Pſittacus erythrochlorus torquatus criſtatus* Charleth. -- *Pſittacula* Briſs. ſp. 94. -- *Ad Merulam craſsitiem accedit; brevicaudus, viridis; criſta, alis, & cauda rubris; de colore roſtri, ac pedum necnon de regione in qua habitet, nulla apud Auctores mentio facta eſt.*

111. PAPPAGALLO minore, o Parrucchetto verde, con la fronte roſſa, e una faſcia nera nella coda. *Pſittacus minor viridis, fronte rubra, cauda faſcia nigra notata.* -- *Pſittacus* [*pullarius*] *brachyurus, viridis, fronte rubra, cauda fulva, faſcia nigra* Linn. Syſt. Nat. ſp. 37. -- *Pſittacula Guineenſis* Briſs. ſp. 85. -- Linnaeus *ad ſpeciem hanc refert Pſittacum parvum viridem ex India Orientali* Albini Av. III. Tab. 15. *Pſittacum minimum viridem cum fronte & gula rubra* Friſch. Av. III. Tab. LIV. *Pſittacum puſillum viridem Aethiopicum* Rai. *Pſittacum minimum* Cluſii, & *Pſittacum minorem verſicolorem* Seb. Mus. II. Tab. XL. Fig. I. *additque habitare hunc in Aſia atque Aethiopia. Conferatur depictus & deſcriptus a nobis ſub num.* CXXXIII. *ad quem ſynonima plura a* Linnaeo *pullario ſuo appoſita retulimus, licet varietas tantum non diſtincta ſpecies fuiſſet. Pſittacus puſillus viridis Aethiopicus* Rai. *dicitur a* Raio *ipſo magnitudine Fringillae, in ventre viridi colore dilutiore, in dorſo ſaturatiore tincto.*

T. CXXXVI. B. 2. 8. --

EMEU, o Caſuario — *Emeu, ſive Eme, Caſuarius* aliis. — *Emeu* Dodart. Rai. Cluſ. Bont. Willugh. Nieremberg. Ionſton — *Eme* Aldrov. — *Caſuarius* Olear. Alb. Klein. — *Struthio* Caſuarius *pedibus tridactylis, vertice palearibuſque nudis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. — *Cela* Moerh. — Gall. *Le Caſoar* — Angl. *Caſſoware, or Caſſowary.*

QUeſt' Uccello è grande quanto lo *Struzzo*, di penne ſcure, o quaſi nere di una teſſitura delicata, che oſſervate di lontano compariſcono pelo. Nel vertice del capo è corredato di un' elevazione calloſa, che gli fa la figura di un diadema. Le ſue ale ſono cortiſſime, e appena accennate. Quantunque inghiottiſca tutto ciò che gli vien preſentato, come Arance intiere, e ſimili coſe; per altro il ſuo cibo ordinario è il Pane, che a groſſi pezzi egli ingoia, per aſſerzione del Cluſio mangia avidamente le uova freſche di Gallina tutte intiere col guſcio. Facilmente ſi addomeſtica. Le ſue uova ſono molto grandi, e molto belle di 15. pollici in giro, miſurate per la parte più lunga, e di 12. in circa a traverſo, il guſcio delle quali non è sì groſſo e bianco come quello dello *Struzzo*, ma di un color cenerino sbiadito, e aſperſe d' innumerabili punti verdicci, alcuni de' quali ſono più grandi, e tondi, altri minori, e di colore più ſmorto. La femmina è minore aſſai del maſchio, e di un color più chiaro, o ſia di color d' oliva ſcura. Manca queſto di lingua, come l' *Onocrotalo*, e perciò inghiottiſce intiero tutto ciò di cui ſi ciba. Le ſue gambe, e i ſuoi pie-

COrpus huic grande Struthionis *par, plumis fuſcis ſeu nigricantibus varioris texturae veſtitum, quae e longinquo intuentibus pili potius quam plumae videntur. Collo elevato quaſi diademate in medio capite inſtruitur. Alae breviſſimae huic ſunt, quae potius rudimenta dici merentur. Licet quaecumque obiiciuntur voret, ut Aurantia mala integra & ſimilia, ordinarius tamen eius cibus eſt Panis, quem in magna craſſaque fragmenta diviſum vorat; maxime autem, teſte Cluſio, recentibus Gallinarum ovis delectatur, quae integra cum ipſa teſta deglubit. Manſueſcit facile. Ova edit maxima ac pulcherrima per longitudinem dimenſa 15. unciarum ambitu, per tranſverſum vero 12. aut paulo plus, quorum teſta non valde denſa nec alba veluti ovorum* Struthiocameli, *ſed cinerei diluti coloris, & creberrimis punctulis virideſcentibus, aliis maioribus ac rotundioribus, aliis minoribus, atque colore dilutioribus conſperſa. Foemina multo minor eſt mare, colore pallidiore, ſive ex fuſco olivaceo donata. Lingua, ut* Onocrotalus *caret, ideoque quidquid edit integrum deglu-*

piedi ſono di una gran robuſtezza, a ſegno che a forza di calci ſi difende molto bene, come il Cavallo.

Trovaſi in Aſia nell' Iſole Molucche, in Sumatra, e in Banda, e in Affrica, nell' Abiſſinia, e nella Guinea. Il Sig. Perrault nelle *Memorie per ſervire all' Iſtoria degli Animali* ne deſcrive uno, che viſſe quattro anni nel Serraglio degli Animali del Re di Francia, e ne riporta la ſezione anatomica, aggiungendovi di eſſo un' eſatta figura. Il da noi rappreſentato per i caratteri ſopra accennati è dunque il maſchio. Sebbene poi la figura, che di eſſa abbiamo data, compariſca variare da alcune figure, e dalla deſcrizione ancora data di eſſo da diverſi Autori, a riguardo di quei ciondoli membranoſi roſſi, che gli pendono anteriormente dal collo, e di certe penne lunghe filiformi al principio del petto, che mancano nel noſtro; la figura però data da noi corriſponde eſattamente a quella, che abbiamo trovata nell' originale del Marcheſe Gerini, il quale la fece diſegnare da un individuo, che a ſuo tempo viveva in Firenze, e che appunto così fu oſservato.

glutit. Cruribus, pedibuſque craſſis gaudet, quibus Equorum more ſe defendere nititur.

Habitat in Aſia, Sumatra, Molucca, atque Banda, necnon in Africa, in Abiſſiniae Regno, atque Guinea. Dom. Perrault unius, qui in Ornithotrophio Regio Pariſiis quatuor annos vixit, deſcriptionem & Anatomicam diſſectionem expoſuit, optimamque iconem adiecit in opere, cuius titulus: Memoires pour ſervir a l' Hiſtoire des Animaux. *Quem nos igitur oſtendimus ex ſupra relatis characteribus, huius ſpeciei marem eſſe manifeſte coniicitur. Figura, quae a nobis exhibetur, licet membranis rubris, quibus in anteriore colli parte dependentibus ornatur, necnon pennis nonnullis praelongis filiformibus e pectoris ſuperiore parte ortis, differre videatur; a Geriniana tamen originali figura nec minimum abludit; ſciendum eſt inſuper Auctorem noſtrum Marchionem Gerini illum diligenter delineandum coloribuſque pingendum tunc temporis curaviſſe, deſumpta imagine ab una huius ſpeciei Ave, quae ſua aetate Florentiae vivebat, nec diverſa prorſus ab efficta hic Avis forma obſervata fuit.*

T. CXXXVII. B. 3. 15. 2.

STRUZZO o Struzzolo nero. Struzzo Affricano, o Struzzo della Libia. — *Struthio niger. Struthio-Camelus niger; Struthio Africanus; Struthio Lybicus &c.* — *Struthio* Camelus *pedibus didactylis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — *Struthio pennis nigris in toto corpore veſtitus, albis, & nigris quandoque admixtis, remigibus maioribus; rectricibuſque candidis* Briſs. ſp. 1. — Gall. *l' Autruche noir.* — Angl. *The Oſtrich.*

QUeſto è il maggiore di tutti gli Uccelli, eccettuatone il ſopradeſcritto *Emeu*, il quale quantunque in altezza ceda allo *Struzzo*, non oſtante a riguardo della mole del corpo non ſi può dire di eſſo minore. Nel capo ſembra una ſpecie d' *Oca*; egli è corredato di palpebre, la ſuperiore delle quali è molto mobile, e bordata di peli come quella degli uomini; la ſua lingua poi è corta, piuttoſto ſchiacciata, e per la parte inferiore attaccata, a guiſa di quella de' Peſci. Inoltre lo *Struzzo* è voraciſſimo, cibandoſi di tutto ciò che incontra, come d' erbe, di biade, di pietre, d' oſſa d' animali, di minerali, di pezzi di ferro, e altre coſe, ſervendo nel ſuo ventricolo le più dure alla triturazione, e digeſtione delle altre, dopo di che reſtano intiere o poco corroſe reſtituite per la via delle fecce; ed è mera favola, che lo *Struzzo* ſi diletti di mangiare il ferro, e che facilmente lo digeriſca, e ſciolga.

Quì in Firenze nel Serraglio Reale degli Uccelli da lungo tempo ne ſono ſtati alimentati diverſi, ed alcuni eſſendone morti, ſono ſta-

AVium maximus eſt, ſi unum forte ſupradeſcriptum Emeu *excipias, qui quamvis proceritate ei cedat, corporis tamen mole fere aequalis eſt. Capite ſpeciem* Anſeris *refert; palpebris inter alites forte ſolus inſtruitur, ſuperiore valde mobili, piliſque ciliaribus humano more ornata; lingua autem donatur brevi planiuſcula, atque, Piſcium more, inferna parte valde adhaeſa. Voraciſſimus inſuper eſt, editque quidquid offendit, herbas, ſemina cerealia, fructus, oſſa animalium, ſilices, mineralia, ferrum, aliaque, in cuius ventriculo quae duriora ſunt, uti ſilices & ferrum, aliarum rerum triturationi, ſive digeſtioni inſerviunt, integra inde, vel ſaltem paullulum corroſa ab eius inteſtinis egrediuntur; fabulamque ſapit alitem hunc ferro praecipue ut idoneo cibo delectari, illudque ventriculi humorumque in ipſum defluentium viribus facillime, atque exacte ſolvere poſſe.*

Hic Florentiae a longo tempore plures huius generis Aves in Regio Aviario enutritae ſemper ſunt, nonnullaeque ſuperioribus annis interemptae diſſectae fuerunt, in quarum ventriculis multa ſilicum, & metallorum fruſtula, praeſer-

ſtati aperti, con eſsere ſtati trovati nel loro ſtomaco de' pezzi di ſaſſo, e di metallo, ma particolarmente di Bronzo, di Ottone, e di Ferro, con queſta differenza, che i pezzi di Ferro erano rugginoſi, e molto corroſi, e gli altri con i ſaſſi tutti intieri, e illeſi.

Se ne trovano de' neri, de' cenerini o grigi, de' bianchi, e de' miſchiati. I maſchi ſono generalmente neri, o bianchi, mentre gli altri de' ſoprammentovati colori ſono femmine, le penne delle quali per eſser meno delicate, meno larghe, e di peggior colore, ſono ſempre aſſai meno ſtimate.

ſertim Aeris, Orichalchi, & Ferri reperta fuere, hoc tantum diſcrimine, quod Ferri fragmenta ſuo croco fuerint obducta, plurimumque corroſa, metalla vero reliqua, & ſaxa omnino integra, penituſque intacta obſervata fuerint.

Nonnulli pennis omnino nigris inſtructi adinveniuntur, alii pennis cinereis, ſive griſeis, candidis alii, alii tandem pennis coloribus diverſis tinctis, ſive mixtis. Mares communiter nigri vel candidi ſunt, ex aliis ſupra memoratis coloribus foeminae, quarum pennae utpote rudiores, anguſtiores, minuſque venuſtiori colore praeditae, multo minus in pretio ſunt.

T. CXXXVIII. B. 3. 10.

STRUZZO, o Struzzolo grigio, ovvero cenerino. — *Struthio Camelus griſeus, ſive cinereus.*

GLi *Struzzi* moltiplicano prodigioſamente, e covano le loro ova più d' una volta all' anno, e non ne covano meno di quindici, o ſedici alla volta, le quali ſono molto grandi, e quaſi della grandezza del capo di un ragazzo, bianche, e di guſcio duriſſimo e denſo, come ſe foſse di ſaſſo, o d' avorio. Quelle uova, che da eſſi ſono ſtate partorite in Firenze, ſi ſon trovate del peſo di cinque libbre in circa, mentre il Willughby, e altri ne hanno trovate di quelle del peſo di 15. libbre.

Molti ſono quelli, che hanno ſcritto, che gli *Struzzi* abbandonino nella rena le loro uova, e che queſte ſenza eſser covate naſcano per la ſola forza del Sole, e ciò ſembra ad eſſi conforme alle leggi di natura, perchè queſti animali ſono abitatori di paeſi cuocentiſſimi, e perchè l' animale è troppo grave di corpo per doverſi poſare e trattenere ſopra di eſse. Linneo pure quantunque ſcrupoloſo eſaminatore delle coſe naturali, approva queſto fatto. Per altro trovandoſi molti *Struzzi* al Capo di Buona Speranza, dove il caldo non è molto grande, e le uova loro eſsendo quaſi tonde, e di guſcio duriſſimo, gli Autori, che ſono ſtati del ſopraddetto parere, dovevano perciò congetturare il contrario, e credere, che anco gli *Struzzi* covaſsero le uova loro come fanno tutte le altre ſpecie di Uccelli.

I Sigg. Kolbe, e Adanſon per altro tolgono intorno a ſimil fatto ogni dubbio, mentre ſono ſtati teſtimoni oculari, che gli *Struzzi* non diverſamente dalle *Galline*, covano beniſſimo le uova loro, e che ſolamente nelle interiori e cuocentiſsime parti d' Affrica le abbandonano qualche poco fra giorno, e queſto forſe è ſtato ciò che ha dato motivo d' inganno a non pochi; il ſoprammentovato primo Autore è ſtato per lungo tempo al Capo di Buona

STruthiocameli *mirum in modum ſpeciem multiplicant, atque pluries in anno ovorum incubationi operam dant, quorum ad minimum quindecim, vel ſexdecim pro quavis vice fovent, quae magna ſunt utpote capitis infantis magnitudine plus minus, candida, duriſſima, & quaſi lapidea, ſive eburnea cruſta munita. Communiter quae hic Florentiae ab iiſdem emittuntur, libras quinque, vel paulo minus pendent, Willughbeius vero, aliique ipſorum nonnulla 15. libras pendentia obſervarunt.*

In arena haec condita, & deſerta, Solis calore foveri, & excludi plurium ſententia eſt, naturaeque conſentaneum hoc pluribus videtur cum in ardentiſſimis mundi plagis huiuſmodi Aves degant, nimiamque corporis gravitatem ad eis incubandum a natura obtinuiſſent. Linnaeus quoque, licet naturalium rerum ſcrutator ſedulus, hanc tuetur ſententiam. Verum Struthiocameli *cum ad Caput Bonae Spei, ubi Solis calor non ita adurens eſt, magna copia occurrant, eorumdemque ova cum figura ſubrotunda, duriſſimoque cortice donentur, Auctoribus iis, qui ſupradictam fovent ſententiam, pro manifeſto indicio haberi potuerat, eorumdem ova non ſecus ac reliqua Avium omnia incubatu indigere.*

Sed controverſiam omnem plenarie dirimunt Dom. Kolbe, atque Adanſon rerum naturalium ſcrutatores diligentiſſimi, quorum primus in Capitis Bonae Spei regione longam egit manſionem, ſecundus in Senegallia innumeras inſtituit obſervationes, amboque certiores nos faciunt, aeque ac Gallinae *in Europa, aliarumque omnium Avium more,* Struthiomelos *ovis ſuis incubare, atque tantum in ferventiſſimis Africae interiori*

na

na Speranza ; il ſecondo al Senegal per farvi eſpreſsamente delle oſservazioni naturali.

Le uova degli *Struzzi* ſi mangiano, e non ſono ingrate, ma ſopra tutte le altre più dure di ſoſtanza, e meno facili a digerirſi. Galeno ſcriſse, le uova migliori eſsere quelle delle *Galline*, e de' *Fagiani*, e fra le peggiori eſser quelle di *Oca*, e di *Struzzo*.

terioris Provinciis interdiu aliquantiſper ea deferere, quod plures circa rei veritatem decepit.

Harum Avium ova eſui apta ſunt, nec guſtui ingrata, ſed prae reliquis craſſioris ſubſtantiae, atque digeſtioni duriora. Galenus optima, bonique ſucci, ova Gallinarum *&* Phaſianorum *dixit,* Anſeris *&* Struthiocameli *deteriora.*

T. CXXXIX. B. 3. 6. --

STRUZZO, o Struzzolo, bianco — *Struthio Camelus albus.* — *Struthio pennis candidiſſimis lanuginoſis* Barr. Ornith.

QUantunque lo *Struzzo* ſia impotente al volo, non oſtante correndo, a forza di muovere le ſue ale, rompe in tal maniera l' aria, e corre tanto rapidamente, che non cede agli Uccelli nello ſparire aſsai facilmente di viſta, dimanierachè non è poſſibile, ſenza qualche artifizio, con cani, e cavalli arrivarlo. Gli Arabi alcune volte conſumano due giorni di tempo, prima di dargli addoſso di propoſito, ſeguitandolo ſemplicemente a viſta, moſtrando di abbadare a tutt' altro, ſervendo loro ſoltanto in queſto tempo di cominciare a ſtancarlo, e d' impedire che mangi, poichè ſe con troppo impeto gli deſsero ſubito addoſso, e queſto prendeſse i luoghi elevati e ſcoſceſi, non potrebbero giungerlo mai più.

Trovaſi nella Siria, in Arabia, nella Libia, e in Affrica; particolarmente in Etiopia o Abiſſinia, al Senegal, e al Capo di Buona Speranza. Ne' Deſerti della Libia ſe ne trovano alcune volte tanti inſieme, che paiono a chi gli vede di lontano un accampamento di Cavalleria. I paeſani di tali luoghi, e ſpecialmente gli Arabi, e gli Etiopi, trovano non poco profitto alla caccia di eſſi, e nel prendergli particolarmente vivi, perchè gli addomeſticano, eſsendo a ciò molto diſpoſti, e gli vendono a' Mercanti, che gli mandano in Europa. Quelli poi che vengono da eſsi ammazzati, ſono ſcorticati, e ſpogliati di tutte le penne, le quali ſono da eſsi vendute piuttoſto care a' Mercanti delle Città più vicine.

L' uſo di eſse è molto grande per tutto il mondo, ma dall' altra parte eſsendo queſto tanto noto, è totalmente ſuperfluo che da noi ne ſia quì fatta una ſpecifica menzione. In diverſi luoghi, e particolarmente in Inghilterra le Dame ne facevano un tempo fa dei ventagli, e i militari quaſi per tutto il mondo, ma particolarmente gli Orientali, ſe ne ſervono per ornamento de' loro cimieri, e turbanti. Appreſso i Turchi però, per quanto vien riferito, non è permeſso con eſse adornarſi, che a' ſoli Giannizzeri. Trovanſi degli *Struzzi* anco in America, ma ſono di ſpecie affatto diverſa, e tale è quella, che quì ora ſarà deſcritta.

STruthio-camelus *licet volatui impos ſit, currens tamen alas agitando aerem aſſidue dividit, rapideque currit ac ſi volatu ſe ſe per aerem ſubtraheret, ita ut nec a cane, nec ab equo, ſine artificio, ſuperari queat. Arabes aliquando ultra dies duas tempus conſumunt, perſequendo* Struthionem, *quem prius quaſi aliud agendo agitant, ut impediant, ne eſcam ante capiat, quam ſeveriori venatu proſequantur; nimis impetuoſi nunquam attingerent Avem ad montuoſa & praerupta loca praecipue fugientem.*

Habitat in Syria, Arabia, Lybia, Africa, praeſertim in Aethiopiae, ſive Abyſſiniae Regno, in Senegallia, atque ad Caput Bonae Spei. In Deſertis praecipue Lybiae tanta eorum copia quandoque conſpicitur, ut procul intuentibus velut equitum quaedam acies appareant. Huius regionis incolae, pariterque Aethiopes, aliique Africae indigeni homines non mediocrem proventum adinveniunt in iis perſequendis, viviſque captandis; in iis enim cicurandis, quos vivos capiunt, omnem impendunt operam; nam facile manſueſcunt, ipſoſque Mercatoribus vendunt, qui ad Europeos mittunt; quos vero interficiunt, pennis atque pelle idipſos exuunt, pennaſque vicinarum Civitatum Mercatoribus utiliſſime vendunt.

Earum uſus in omnibus terrae Provinciis maximus eſt, omnibuſque tam notus, ut de ipſo verba facere ſupervacaneum prorſus ſit. Pluribus in locis, in Anglia praeſertim, nobiliores matronae ventilabra ex iiſdem olim conficiebant, omneſque mundi gentes, milites praeſertim Orientales, ad conos, & galeas adornandas iis utuntur. Apud Turcas tamen idipſas ſolis Ianitzaris conceſſas eſſe relatum eſt. In America etiam Struthiones *adinveniuntur, ſed ſpeciei omnino diverſae. Horum ſpecies una eſt, quae ſtatim hic a nobis deſcribetur.*

4. Struz-

4. Struzzo, o Strúzzolo d' America = *Struthiocamelus Americanus* Rai. = *Iandou* Ionſt. & Charlet. = *Nhanduguacu Braſilienſibus* Marcgr. & Piſ. = *Ardea Americana cinerea, terrivora, capite calvo* Barr. Ornith. = *Struthio* [*Americanus*] *digito poſtico rotundato mutico* Linn. Syſt. Nat. ſp. 3. = *Struthio Nothus* Klein. = *Rhea* Moehr. & Briſs. = *Grus cinerea ferrivora* Barr. Hiſt. = *Habitat in America Auſtrali, praecipue in Guiana & Braſilia in Seregippae & Fluvii magni praefecturis. Minor ſaepius Struthione Africano, & Caſoario, ſive Emeu ſimilior, quam Struthioni; quatuor enim in pede digitos habet, tres anterius, unum poſterius, craſſum, rotundum, ungue non armatum. Collum geſtat incurvatum ut Cycnus, ſive Ciconia, longitudine circiter duorum pedum. Oculos nigros habet pulcherrimos, roſtrum compreſsum non admodum latum, duos & ſemis digitos longum, alas aeque ac Struthio Africanus ineptas ad volandum habet, citiſſimeque ut ille tamen currit, ut vix, ac ne vix quidem a cane venatico ſuperari poſsit. Caudam vero non ut ille criſtiformibus pennis praeditam habet, ſed plumas fert griſeas per dorſum expanſas ad anum uſque. Veſcitur fructibus, & carne. Caro vero eius bona ad comedendum dicitur.*

5. Struzzo cappelluto, e Struzzo dell' Iſola di S. Maurizio. = *Struthio* [*cucullatus*] *pedibus tetradactylis, omnibus unguiculatis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 4. = *Gallus Gallinaceus peregrinus* Cluſ. = *Cycnus cucullatus* Nieremberg. Rai. & Willugh. = *Dronte* Bont. = *Dodo Luſitanorum Cycnus cucullatus* Carl. = *Raphus* Moehr. & Briſs. = *Bontii teſtimonio haec Avis magnitudine eſt media inter Struthionem Africanum, & Gallum Indicum; capite magno membrana quadam cucullum referente tecto: oculis magnis nigris: Roſtro praelongo valido ex caeruleo albicante, exceptis extremitatibus, quarum inferior nigricat, ſuperior flaveſcit. Corpore eſt obeſo, rotundo, quod mollibus plumis griſeis Struthionum aemulis veſtitur. Ab utroque latere exiguis alis plumatis, loco remigum, ex flavo cinereis, & pone uropygium, loco caudae, quinis pennis criſpis eiuſdem coloris decoratur. Cruribus eſt flaveſcentibus craſsis, atque admodum brevibus; pedibus ſolidis quatuor digitis longis, quaſi ſquamoſis, totidemque unguibus nigris validis munitis incedit. Ceterum tardigrada eſt Avis, & ſtupida, atque facilis praeda venatoribus. Habitat in India, praeſertim in Inſula Cycnaea, ſeu Cerne Luſitanis, dicta S. Mauritii Inſula Batavis. Lapilli diverſae magnitudinis, ut in Struthione, in ventriculo harum Avium reperiuntur. Caro earum, in primis pectoris, eſt pinguis, non ingrata, adeoque multa, ut tres quatuorve huius ſpeciei Aves centenis ſociis ſaturandis aliquando ſuffecerit. Si non probe elixentur, vel veteres ſint, difficilioris ſunt concoctionis; ſalitae etiam in penu reconduntur. Struthio volans, de quo ſermo eſt apud aliquos Peregrinatores fictitia omnino exiſtimatur Avis.*

T. CXL. B. -- 18. --

CORVO, o Corvo maggiore, e volgarmente anco detto Corvo reale. — *Corvus, ſive Corvus maior* — *Corvus maior* Friſch. — *Corvus* Geſn. Aldr. Ionſt. Willugh. Charl. Moerh. — *Corvus ſimpliciter* Klein. — *Corvus, ſeu Corax* Rzac. — Gall. *Corbeau*. — Angl. *The Raven.*

DE' *Corvi* ſe ne trovano in qualunque parte del mondo, e in copia ancora, ſoffrendo eſſi qualunque mutazione d' aria, nè temendo il caldo, o il freddo, onde facilmente ſi trattengono in qualunque luogo, purchè non manchino di trovarvi alimento; e quantunque ſieno detti amanti della ſolitudine, tuttavolta ſi vedono anco nel mezzo delle Città, e vi fanno il nido, come lo atteſta l' Aldrovando, e lo conferma l' oſservazione.

Nidificano ſu gli alberi più alti, e nelle vecchie torri ſul principio della Primavera, e anco prima ne' paeſi più caldi. Depongono quattro, o cinque uova per volta, e ſei ancora, le quali ſono di un colore tra il verde e il celeſte sbiadito, aſsai miſchiate, e molto punteggiate di color nero. Se i *Corvi*, ſi poſſano addomeſticare, e addeſtrare per la Caccia, ſe ne terrà diſcorſo poco più ſotto.

Corvi non una aliqua orbis plaga, aut regione, ſed ubique terrarum abundant, quaſvis etiam aeris mutationes facile tolerant, nec frigus, aut calorem reformidant, ſed ubicumque alimenti copia reperiatur, degere facile ſuſtinent; & quamvis ſolitudinis amici dicantur, in mediis tamen Urbibus non raro degunt, & nidificant, ut Aldrovandus tradit, & experientia ipſa confirmat.

Nidificant autem in excelſis arboribus, aut turribus vetuſtis, primo Vere, initio videlicet Martii, & in calidioribus locis citius etiam nonnumquam. Ova pariunt una vice quatuor, quinque, & interdum ſex; ex viridi pallide caerulea, maculis, & ductibus crebris nigricantibus varia. An Corvi *cicurari, & ad Aucupium inſtitui facile poſſint, infra videbimus.*

T. CXLI. B. -- 16. 2.

CORVO reale bianco. — *Corvus albus, ſive Corvus maior albus.* — *Corvus albus* Schwenck. — *Corvus candidus* Briſs. ſp. 1. varietas. Gall. *Le Corbeau blanc.*

DIverſi ſono ſtati quelli, che hanno veduto de' *Corvi* bianchi, e fra gli altri l' Aldrovan-

Corvos albos obſervarunt plures Auctores, ſignanter Aldrovandus, Willughbeius, & Kleinius,

vrando, il Willughby, e il Klein, ma ſono bensì molto rari nelle parti meridionali trovandoſi eſſi per il ſolito ne' luoghi montuoſi, e coperti quaſi tutto l' anno di neve, ne' quali luoghi anco molt' altri animali mutano in bianco i loro originali colori, come accade alle Volpi, alle Lepri, Orſi, Pernici, Merle ec.

Il Klein oſſervò vicino a Lubecca una *Cornacchia* bianca, e a Dresda delle *Gazzere* tutte bianche. Gio. Caio il 1548. vedde nella Provincia di Cumberland due *Corvi* bianchi, ſtati rilevati per la Caccia, e ſtati così trovati nell' iſteſſo nido. Quelli, che vengono inſtruiti a predare, ſogliono eſser portati a predare le *Pernici*, e gli altri *Corvi* ſalvatici, e non di rado i *Fagiani*. Uno di queſti *Corvi* intieramente bianco fu ammazzato a Tavolara Iſoletta contigua alla Sardigna, e un altro

nius, ſed rari hi ſunt in regionibus Europae *Meridionalibus; in montuoſis vero, ac Borealibus plagis per maximam anni partem nivibus obtectis reperiuntur facilius: nam & alia animalia ibi nativos ſuos colores in album mutant, ut Vulpes, Lepores, Urſi, Perdices, Merulae ec.*

Prope Lubecam Cornicem *niveam, in Sileſia, & Dreſdae vero* Picas *albas obſervavit Kleinius. In Cumbria anno* 1548. Corvos *duos candidos, ex eodem nido, & ad Aucupium factos ut Accipitres obſervavit Io. Caius. Venatici qui evadunt* Perdices *&* Corvos *feros venantur, quandoque etiam* Phaſianos. *Horum unus omnino candidus interfectus fuit Tavolarae (quae eſt parva ac finitima Sardiniae Inſula) alter apud nos prope Etruriae oppidum vulgo Palaia.* fu ammazzato a Palaia Caſtello in Toſcana.

T. CXLII. B. -- 18. --

CORVO d' Alemagna detto ivi Krè, ſecondo altri Cornacchia d' Alemagna. — *Corvus Germanicus vulgo Krè, aliis Manedula Germanica.*

FAcilmente ſogliono i *Corvi* ſignificare una groſſa burraſca, allorchè urlano molto, e in forma, che ſembrino ſinghiozzare, ſpecialmente ſul far del giorno; ſiccome ſe ſtanno pendenti dagli alberi, e dibattono le ale. Serenità poi predicono ſe guardando la mattina il terreno paſſeggiano per i rami degli alberi a penne e ale larghe; ſe in principio ſcompagnati gracchiano leggermente, poi ridotti in branco ſtridono forte, ovvero ſe ſulla ſera ſi mantengono in branco, o ſcompagnati che ſieno, ſi ritirino al nido gracchiando fortemente.

Il Sig. Kolbe nella deſcrizione del Capo di Buona Speranza cita diverſe ſpecie di *Corvi*, che ſi trovano in tal luogo, e fra queſte una ne deſcrive bianca nel ventre, e miſta di bianco, e nero nel capo. Anco nel Meſſico per aſſerzione del Nierembergio, e del Fernandez vi ſono de' *Corvi* miſchiati di bianco.

TEmpeſtatem plenam praeſagiunt facile Corvi, *ſi cum ſingultu quodam diu, multumque matutino praeſertim crepuſculo ululent; & ſi de arbore pendentes, alas frequenter motitent. Serenitatem, ſi contra Solum hiantes mane per arborum ramos plumas, & alas expandant; ſi privatim primo crocitantes, mox turmatim congreſſi liberius vociferentur, aut ſi ſub nocturnum crepuſculum gregatim verſentur, & dum ſeparantur ſumme crocitando ad nidos advolent.*

D. Kolbe in Deſcriptione Capitis Bonae Spei plures Corvorum *ſpecies ibi degere affirmat, quas inter una quae donatur ventre albo, capite vero ex albo & nigro vario. In Mexico etiam ſunt* Corvi, *teſte Nierembergio & Fernandez, pennis quibuſdam candidis variegati.*

T. CXLIII. B. 1. -- --

CORVO Imperiale. — *Corvus calvus ſeu Loripes* Ger. Ornith. autogr.

IN un Caſtello della Francia, chiamato Corvato, dice Alberto, che i *Corvi* vi campano più di 100. anni; Eſiodo ſcriſſe, che vivono l' età di nove uomini, non ſo però con quali fondamenti. Che campino per altro lungamente è credenza univerſale.

Gli Uccelli di queſto genere ſi cibano promiſcuamente di carne, d' inſetti, e di biade; alcuni fra eſſi ſono quaſi affatto carnivori, e volentieri ſi cibano di beſtie morte, e di ca-

IN Galliae Oppido, quod Corvatum nominant, Corvos *annos pluſquam* 100. *egiſſe Albertus refert; Heſiodus novem hominum aetates vivere dixit, qua vero fide neſcio: ipſos tamen longaevos fatentur omnes.*

Corvini generis Avibus victus ex carne, inſectis & frugibus promiſcuus. Nonnullae etiam car-

cadaveri, per la qualcosa sono questi da alcuni chiamati semirapaci, come particolarmente il *Corvo*, e la *Cornacchia* volgare. Alcune volte ancora danno addosso a degli animali vivi, essendo stati veduti dar la caccia, e predare le *Allodole*, e le *Passere*. Nell' Islanda per asserzione di Mr Anderson, e nell' Isole vicine trovansi *Corvi* di una grandezza considerabile, i quali seguitano, e danno addosso anco a' piccoli *Agnelli*, e quando non sieno scacciati da' guardiani, cavano ad essi gli occhi, e poi coraggiosamente, e avidamente gli manimettono, e gli mangiano.

Quantunque si possa dire, che il *Corvo* sia un Uccello piuttosto salvatico, e fiero, non ostante si addomestica, e impara a parlare non diversamente dal *Pappagallo*, e dalla *Gazzera*. Acciocchè più facilmente egli possa in questo riescire, gli si taglia il freno sotto la lingua; mediante questo taglio ne rilevò uno Olao Borricchio, per quanto è registrato negli Atti di Coppenaghen, che discorreva assai bene. Contraffaceva egli sì bene la voce del Padrone, che più volte avanti tempo, chiamando per nome il servitore, lo fece alzare dal letto. Un altro *Corvo* salutò Cesare, che tornava vittorioso dall' Epiro, dicendogli spiegatamente: *Viva Cesare vincitore e Imperatore*.

Uno ne fu sotto il Principato di Tiberio, che ogni mattina volava da' Rostri al Foro per dove dovevano passare Tiberio, Germanico, e Druso, e nominatamente ad uno ad uno, allorchè passavano, salutavali. Essendo questo stato ammazzato gli furono fatte, secondo Plinio, sontuosissime esequie, e fu fatto ammazzare l' uccisore di esso. Altri esempi ancora sopra di ciò potrebbonsi addurre, ma per brevità si tralasciano.

carnivorae prorsus sunt, morticinis praecipue, & cadaveribus vescuntur, unde a nonnullis semirapaces appellantur, ut Corvus *proprie dictus, &* Cornix *vulgaris. Quin nec a vivis animalculis abstinent;* Alaudas *&* Passeres *aliquando devorasse visae sunt. In Islandia, vicinisque Insulis, referente Andersonio, praegrandes adinveniuntur* Corvi, *qui* Agnos *recens editos adoriri non timent, & si a Pastoribus non impediantur, illos rostro oculis orbant, ipsos strenue dilaniant, ipsorumque carne avide vescuntur.*

Licet vero fera potius Avis dici mereatur cicuratur tamen, & ad humana reddenda verba, non secus ac Psittacus, *&* Pica, *instrui potest. Ut* Corvus *facile efficere hoc possit, linguae ei frenum resecare oportet; hac freni sectione unum Olaus Borrichius, ut in Actis Hafniensibus legimus, ad sermocinandum optime erudivit. Heri vocem ita hic simulabat, ut Borrichii famulus pluries ab eo nomine vocatus, ac deceptus, ante diem & horam, qua expergisci solebat, e lecto surrexerit. Alter Augustum ex Actiaca victoria reducem verbis:* Ave Caesar, victor, Imperator, *salutavit.*

Quidam sub Tiberio Principe singulis matutinis e Rostris evolans, in Forum versus, Tiberium, deinde Germanicum, & Drusum Caesares nominatim mox transeuntes salutabat. Occisi funus, teste Plinio, innumeris elatum est exequiis, interfectusque qui eum occiderat. Aliae quae extant similia exempla brevitatis caussa tacemus.

T. CXLIV. B. – 11. –

CORNACCHIA; o Cornacchia comune. — *Cornix* Gesn. Aldr. Wiliugh. Rai. Ionst. Alb. & Briss. — *Corvus minor* Charl. & Sibb. — *Corvus* [*Corone*] *atro caerulescens, cauda rotunda, rectricibus acutis* Linn. Syst. Nat. sp. 2. — Gall. *Corneille*. — Angl. *Crow; Gmon Crow; Carion Crow*.

LA *Cornacchia*, secondo il Guarino Veronese nel suo Vocabolario, ha preso dal *corno* il nome, perchè a guisa di esso è rumorosa, e quanto esso in vita durevole. Trovansi le *Cornacchie* intorno le Città, le fabbriche, i lidi marini, le ripe de' fiumi, e gli sfoghi delle cloache. In Inghilterra evvene gran copia, perchè nel terreno umido di essa vi è gran copia di vermi. Per la medesima ragione appresso di noi se ne trovano molte a Pisa, anco in Città, dove in tutto l' anno tanto la mattina a buon' ora, che la sera ne' giorni sereni, e per tutto il corso della giornata ne' giorni piovosi vedonsi volare tanto sul Duomo, che

COrnix *Guarini Veronensis iudicio in suo Vocabulario, dicitur a cornu, quod sit clamosa ut cornu, & quod ut cornu durat, vivat. Versantur* Cornices *circa urbes, domos, maris littora, fluminum ripas, & sterquilinia. In Britannia ingens ipsarum copia occurrit, quoniam in pabulo humido eius soli vermes abundant. Apud nos, ipsa eademque, qua in Britannia, ratione, degunt Pisis, in ipsa etiam urbe, ubi toto anno matutino, ac vespertino tempore diebus serenioribus, diebus vero pluviis tota die, supra princeps templum, & proxima*

che ſulle alte fabbriche ad eſso vicine. Vivono di biade, di noci, di olive, di vermi, e di carne.

Realmente la *Cornacchia* volgare, quale è quella appunto quì rappreſentata, è molto carnivora, e dedita a cibarſi di carogne. In mancanza di queſte ſaccheggia poi i ſeminati. In Svezia, ſiccome in altre Provincie del Nort, è rara; frequente poi ne' Paeſi meridionali, e marittimi ſpecialmente. Un' altra *Cornacchia* devaſtatrice de' ſeminati, ma di color cenerino, ſi troverà deſcritta al num. 7.

edita, atque antiqua aedificia verſantur. Victitant frugibus, nucibus, olivarum fructibus, vermibus & carne.

Species vero, quae Cornix *vulgaris dicitur, ut ea eſt, quae hic depingitur, carnivora proprie eſt, ac morticinis plerumque veſcitur; horum vero inopia ſata depopulatur. Rara Avis in Svecia, aliiſque ſeptentrionalibus Provinciis, copioſa in calidioribus praecipue maritimis.* Cornix *alia frugilega, ſed cinerea, videatur infra deſcripta num. 7.*

T. CXLV. B. – 12. –

CORNACCHIA frugilega nera, o devaſtatrice de' ſeminati, detta volgarmente Mulacchia, e Corvacchia. — *Cornix frugilega* Rai. & Briſs. ſp. 3. — *Cornix nigra frugilega* Klein. — *Cornix nigra, ſeu Cornix frugivora* Aldr. — *Cocis* Alberti Rzac. *Cornix frugivora, ſeu frugilega* Willugh. — *Corvus* (frugilegus) *ater, fronte cineraſcente* Linn. Syſt. Nat. ſp. 3. — *Corvus Calvus nigricans* Barr. Ornith. — *Corvus ſpermologus* Charl. — *Spermologus frugivorus* Sibbal. — Gall. *Corneille moiſſonneuſe*. — Angl. *The Rook*.

E' propria dell' Europa, vola in branco, e vive di lombrichi, e di biade, e perciò è dannoſa alle campagne. Alle *Cornacchie* di molta età tutte le penne, che reſtano tra la baſe del becco e l' occhio, per il continuo grufolare fra la terra per cavare i lombrichi, loro ſi vedono conſumate. Queſta parte, che reſta ſprovviſta di penne, diventa alla viſta bianchiccia, e mutata in callo, o coperta di una ſpecie di forfora.

Dalla *Cornacchia* comune ſi diſtingue ſpecialmente dall' eſser di eſsa maggiore, e per le ſue penne celeſti-nere lucenti.

IN Europa habitat, gregatim volat, & lumbricis, frugibuſque victitat, ideoque plurimum agris infeſta. Cornicibus *aetate provectioribus plumae, quae circa baſim roſtri ad oculos uſque ſitae ſunt, crebro roſtri ad terram attritu, abraſae obſervantur, roſtrum enim in terram profundius ſaepe intrudunt ad lumbricos extrahendos. Pars autem illa plumis ſpoliata, albicante & furfuracea ſubſtantia, vel callo obducitur.*

A Cornice *vulgari diſtinguitur praeſertim magnitudine, qua illam ſuperat, & pennarum nitore nigro-caeruleo.*

T. CXLVI. B. – 18. –

CORNACCHIA, detta Mulacchia nera. — *Cornix Monedula; Lupus; Graccula; Scurra* &c. — *Monedula, ſive Lupus* Aldrov. & Willugb. — *Gracculus vel Monedula, Lycos* Ariſtotelis, Geſn. — *Cornix garrula* Klein. — *Monedula* Briſs. ſp. 6. — *Monedula torquata* Charl. — *Corvus* [Monedula] *fuſcus, occipite ineavo, fronte alis caudaque nigris* Linn. Syſt. Nat. ſp. 5. — Gall. *Choucas*. — Angl. *Iack. Daw*; *The Gack-Daw*.

IL capo di queſta, in paragone del corpo, è aſſai grande, il che ſpiega eſſer ella aſſai aſtuta, e ingegnoſa. Vive in compagnia con le altre della ſua ſpecie, e abita nelle più elevate rupi de' monti, e nelle alte torri ancora, o antiche muraglie, e ne' diſabitati fortilizj, e ſuol fare il nido, almeno in Italia, nelle buche, o ſquarci di queſti tali luoghi. Non laſcia però di covare qualche volta anco negli alberi, e pone ſul principio di Maggio da tre fino a cinque uova, minori di quelle de' *Corvi*, ſiccome più sbiancate, e meno macchiate anco di quelle.

Nell' Autunno ſcende al piano; è dotata di diverſi noccioli, e noci, ſiccome di ciliege,

HUius caput, corporis reſpectu, eſt grandius, quod eam callidi & ſagacis ingenii eſſe arguit. Gregaria pariter eſt, & altiſſimas montium rupes, quandoque etiam deſertas turres, muros antiquos, & arces ruinoſas habitat, ſaltem in Italia, in quarum foraminibus nidulatur. In arboribus etiam interdum nidificat, & ova tria, vel quinque corvinis minora, pallidiora, & rarioribus maculis inſignita primo Maio ponit.

Ad planities in Autumno deſcendit. Ventriculo admodum muſculoſo inſtruitur, veſcitur-

que nucibus, ceraſis, granis, aliiſque frugibus, plu-

un ventricolo molto robuſto; e ſi ciba di ſemi, e di biade, non laſciando anco di ci-

cibarsi d' insetti, i quali per poter più facilmente rintracciare, e attrappare, suole, almeno presso di noi, seguitare i Bifolchi nel tempo, che arano i campi. Nella Svezia su l' Autunno parte dalla Smolandia; nell' Uplandia poi resta tutto l' anno, e la notte alberga nelle torri.

Perchè ella suol nascondere, e sotterrare i tritumi delle biade, che sazia essendo le avanzano, e raccogliendo nel seguente anno nuovo cibo dalle spighe, che indi ne nascono, perciò si dice, che abbia ella insegnato agli uomini l' arte del seminare. Ella è poi molto portata a rubare l' oro, e l' argento, che abbia acquistato il nome di *Monedula*.

pluribusque vescitur insectis, quae animalcula ut devorare, ac colligere facilius possit, Agricolas vomere terras inarantes, saltem apud nos, insequitur. In Svecia Autumno migrat e Smolandia, in Uplandia vero remanet, & per hyemem in turribus pernoctat.

Quia frumenti aliorumque granorum, ubi satiata fuerit, reliquias terra recondit, & spicas sub sequenti anno ex iis ortas colligit, ideo frumentum serendi rationem hominibus ostendisse dicitur. Auri praesertim, & Argenti furacitas in ea mira, unde a moneta, quandoque erepta, & abscondita, Monedula *dicta creditur.* e dall' aver essa trafugato delle monete si crede,

T. CXLVII.

CORNACCHIA, o Mulacchia scherzosa, o sia mischiata di nero e di bianco. — *Cornix altera, sive Monedula ex albo, & nigro varia; naturae lusus.* — *An Cornix varia* Frisch. & Briss. sp. 2. variet. *A, vel Corvus versicolor Feroensis* Worm. Mus.

L' Aldrovando, e il Gesnero ne descrivono una con una specie di collare bianco, la quale egualmente che la quì descritta non si deve reputare, che un' accidental varietà della specie comune.

Quella descritta dal Brisson era bianca nel basso delle guance, nella gola, nel collo inferiormente, nel ventre, e nelle penne maggiori delle ale. Ne sono state anco osservate altre variegate diversamente, a macchie, o

Aldrovrandus, & Gesnerus Monedulam *describunt, torque albo circumdatam, quae ut supra descripta, pro fortuita tantum varietate speciei communis haberi debet.*

Cornix varia Brissonii infima genarum parte, gutture, collo inferiore, medio ventre & remigibus maioribus albis instructa erat. Aliae etiam observatae sunt diverso modo variegatae, maculis, vel zonis, minoribus, crebrioribusque. striscie, minori, e fitte.

† T. CXLVIII.

CORNACCHIA, Mulacchia del Capo di Buona Speranza. — *Cornix Monedula Capitis Bonae Spei.* — *Monedula Capitis Bonae Spei* Briss. sp. 10. — Gall. *Le Choucas du Cap de Bonne Espérance.*

SI è creduto ben fatto ritenere i nomi generici di *Corvo*, di *Cornacchia*, e di *Coraccia* attribuiti a questi Uccelli da diversi Autori, a motivo di qualche differenza in essi osservabile, e perchè non si venisse a caricare un numero troppo grande di specie di un genere solo.

I *Corvi* si distinguono per ragione del becco grande, e superiormente inarcato, e a coltello.

Le *Cornacchie* son più piccole, e sebbene abbiano il becco simile a quello de' *Corvi*, non ostante è un poco più dritto, o meno convesso di quello.

Le *Cornacchie* poi lo hanno rotondetto, meno grosso, e tutto un poco arcato.

Corvi, Cornicis, & Coraciae *generica Auctorum nomina libenter retinuimus, habita ratione differentiae aliquantisper in his Avibus observandae, & ne specierum quantitate unicum tantum genus nimis oneraremus.*

Corvi *rostro donantur magno crasso, ac superius fornicato, & cultrato.*

Cornices *minores sunt corpore, rostro vero* Corvinis *aemulo, licet plerumque rectiore, sive minus convexo.*

Coraciae *autem rostro donantur teretiusculo, minusque crasso, & parumper arcuato.*

6. CORNACCHIA interiormente bianca. = *Cornix candida* Schwenck & Briss. sp. 2. variet. *B. quae non solum pennis in universo corpore donatur albis, sed rostro, pedibus, & unguibus candicantibus.*

7. CORNACCHIA frugilega, o devastatrice de' seminati cenerina. *Cornix cinerea frugilega* Aldrov. Ionst. Schwench.

ench. Klein. Rzac. = *Corvus cinereus* Barr. Ornith. = *Corvus ſemicinereus* Charl. & Sibb.. = *Cornix varia, marina, hiberna* Geſn. = *Cornix cinerea vel varia* Rzac. = *Cornix, ſive Corvus cinereus* Friſch. = *Cornix aquatica* Sibb. = *Cornix cinerea* Briſs. ſp. 4. = *Corvus* [*Cornix*] *cineraſcens, capite, gula, alis caudaque nigris* Linn. Syſt. Nat. ſp. 4. = *Diſtinguitur capite, gula, alis, caudaque nigris, reliquis partibus cinereis ad viride inclinantibus a gula ad medium collum ſubtus nigra, roſtro, pedibus & unguibus pariter nigris. Aeſtate in altiſſimis montibus habitat & nidificat; per Hyemem vero in planitiem deſcendit. Ova quatuor parit referente* Linnaeo *in Fn. Svecica; edit inſecta, & varia cadavera, volat gregatim, erucas depaſcitur, hinc purgat paſcua & prata a vermibus, qui foenum conſumunt; futurae tempeſtatis & venti nuncia in maritimis; edit etiam Limaces & Ranarum capita; eradicat gramina ſub quibus larvae latent; reſpicit ſedens adverſum ventum.*

8. Cornacchia tutta nera di Giammaica. = *Cornix in toto corpore nigra Iamaicenſis.* = *Corvus garrulus ater* Brown. = *Cornix nigra garrula* Sloan. & Raii. = *Naribus amplis* Klein. = *Cornix Iamaicenſis* Briſs. ſp. 5. = *Perpetuo garrit voce ſatis diverſa a voce noſtrarum Cornicum Europearum. Baccis victitat ſicut & Scarabeis. In Iamaica habitat, praeſertim in Inſulae Septentrionali parte, cuius montes incolit.*

9. Cornacchia Mulacchia col collare. = *Cornix, Monedula torquata.* = *Monedula torquata* Charl. & Briſs. = *Monedula altera* Aldr. = *Aliud Monedulae genus* Ionſt. = *In omnibus cum Monedula* Tab. CXLVI. *convenit, praeterquam quod collum habeat albo torque circumdatum. In Helvetia invenitur.*

10. Cornacchia Mulacchia tutta bianca. = *Cornix Monedula candida* = *Monedula candida* Schwench. & Briſs. ſp. 6. variet. *B.* = *A Monedula vulgari differt colore in toto corpore albo, ac roſtro ſubflaveſcente.*

11. Cornacchia Mulacchia tutta nera. = *Cornix Monedula nigra.* = *Monedula nigra; ſpermologus, ſive frugilega* Friſch. cum ſatis accurata Icone. = *Cornix* Charlet. & Sibb. = *Monedula nigra* Briſſ. ſp. 7. = *Monedulae vulgari paullulum craſſitie cedit, ſplendide nigra, punctulis albis oculos ambientibus, roſtro, pedibus & unguibus nigris. Turrium deſtructarum muros frequentat, in quarum foraminibus nidificat.*

12. Cornacchia Mulacchia dell' Alpi. = *Cornix Monedula Alpina. Pyrrhocorax* Geſn. Aldrov. Ionſt. & Briſſ. ſp. 8. = *Monedulam vulgarem craſſitie circiter aequat, in toto corpore nigricat, roſtro recto, non admodum craſſo, luteo, quo colore eiuſdem etiam pedes inficiuntur. Habitat in Alpibus.*

T. CXLIX. B. -- II. --

CORACIA, o Corvo corallino. *Coracias* Aldrov. & Sibb. — *Coracias Pyrrhocorax etiam dicta* Rai. — *Coracia* Ionſt. & Briſſ. ſp. 1. cum optima Icone. — *Coracias, ſive Pyrrhocorax* Willugh.. — *Coracias Ariſtotelis, Pyrrhocorax* Charl. — *Gracculi* tertium genus Geſn. — *Gracculus Coracias roſtro & pedibus rutilis* Geſn. — *Cornix roſtro, pedibuſque rubris* Klein. — *Monedula Pyrrhocorax* Haſſelq. — *Upupa* (*Pyrrhocorax*) *atra, roſtro pedibuſque rubris* Linn. Syſt. Nat. ſp. 4. — Gall. *Coracias; Choucas; Choquar; Chovette rouge, & Corneille, ou Choucas de Cornovaille.* — Angl. *Corniſh-Chough.; Cronwall-Kae; Killegrew.*

PEr ragione del becco ſpecialmente, che è lungo, mediocremente appuntato, e inarcato differiſce da' *Corvi*. Abita nelle rupi, ſopra le Chieſe, ſu i fortilizj diroccati, e ſu gli ſcogli; nelle Maremme frequenta il lido del mare, e dentro terra ſi tiene alla montagna. E' un Uccello piuttoſto comune in Inghilterra, nè ſolamente trovaſi nella Cornovallia, ma nella Wallia ancora, e in tutta la parte occidentale dell' Iſola ſu i lidi declivi e ſcoſceſi alla marina.

Quella, che quì viene rappreſentata, fu più volte mandata al Marcheſe Giovanni Gerini tanto da' monti di Bergamo, che dalle noſtre montagne delle Panie ſopra a Pontremoli, e ſempre fu trovata molto più piccola di quella, che trovaſi alla Tav. CLII.

L' Aldrovando vuole, che quella ſpecie d' Uccello, detto *Pirrocorace*, ſia diverſa dalla *Coracia*; il Bellonio però fa queſti due nomi fra loro ſemplicemente ſinonimi, e ſignificanti un individuo ſolo. Realmente ſi deve confeſſare, che ſia una ſpecie diverſa, ſe tale ſi ritrovi, quale dall' Aldrovando, e dal Briſſon ci vien deſcritta, e tale è quella da noi accennata, e deſcritta ſopra al num. 12. con il becco, e i piedi gialli.

ROſtro praecipue rubro, longiore, modice acuto & inflexo a Corvis *differt. Rupes, templa, arces dirutas, & ſcopulos habitat, mariſque littora, in maritimis, frequentat, in interraneis vero montes. Apud Anglos obvia avis, nec in Cornubia tantum, ſed in Wallia, totoque occidentali Angliae latere ad maris littora declivia, & praerupta invenitur.*

Quae depicta hic obſervatur Avis pluries e montibus Bergomenſibus, & Alpibus noſtris Apuanis ad Marchionem Ioannem Gerinium miſſa fuit, ac ſemper magnitudine illa, quae ſub Tab. CLII. oſtenditur, longe inferior.

Aldrovandus Pyrrhocoracem *Avem a* Coracia *diverſam eſſe contendit; Bellonius vero nomina haec eiuſdem Avis ſynonima facit. Fatendum equidem eſt diverſam eſſe, ſi modo talis reperiatur, qualis ab Aldrovando deſcribitur, nec non a Briſſonio, quae a nobis indicata ſupra fuit inter* Cornices *num.* 12. *ſcilicet roſtro atque pedibus flavis.*

Il Willughby pure, e altri ſtimano, che la *Coracia*, e la *Pirrocorace*, o *Pirrocoracia* dell' Aldrovando, ſieno un Uccello ſolo, ma con poco fondamento, come fra le altre coſe la groſſezza, e la forma del becco, oltre al colore, a ſufficienza lo dimoſtrano. Se il colore ſolamente faceſſe tutta la diverſità, queſto potrebbe probabilmente dipendere dal diverſo ſeſſo, dall'età, dal paeſe, e da altri accidenti, come è credibile, che da queſti unicamente dipenda la differenza, che ſi vede nelle ſpecie ſeguenti, le quali per non aver poi il becco di forma diverſo da qualche ſpecie di *Corvo*, o di *Cornacchia*, non ſi poſſono dire ſpecie vere, e legittime di *Coracia*.

Willughbeius, *aliique* Coraciam, *&* Pyrrhocoracem *Aldrovandi unam eamdemque Avem exiſtimant, at minus recte, ut praecipue roſtri craſſities & forma, praeter colorem, luculenter oſtendunt. Si color tantum differentiam efficeret, oriri haec facile poſſet a ſexu, aetate, loco, aliiſque accidentibus, ut revera ſunt roſtra ſpecierum ſequentium, quae cum hac corporis parte a reliquis* Corvorum *vel* Cornicum *ſpeciebus vix differant, minus recte* Coraciae *verae ſpecies appellari & ipſae debent.*

T. CL. B. — 11. —

CORACIA col becco, e gambe di color carnicino. — *Coracias roſtro, pedibuſque carneo colore infectis: — An Pyrrhocoracis* Aldrov. Geſn. & Ionſt. *varietas?*

QUella ſpecie di *Coracia* nominata *Pirrocorace*, non ſi trova ſolamente nelle montagne d' Inghilterra, e nelle Alpi degli Svizzeri, ma nell' Iſola di Creta ancora, e nelle Cicladi. Appreſſo i Grigioni ſi vede ſoltanto d' Inverno. Devaſta queſta i campi ſeminati di Grano. Grida altamente, e fa un verſo non diſſimile da quello della *Merla*, ma più alto e ſonoro a guiſa di acuta trombetta.

COracias *quae* Pyrrhocorax *appellatur non ſolum in montibus Angliae, & in Alpibus Helveticis invenitur, ſed etiam in Creta, & Cycladibus Inſulis. Apud Rhaetos hyeme dumtaxat cernitur. Agros frumento ſatos depaſcitur. Altum vociferat, & vocem* Merularum *acutam, ac ad fiſtulae ſonum nonnihil accedentem, imitatur.*

T. CLI — 11. —

CORACIA col becco, e gambe nere. — *Coracias roſtro pedibuſque nigris.*

VArietà dell' antecedente, e ſoltanto probabilmente diverſa a motivo dell' età, o del ſeſſo. Dalla maniera colla quale gli Uccelli di queſta ſpecie ſi portano nel volo, arguiſcono alcuni le variazioni, che ſovraſtano nell' aria a motivo del freddo; imperocchè ſe volano molto alto dicono, che ſignifica accreſcimento di freddo, ſe poi volano baſſe, diminuzione di eſso. Quelle che ſi cavano dal nido ſono mangiate dalla poveraglia.

SUperioris varietas, & forte ſexu, vel aetate tantum diverſa. Coracias, *quae* Pyrrhocorax *dicitur apud Rhaetos Hyeme dumtaxat cernitur. Agors frumento conſertos depaſcitur. Ex huius ſpeciei Avis alto volatu frigus augeri, humili vero minui quidam colligunt. Harum Pulli in cibum pauperum menſis cedunt.*

T. CLII. B. — 12. —

CORACIA di montagna, o alpigiana. — *Coracias montana, vel Corvus ſylvaticus.*

IL Geſnero, e l' Aldrovando nominano una ſpecie di *Corvo* ſalvatico, ma lo deſcrivono corredato di un ciuffo, onde comparirebbe alla prima per diverſo dal noſtro. Altri però pretendono, che ciò naſca da un mero accidente, e lo ſteſſo Geſnero aggiunge, che un tal ciuffo non appariſce ne' giovani. E' probabile dunque, che tutte le denominazioni che ſi troveranno aggiunte alla *Coracia* col ciuffo, citata poco più ſotto al num. 7. competano pu-

GEſnerus, & Aldrovandus Corvum *habent ſylvaticum, ſed criſtatum, ideoque a noſtro hic depicto primo intuitu diverſum. Nonnulli autem* Corvum *criſtatum pro fortuita tantum varietate exiſtimant, additque ipſe Geſnerus talem criſtam non apparere in iunioribus. Probabile igitur videtur ſynonima omnia, quae ad* Coraciam *criſtatam infra num. 7. appoſita ſunt huic quo-*

pu'e a queſta noſtra. Queſta fu ammazzata intorno a Volterra antichiſſima Città della Toſcana.

Il *Corvo* montano deſcritto dalla maggior parte degli Autori trovaſi particolarmente nelle montagne degli Svizzeri, nella Baviera, nella Lorena, nella Stiria, e nell' Ungheria lungo il Danubio. Si trattiene ne' luoghi aſpri, e forti ſulle montagne, e ſuol covare nelle fabbriche e torri deſolate di tali luoghi. Due, o tre ſogliono eſſer le uova, che ella produce. Alle pianure non ſcende mai, e ſi ciba tanto di biade, che di vermi, e di diverſi inſetti, come di Cavallette, Grilli, Scarabei, e ſimili. Si può allevare, e rendere anco agevole, e allora ſi nutriſce di latte, di diverſi ſemi, di pane, e di carne.

Per aſſerzione del ſopraccitato Geſnero la Caccia di queſta ſpecie di *Corvo* è molto gradita da' Principi, ed i teneri ſono anco graditi alle loro tavole, come una delicata vivanda, per avere una carne di guſtoſo ſapore, e le oſſa aſſai tenere. Coloro, che gli cercano, e cavano di nido, ſogliono in ogni nido laſciarne uno, perchè non ſi sdegnino, e tornino volentieri a covare nel medeſimo poſto l' anno, che ſegue.

quoque competere poſſe. Coracias *montana noſtra occiſa fuit circa Volaterram antiquiſſimam Etruriae Civitatem.*

Corvus *ſylvaticus Auctorum in montibus praecipue Helvetiae, nec non in Bavaria, Lotharingia, Stiria, & Hungaria ad Danubium habitat. In locis praecipue montanis & deſertis degere ſolet, ubi in rupibus, turribus & arcium deſtructarum muris nidificat. Bina, aut terna ova parit. Ad planitiem non deſcendit; edit fruges, vermes, Locuſtas, Grillos, Scarabeos, & alia plura Inſecta. Cicurari etiam & inſtrui poteſt, atque tunc lacte, granis pluribus, pane, aeque ac carne ſaginatur.*

Ipſo Geſnero teſte huius ſpeciei Corvi *expetuntur a Regibus in ipſorum Venationibus & menſis, eorumdemque pulli in cibis, & in deliciis habentur, ſuavi cum ſcateant carne & oſſibus mollibus. Qui e nidis eos auferunt, in ſingulis ſingulos relinquere ſolent, ut anno ſequente libentius redeant.*

T. CLIII.

CORACIA cerulea, o celeſte; altrove anco detta Gazza marina, Ghiandaia marina, Cornacchia celeſte, e Picchio marino femmina. — *Coracias caerulea; aliis Cornix caerulea, Pica marina, Picus marinus* [*foemina*] — *Pica marina* Aldr. — *Cornix caerulea* Geſn. Aldr. Schwenck, Ionſt. & Worm. — *Garrulus Argentoratenſis* Ionſton. & Willugh. — *Garrulus caeruleus, ſeu Pica caerulea* Friſch. — *Garrulae vel Picae glandariae genus alterum* Geſn. — *Pica, ſeu Garrulus Argentoratenſis; Cornix fera picta, caerulea* Klein. — *Pſittacus Germanicus* Schwenck. — *Corvus dorſo ſanguineo (mas) remigibus nigris, rectricibus viridibus* Linn. Fn. Svec. edit. 1. — *Coracias* [*garrula*] *caerulea dorſo rubro remigibus nigris* Linn. Fn. Svec. edit. alt. & Syſt. Nat. ſp. 1. — *Galgulus* Brif. ſp. 1. — Ga. *Le Rollier.* — Angh. *The Roller.*

TRa gli Uccelli Europei è il più vago, che ſi trovi per i colori, e perciò da qualcuno ha ricevuto anco il nome di *Pappagallo*. Sul tempo della mietitura ſi poſa ſulle barche di Grano, cibandoſi de' ſuoi granelli, e d' inſetti ancora, che trova ne' campi. In altri tempi poi và per le campagne tanto in cerca d' Inſetti, che di coccole ſalvatiche, ordinario cibo, di eſſo, e de' ſuoi figliuoli.

La *Ghiandaia* del Capo di Buona Speranza dell' Albino non poco a queſta ſi raſſomiglia. Queſta noſtra ſpecie di *Coracia*, detta di Trasburgo, ha la lingua corredata di due appendici biforcate, e di due tubercoletti ſcoperti di piuma intorno all' occhio. Secondo l' Ionſton la femmina è diverſiſſima dal maſchio, vale a dire di un color caſtagno roſſiccio nel capo, collo, petto, e baſſo ventre. Fu detta *Garrulo* dal continuo gracchiare che fa, e di *Trasburgo* dal luogo intorno al quale maſſimamente ſi trova. Alcune volte paſſa nell' Iſola di Malta, e in Francia.

Avis maxime variegata, pictaque coloribus variis inter Europaeas, unde nomen Pſittaci *adepta eſt. Meſſis tempore frumento congeſto inſidet, granis veſcens, & inſectis in agris deliteſcentibus. Extra vero meſſem, ſe, prolemque baccis ſylveſtribus, variiſque inſectis nutrit. Pica glandaria Capenſis Albini proxime ad hanc accedit.* Coracias *noſtra caerulea, Argentoratenſis dicta, linguam habet duabus bifurcatis appendicibus inſtructam, nec non tuberculis, ſeu verrucis nudis ad oculos poſitis donatur.*

Ionſtono teſte foemina toto coelo a mare differt, ſcilicet capite, collo, pectore, & ventre ex caſtaneo ad leucophaeum vergentibus. Garrulus *dicta haec fuit a garritu,* & Argentoratenſis *a loco, in quo maxime degere ſolet. In Melitam Inſulam, & in Galliam interdum migrat.*

In

Il

Il Sig. Linneo c' informa, che si trova anco in Svezia, nella Smolandia, nella Scania, e in altre Provincie. Il Wormio poi ci dice; che costruisce il nido a forma di quello della *Bubbola*, che è Uccello puzzolente, e che dimora ne' boschi, e luoghi disabitati. E' molto simile alla *Ghiandaia*, che si trova alla Tavola CLXIV. anzi per quanto io credo è l' istessissima specie.

In Smolandia etiam, Scania, aliisque Sveciae Provinciis habitat adserente Linnaeo. Wormii testimonio nidum ut Upupa *construit, foetere semper solet, atque in sylvis, locisque non frequentatis degit. A* Pica *marina sub Tabula CLXIV. depicta vix differt, immo meo iudicio ipsa, atque unica Avis est species.*

T. CLIV.

CORACIA dell' Isole Filippine. — *Coracias Philippensis.* — *Monedula Philippensis* Briss sp. 9. — Gall. *Le Choucas des Philippines.*

APpena è più grossa di una *Merla*, e canta assai bene, onde si può dire assai distinta specie da tutte le altre.

MErulam *paullulum crassitie superat, optimeque sibilat, vel potius canit; unde plurimum ab aliis speciebus diversa.*

7. CORACIA col ciuffo, o Corvo alpino col ciuffo, detto anco in qualche luogo d'Italia Corvo spelato, o Corvo marino. = *Coracia cristata, sive Corvus alpinus cristatus. Coracia cristata* Briss. sp. 2. = *Corvus sylvaticus* Gesn. Aldrov. Willughb. = *Corvus alpinus* Schwench. = *Upupa montana, & Eremita montanus Helveticus* Klein. = *Arquata sylvatica nigra* Barr. Ornith., = *Upupa [Eremita] viridis, capite flavo, cervice iubata* Linn. Syst. Nat. sp. 3. = *A* Brissonio *describitur rectricibus superne ex nigro ad viride vergentibus, subtus nigris, cauda brevi, rostro rubicundo, longiusculo, pedibus obscure rubentibus, pennis occipitii ceteris longioribus, & cristam retro dependentem efformantibus. A* Kleinio *autem dicitur profunde viridis, capite, luteo, passim maculis sanguineis notato, crista prout iuba equina, plumis lucentibus, rostro rubro, pedibus fuscis. Ex allatis igitur descriptionibus plures huius Avis reperiri species, vel saltem varietates desumere licet. Quae a* Brissonio *describitur, in montibus Helvetiae habitare, in altis arcium destructarum muris nidificare, & bina, vel terna ova parere dicitur.*

T. CXLV. B. — 61. —

GAZZERA comune, detta anco in diversi luoghi d' Italia Gazza; Gazza con la coda lunga; e Putta; appresso di noi volgarmente Cecca. — *Pica varia, sive caudata* Gesn. Aldr. Ionst. Willugh. Rai. Alb. & Frisch. —*Pica* Briss. sp. 1. — *Pica Rusticorum vulgaris* Klein. — *Cressa atro ventre & alarum extremis albis* Barr. Ornith. — *Corvus [Pica] albo, nigroque varius, cauda cuneiformi* Linn. Syst. Nat. sp. 10. — Gall. *Pie; Iaquette; Dame; Agasse.* — Angle *Pie; Piaret; Magpye.*

QUesta specie di *Gazzera* è particolare dell' Europa, ed è anzi tanto generalmente conosciuta, e sì comune intorno Firenze, che credo superfluo il parlarne minutamente. Non teme neppure i paesi freddissimi, perchè ella è comune anco in Inghilterra, e per asserzione di Linneo comunissima pure in Svezia.

Partorisce da cinque fino in sette uova, nè quasi mai di più, più piccole di quelle de' *Corvi*, più sbiancate di colore, e asperse di minutissime macchie, in un nido fabbricato sugli alberi con maraviglioso artifizio, tessuto in giro, sotto e sopra di spine, e tutto chiuso alla riserva di un piccol foro lasciatovi per l' ingresso.

Il suo vitto è lo stesso affatto di quello della *Cornacchia*, e della *Mulacchia* nera; alcune volte dà dietro alle *Passere*, e altri uccelletti, i quali se gli mangia. Ne' nostri luoghi stanzia tutto l' anno, e pone il nido sopra i Pioppi, e sopra i Pini. Si rileva, e si

EUropaea est, atque apud nos in Etruria, immo circa Florentiam Urbem adeo frequens, omnibusque ita nota Avis, ut in ea describenda diutius immorari minime necessarium duxerimus. Climata nec frigidissima timet, nam in Anglia, & Svecia teste Linnaeo vulgatissima est.

Ova parit una vice quinque, vel sex, interdum etiam septem, vix unquam plura, Corvinis *minora, ac pallidiora, maculis creberrimis picta, nidumque in arboribus magna solertia construit, in circuitu supra, infraque horrida spinis artificiosissime munitum, unico dumtaxat foramine, eoque angustissimo pro introitu sibi relicto.*

Victus huic idem, qui Cornici, *&* Monedulae. Passeres, *aliasque Aviculas quandoque etiam invadit & devorat. Apud nos toto anno degit, nidumque struit supra Populos nigros, vel*

si rende domestica facilmente, e allora si suol nutrire con pane inzuppato, con pappa, e altri domestici cibi.

Impara poi a parlare tanto bene, che non solo scolpisce a perfezione le parole, ma qualche discorso ancora, in maniera che se non fosse visto l' animale, sarebbe facilmente preso e scambiato per qualche uomo. Si rileva poi nella maniera stessa che la *Ghiandaia*, della quale sarà tenuto discorso alla T. CLXI.

vel Pinos. Mansuescit facillime & cicuratur, tumque pane madido, panatellis, aliisque domesticis ferculis nutritur.

Sermonem humanum optime addiscit ita, ut non solum articulatas voces, sed integras sententias proferat, tanta saepe similitudine, ut nisi Avis observaretur manifeste, pro homine loquente facillime acciperetur. Cicuratur autem eadem norma, qua Pica Glandaria, *de qua sermo erit sub Tab. CLXI.*

T. CLVI. B. – 14. 1.

GAZZERA bianca. — *Pica caudata alba.* — *Pica alba* Worm. Mus. — *Pica candida* Briss. & Rzac. — Gall. *Pie blanche.*

LA *Gazzera* bianca è stata sempre reputata una rarità, ed una cosa molto insolita, a segno che Scaligero volendo esprimere la difficoltà di trovare a suo tempo un Giudice giusto, e incorrotto, disse: *ma un Giudice buono è più raro adesso d' una Gazzera bianca*. Una ne fu mandata al Wormio dalla Norvegia, un' altra si conservava ultimamente a Parigi nel Museo di Mr de Reaumur tutta bianca, e macchiata un poco di nero soltanto nella cima del becco. Un' altra parimente è quella, che quì si vede, stata ammazzata in Toscana.

PIca *alba pro re insolita ac rarissima habita semper fuit, unde Scaliger de Iudice iusto haec pronunciavit*: sed Iudex bonus est Pica nunc rarior alba. *Una ex Norvegia ad Wormium missa ab amico fuit, altera nuper asservabatur Parisiis in Museo Realmuriano tota candida, excepto rostri apice, maculis quibusdam nigricantibus notato; alia pariter interfecta apud nos fuit, & ea est, quae hic depicta observatur.*

T. CLVII. B. – 7. –

GAZZERA minore di Bengala, specie di Storno secondo altri. — *Pica minor Bengalensis* Edw. — *Saularis Maderaspatanus* Rai. — *Lanius Bengalensis niger* Briss. sp. 19. — *Lanius Bengalensis* Alb. — *An Fringilla nigra* Klein. — *Gracula [saularis] nigro-caerulescens, abdomine, macula alarum, rectricibusque lateralibus albis* Linn. Syst. Nat. sp 5. — Gall. *Petite Pies des Indes.* — Angl. *Saulary; Cock Sauary; Dialbrid.*

SEcondo Edward il maschio di questa specie è di color nero lucido, e cangiante in celeste e porporino, e soltanto biancheggiano alcune poche penne delle ale, fra le minori. L' intermedie della coda sono nere, e bianche le laterali, per la qual cosa si vede che questa nostra deve essere il maschio.

Dal Raio il maschio è descritto della grandezza di uno *Storno*, mischiato di bianco, e di nero, bianco cioè nel petto, ventre, cosce, nel di sotto della coda, e per un piccolo spazio nelle ale, e in tutto il restante nero. La femmina poi si distingue per esser mista di bianco, e di scuro, e per aver la coda appuntata. E' naturale dell' Asia, e trovasi in specie nel Regno di Bengala.

SEcundum Edwardum in huius speciei mare color niger est splendidus, purpureoque, & caeruleo varians. Ex minoribus alarum remigibus quaedam tantum albicant. Caudae rectrices intermediae sunt nigrae, laterales vero candidae, ideoque nostra mas dici potest.

A Raio autem mas dicitur ex albo nigroque mixtus, magnitudine Sturni, *cum pectore, ventre, femoribus, parte caudae inferiore, & areola in alis albissima, ceteris partibus nigricantibus; foemina vero fusco, alboque varia, distinguiturque etiam a mare cauda acuminata. In Asia habitat praesertim in Bengalensi Regno.*

T. CLVIII. B. – 8. 1. ½

GAZZERA Americana nera e gialla. — *Pica Americana luteo nigra varia* Edw. — *Pica luteo nigra varia* Sloan. & Rai. — *Pica ex luteo & nigro varia* Kl. num. 10. — *Picus, pullus, cirratus cauda lutea* Linn. Syst. Nat. edit. 6. — *Cissa Americana, nigra, cirrata, cauda lutea* Barr. Ornith. — *Turdus oculis caeruleis* Kl.

num. 20. — *Turdus luteo niger, gutture piloſo, capite, gula, roſtroque, dorſo, caudaque nigris; cervice, uropygio, & toto ventre luteis, alis nigris, tectricibus albo fimbriatis, roſtro unciali* Kl. num. 33. — *Pica ex luteo nigro varia* Catesb. — *Avis de Banana* Alb. — *Picus Americanus nidum ſuſpendens Guira-Tangeima Braſilienſium* Marcgravio Willg. — *Picus Americanus, maior, pullus, cirratus, cauda lutea, nidum ſuſpendens* Barr. Ornith. — *Guira-Tangeima Braſilienſium* Marcgravii, *ſeu Picus nidum ſuſpendens* Rai. — *Guira-Tangeima Braſilienſibus* Marcgr. Ionſt. — *Icterus* Briſs. ſp. 1. — *Xanthornus maior nigro varius* Brow. — *Coracias* [*Xanthornus* [*flava, capite, remigibuſque primoribus nigris* Linn. Syſt. Nat. ſp. 6. — Gall. *Le Troupiale; Oiſeau de Banana; Pie iaune & noire.* — Angl. *Large Banana Bird; Yellow and black Pie; Yellow Wood-pecher.*

TRovaſi nella Carolina, alla Giammaica, alla Martinicca, a Caienna, e in tutto il Braſile, ſiccome nella Guiana. Si dice eſſere Uccello aſſai docile, e ſoſpendere il ſuo nido di figura cilindrica all' eſtremità de' rami, artificioſamente fatto di fuſcelletti, come appunto fa ancora il *Rigogolo*.

HAbitat in Carolina, Iamaica, Martinica, Cayana, Braſilia, & Guiana tota. Avis dicitur valde docilis, atque nidum egregium extruit cylindraceae figurae, quem e virgultis conſtructum, in arboribus, extremitatibus ramorum, ut Oriolus, *ſeu* Picus nidum ſuſpendens vulgaris, *appendit.*

T. CLIX. B. -- 19. 1. ½

GAZZERA Orientale. — *Pica Orientalis* - — *Pica Orientalis cauda duabus pennis longiſſimis* Edw. — *Manucodiata criſtata ex albo nigroque variata* Rai. — *Avis Paradiſiaca Orientalis, ex albo & nigro varia* Seb. — *Pica ex albo & nigro varia, duabus caudae pennis ſimplicibus praelongis* Kl. — *Pyrrhocorax* Moehr. — *Pica Papoenſis* Briſſ. ſp. 6. — *Corvus* [*Paradiſi*] *albo, nigroque varius, cauda cuneiformi, remigibus intermediis longiſſimis, capite nigro criſtato* Linn. Syſt. Nat. ſp. 11. — Gall. *La Pie de l' Isle Papoe*, — Angl. *The Pie bird of Paradiſe.*

NElla grandezza del corpo è poco maggiore di una *Merla*. Trovaſi nell' Indie Orientali nell' Iſola di Papoa. Ella tra le altre coſe, delle quali ſuol cibarſi, ruba il Cotone, mangiando volentieri i ſuoi ſemi.

COrporis craſſitie Merulam *non multum ſuperat. Habitat in Inſula Indiae Orientalis Papoe dicta. Goſſypium furatur, cuius ſeminibus inter alia veſci delectatur.*

6. GAZZERA del Senegal. = *Pica Senegalenſis* Briſs. ſp. 2. cum optima icone. = *Picae vulgari paullulum craſſitie cedit; colore nigro-violacea; remigibus maioribus, rectricibuſque fuſcis; roſtro, pedibus & unguibus nigris.*

7. GAZZERA di Giammaica. = *Pica Iamaicenſis* Briſs. ſp. 3. = *Ipſius longitudo ab apice roſtri ad caudam extremam undecim pollices Pariſienſes & novem lineas aequat. Mas nigro violaceo colore inficitur; remigibus maioribus ſuperius, & ſubtus nigris. Foemina in toto corpore fuſca eſt, ſuperne ſaturatius, inferne dilutius. Oculi griſei ſunt, roſtrum, pedes, ungueſque nigri. Pica nigra Iamaicenſis plumis interſperſis purpureis* Kl. num. 12. *nec non Merops niger iride ſubargentea* Brow. *vel Monedula purpurea* Catesb. *atque Izanati* Fernand. & Rai. *non aliam exprimunt Avem, ac ſignanter huius ſpeciei foeminam, cuius pennae fuſcae & ſplendentes ſunt ad rufum tendentes. Mas vero pertinet ad Monedulam totam nigram* Sloanii. *A* Linnaeo *dicitur Gracula* [*Quiſcula*] *nigro-violacea, cauda ſubcuneiformi* Syſt. Nat. ſp. 6.

8. GAZZERA maggiore del Meſſico. = *Pica Mexicana maior* Briſs. ſp. 4. = *Hocitzanatl* Rai. *quae Monedulam noſtratem corporis craſſitie ſuperat, colore e nigro ad caeruleum vergente, remigibus maioribus interius, & ſubtus nigris; roſtro, pedibus & unguibus pariter nigris. Garrula eſt Avis, altaeque vocis & ſonorae. Habitat in Mexico, verſaturque circa Urbes.*

9. GAZZERA piccola, o minore del Meſſico. = *Pica Mexicana minor* Briſs. ſp. 5. *Tzanaboei, ſeu Pica Mexicana Hernandezii* Rai. = *Picam vulgarem magnitudine & craſſitie circiter adaequat, colore nigricante, capite & collo ad fulvum colorem inclinantibus, cauda prolixa, ut in caudata Europaea; roſtro, pedibus, & unguibus nigris. Habitat in Mexico, & ut noſtra humanas voces facile diſcit.*

T. CLX. B. -- 7. --

GARRULO di Boemia, detto altrimenti Beccofruſone, e Galletto di Boſco. — *Garrulus Bohemicus* Aldr. Geſn. & Willug. — *Bombicilla Bohemica* Briſs. T. II. p. 333. *ad Turdi genus relata.* — *Turdus criſtatus, roſtro brevi ad ortum lato Europaeus* Kl. — *Turdus criſtatus, aut Bohemicus* Friſch. — *Bombicilla incendiaria* Schwenck. — *Gnaphalus* Geſn. — *Picae Glandariae genus* Ionſt. — *Microphoenix* Fabr. — *Ampelis* Moehr. — *Ampelis remigibus quibuſdam apice membranaceo terminatis* Linn. Fn. Svec. edit. pr. — *Lanius* [*Garrulus*] *remigibus ſecundariis apice membranaceo colorato, cauda integra* Linn. Fn. Svec. edit. alt. & Syſt. Nat. ſp. 10. — Gall. *Le Iaſeur de Boheme.* — Angl. *The Bohemian Gayor Chatterer.*

Le

LE maggiori penne dell' ale in queſt' Uccello dall' undecima fino alla decimaſettima terminano in una ſorta di membrana di color cremiſi. Affermano molti, che ſia originale, e proprio della Boemia. Altri però l' hanno ritrovato anco in altre Provincie della Germania, ſiccome in Svezia, particolarmente all' entrar dell' Inverno.

Per aſſerzione di Linneo nell' Eſtate ſe ne parte, e probabilmente nidifica in Paeſi piu Settentrionali. Sta ordinariamente nelle ſelve, e ſi ciba di frutti, fra quali in modo particolare ama l' Uva, e le coccole di Ginepro. E' Uccello di gran paſto, e facilmente ſi alleva.

Chi deſideraſſe di queſto una più ampia deſcrizione, la potrà vedere nelle Miſcellanee del Padre Balbino attenenti al Regno di Boemia Decade I. lib. I. cap. 71. Un altro ſe ne deſcrive dal Klein proprio della Carolina, e detto dal Catesby *Turdus Garrulus Carolinienſis*, il quale per i colori non vale a un gran pezzo quello d' Europa. L' eſatta deſcrizione delle parti interne del *Garrulo Boemico* ſi può anco vedere appreſſo l' Aldrovando.

Quello ſtato in queſt' Ornitologia dipinto era una femmina, ed aveva l' uova quaſi perfezionate, ſtata ammazzata in Febbraio. Dopo tal tempo non ſe ne ſono quà mai più veduti.

REmiges in hac Ave ab undecima ad decimam ſeptimam terminatae ſunt membranula oblonga, coccinea. Bohemiae peculiarem eſſe hanc dicunt plures. In aliis vero Germaniae Provinciis ab aliis reperta, pariterque in Svecia, inſtante praeſertim Hyeme.

Teſte Linnaeo Aeſtate migrat, & nidificat in Boreales terras. Habitat in ſylvis, ac fructibus victitat, delectaturque praecipue Uvis, & Iuniperi baccis. Maxime eſt vorax, & cicuratur facile.

Qui Avis huius amplam deſiderat deſcriptionem, hiſtoriam eius videat in Miſcellaneis Regni Bohemiae P. Balbini Decad. I. lib. I. cap. 71. Huius varietas a Kleinio proponitur, quae dicitur Turdus Garrulus Carolinenſis *Catesbey, & coloribus non valet quantum Europaea.* Garruli *Bohemici interiorum partium, & viſcerum deſcriptio apud Aldrovandum videatur.*

Quae depicta hic conſpicitur Avis, foemina erat, ovis quaſi ad excluſionem proximis onuſta prope Florentiam Februario menſe occiſa. Avis haec nullo alio tempore obſervata amplius fuit.

T. CLXI. B. -- 11. --

GHIANDAIA comune, altrove detta ancora Gazza Ghiandaia, Berta, e Bertina. — *Pica Glandaria, vel Garrulas Avis* Geſn. — *Pica Glandaria* Aldrov. Schwenck. Ionſt. Willugh. Rai. Charl. — *Galgulus roſtro nigro, cinereus, ad alarum latera caeruleus* Barr. Ornith. — *Garrulus* Briſs. ſp. 1. — *Corvus* [*glandarius*] *tectricibus alarum caeruleis, lineis tranſverſis albis nigriſque, corpore ferrugineo variegato* Linn. Syſt. Nat. ſp. 7.

LA lingua di queſt' Uccello è membranacea, e diviſa in due; è naturale d' Europa, e comunemente ſtà nelle Querce, cibandoſi eſſo ordinariamente di ghiande, volendo anche alcuni, che, come la formica, per l' Inverno ſe le ſerbi in luoghi aſcoſi, e ſicuri. Quantunque egli abbia ſortito il nome dalle ghiande, che ſuol comunemente mangiare, non laſcia però di mangiare altre coſe, come ſono i lamponi, l' uva ſpina, le ciliege, e altri frutti, e mandorle, o noccioli.

Fa il nido ſu gli alberi molto alti, e ſpecialmente riveſtiti di folta ellera, facendo quattro, o cinque uova, e alcune volte anco fino a ſette, le quali ſono d' un guſcio aſſai ſottile, del color di terra d' ombra, e ſpruzzate minutiſſimamente di punti più oſcuri in molta vicinanza fra di loro. Ella le partoriſce ſul principio d' Aprile, e al principio di Giugno ne ſuol deporre altrettante. Fabbrica il nido eſternamente teſſuto di ſterpi robuſti, in-

LIngua donatur membranacea bifida; Europaea eſt Avis, ac communiter in Quercubus habitat, e quibus glandes pro una, maximeque uſitata cibi ſpecie decerpit, & quas etiam, nonnullorum auctoritate, formicarum conſimili more nec abſimili praevidentia, pro Hyemali tempeſtate in latebris, tutiſque locis recondere, & adſervare ſolet. Licet Picae Glandariae *nomen a glandibus ei inditum ſit, tamen fructus Rubi idaei, groſſularias, & ceraſa, alioſque fructus, & nucleos avidiſſime vorat.*

In proceris ac denſis arboribus praecipue antiqua obvallatis hedera nidificat, & ova quatuor vel quinque, quandoque etiam ſeptem in nido ponit; quae cortice ſunt tenui, colore terreo imbuta, punctis creberrimis obſcuriore colore tinctis adſperſa. Excludit ea ineunte Aprili, totidemque iterum ſub principio Iunii deponere ſolet. Nidus externe virgulis varie contextis, interne flexibilibus & ſiccis herbarum ra-

in-

internamente di radichette fecche, e fleſſibili di erbe. Intorno all' educazione di queſta ſi veda l' articolo ſeguente, dove di ciò ſi parlerà.

radiculis extructus communiter obſervatur. De huius Avis educatione ad articulum ſequentem adnotata vide.

T. CLXII. B. -- 11. --

GHIANDAIA bianca. — *Pica glandaria alba.* — *Garrulus albus* Briſs. variet. A.

NOn differiſce dall' antecedente, che nel colore, la qual varietà per altro in queſta ſpecie d' Uccello è ſtimata coſa aſſai rara.

Allevandola di nido, fino che non abbia paſſati i due anni è atta a imparare non ſolo a contraffare il fiſchio, e il canto di diverſi Uccelli, ma i verſi ancora, e la voce del Cane, del Gatto, della Gallina, il pianger de' Fanciulli, la Trombetta, ed a ſcolpir bene qualche parola umana, Acciò poſſa in ciò rieſcire le ſi taglia a buon' ora lo ſcilinguagnolo, o freno della lingua, e allorchè ſi alimenterà nelle caſe, ſarà il ſuo cibo cuore, pane, zuppa, o pappa, e frutti.

Il Conte Ginanni vuole, che queſta impari più facilmente, e parli meglio della *Gazzera*; tutti almeno la riconoſcono più proclive di eſſa a gracchiare. Finalmente ella è portata nelle caſe a rubare, e naſcondere diverſe coſe, come ornamenti femminili, monete, e altre piccole bagattelle, egualmente che la *Gazzera*, e la *Mulacchia*.

APica Glandaria vulgari ſuperius oſtenſa non niſi colore albo differt; haec tamen coloris varietas in hac Avis ſpecie admodum inſolita exiſtimatur.

Si e nido ereptam domi ipſam educare volueris, intra biennium potis eſt non ſolum ſibilum, vel cantum quarumdam Avium aemulari, verum etiam voces Canum, Felium, Gallinarum, Puerorum gemitus, & minuſculae Tubae ſonum; etiam voces humanas aliquas plane articulatas ediſcit. Ut vero ad id aptius adſueſcat, prima aetate linguae ei frenum reſecare oportet, domique dum nutritur, eius cibi cor bubulum, panis madidus, ſive elixus, & varii fructus erunt.

Comes Ginannius hanc humanum ſermonem addiſcere, & articulate loqui Pica *varia caudata melius aſſerit; ſaltem pro Ave magis garrula hanc venditant omnes. Tandem non ſecus, ac* Pica caudata, *&* Monedula *dum in domibus habitant, minora utenſilia varia, foeminarum plura ornamenta, nummos, & ſimilia furari, & abſcondere ſolet.*

T. CLXIII. B. -- 10. --

GHIANDAIA nucifraga, volgarmente detta Ghiandaia Nocciolaia. — *Pica nucifraga, vel nucifragus* Klein. — *Nucifraga* Schwenck & Briſſ. ſp. 1. — *Oſſifragus* Geſn. — *Coccothrauſtes* Char. — *Turdela ſaxatilis* Aldr. Rzc — *Caryocatactes* Geſn. Turn. & Willug. — *Merula ſaxatilis* Ionſt. — *Pica Abietum nigra punctata, ſive guttata* Friſch. — *Graculi alpini, ſeu montani genus Turneri* Schwenck. Klein. — *Corvus* [*Caryocatactes*] *fuſcus, alboque punctatus, alis caudaque nigris, rectricibus apice albis, intermediis apice detritis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 9. — Gall. *Le Caſſenoix; Pie Grivelée.* — Angl. *Nut-Breaker; Nut-Cracker.*

IL Kleinio oſſervò due varietà di queſta ſpecie. Una tutta macchiata di ſcuro, e di sbiancato, ſul far dello *Storno*, col becco robuſto, e angolare, con la lingua più lunga di quella della *Cornacchia*, e diviſa, ſul fare delle altre *Gazze*. L'altra, che era minore di corpo, con la lingua molto corta, e ſituata tutta nelle fauci, e più feſſa dell' altra, col becco lungo quaſi due pollici traſverſi, rotondetto, e con la mandibula ſuperiore che ſopravanzava l'inferiore. La prima ſchiaccia perfettamente, l' altra ammacca, e apre le nocciole, e tutte due ſi cibano di noci, di mandorle, di ghiande, di varie coccole ſalvatiche, e d' inſetti ancora. Pongono il nido nelle buche degli alberi, e nell' Autunno, egualmente che la *Ghiandaia*, ripongono nelle buche de' me-

KLeinius duas huius Avis novit varietates.

Alterius totum corpus fuſcis & albentibus maculis varium ad inſtar Sturni, *roſtro valido anguloſo,* Cornicis *lingua, prout omnium* Picarum, *nonnihil diviſa, & longiore. Alterius, quae minor, lingua breviſſima, quaſi in gula poſita, & ad angulum mandibularum terminata, magiſque fiſſa inſtructa eſt, roſtro duas fere uncias longo, teretiuſculo, mandibula ſuperiore longiore. Illa exquiſite frangit, haec pertundit nuces avellanas, ambae vero nucibus variis, amygdalis, glandibus, & baccis variis ſylveſtribus, immo & inſectis etiam veſcuntur. Nidificant in cavis arboribus, & Autumno nuces glandeſque, pro-*

medesimi alberi tali cose. La voce di questa *Ghiandaia* è simile a quella della *Gazzera*. In Toscana per altro non si trova, bensì è comune ne' monti del Bergamasco, e trovasi anche in Austria, e in altre parti della Germania. Per relazione del Brisson una gran quantità di questi Uccelli fu osservata in Francia il 1753.

prout Pica Glandaria *in arboribus recondunt. Vox* Picis *caudatis similis. In Etruria non invenitur, verum vulgaris est in montibus Bergomensibus; habitat etiam in Austria, aliasque Germaniae regiones quandoque frequentat. Anno* 1753. *teste Brissonio huius speciei Aves magno numero in Gallia observatae fuere.*

T. CLXIV. B. -- II. I.

GHIANDAIA marina. — *Pica marina; vel Pica Glandaria marina.*

QUantunque nella raccolta originale del Marchese Gerini trovisi questa figura come una specie distinta, e per tale sia quì stata introdotta, ed espressa da' nostri incisori, tuttavolta ella non è diversa da quella, che si vede alla Tav. CLIII. cioè l' istessa *Coracia celeste*, con questa sola differenza, che quella è stata disegnata e mostrata per la parte di sopra, questa per di sotto. Non è quest' Uccello molto raro fra di noi; viene di Maggio, e parte d' Ottobre. Più altre cose attenenti a questa specie d' Uccello si possono vedere sotto l' accennata Tav. CLIII.

LIcet in Geriniano autographo codice ut genuina, ac distincta Avis species haec demonstretur, & a nostris sculptoribus pro diversa ab aliis omnibus scupltis depictisque inserta hic sit, eadem revera est Avis, quam sub Tab. CLIII. descripsimus, scilicet Coracias caerulea, *illa desuper tantum, haec vero ex inferna parte observata. Non infrequens est apud nos, mense que Maio adventat, medio vero Autumno evadit. Reliqua ad Avem hanc pertinentia sub indicata Tab. CLIII. videantur.*

5. GHIANDAIA di Caienna. = *Pica Glandaria Cayanensis.* = *Garrulus Cayanensis* Bris. sp. 2. = *Picam Glandariam vulgarem crassitie circiter aequat, superne dilute violacea, inferne alba, capite anterius & collo inferiore nigris, tribus utrinque maculis in capite albis, rectricibus apice albis; rostro, pedibus, unguibusque griseis. In Cayana habitat.*

6. GHIANDAIA scura del Canadà. = *Pica Glandaria fusca Canadensis.* = *Garrulus Canadensis fuscus* Briss. sp. 3. cum accurata icone. = *Picam Glandariam vulgarem quasi crassitie adaequat, superne fusea, inferne cinereo-alba, capite anterius sordide albo-flavicante, rectrieibus apice albidis; rostro, pedibus, & unguibus nigricantibns. Habitat in Canada.*

7. GHIANDAIA blù col ciuffo del Canadà. = *Pica Glandaria caerulea cristata Canadensis.* = *Pica Glandaria cristata, purpureo--caerulea* Klein. = *Garrulus Canadensis caeruleus* Briss. sp. 1. = *Crassitie Merulam non multum antecellit, superne caerulea, inferne cinereo-alba, torque nigro, rectricibus caeruleis, nigro transversim striatis, lateralibus apice albis; crista in capite elevata plumosa; rostro, pedibus, & unguibus griseo fuscis. Habitat in Carolina & Canada. Foemina huius, coloribus non ita splendentibus, discrepat. Aliae nonnullae Avium species, sub Garruli nomine ab Auctoribus indicatae, ad Galguli, & Turdi genera videantur.*

T. CLXV. B. -- II. --

PICCHIO verde, volgarmente detto Picchio Gallinaccio. *Picus viridis* Gesn. Ionst. Willugh. Rai. Sibb. Swenck. Kl. Frisch. & Briss. sp. 1. — *Picus viridis; Picus arborarius, vel arborum cavator.* — *Picus Martius maior* Bellonio, Gesn. — *Pluviae Avis veteribus* Rai. — *Picus arborarius* Plinio. — *Picus Martius* Festo Rzac. — *Galgulus* Ionst. — *Picus* [*viridis*] *vertice coccineo* Linn. Syst. Nat. sp. 7. — Gall. *Le Pic verd.* — Angl. *Green--Wood-Spite; Green--Wood--Pecker; Rain-Fowl.; Heyhoe.*

I Veri *Picchi*, e specialmente Marzuoli, hanno il becco dritto, robusto, angolare, acuto, e molto a proposito per forare gli alberi; la loro lingua lunghissima, e tonda, che termina in una spina ossea acuta, e rigida, da ambe le parti dentellata, è adattata a investire e prendere molte specie di vermi, e d' insetti, poichè a piacimento vien questa messa molto in fuori dal palato, e profondamente insinuata ne' buchi, e nelle spaccature degli alberi, dove

PIci *proprie dicti, ac praesertim Martii, rostrum habent rectum, robustum, angulosum, acutum ad perforandas arbores admodum adcomodatum; linguam longissimam teretem, in spinam osseam, acutam, rigidam, utrinque dentatam desinentem, ad vermiculos aliaque insecta lancinanda: eam autem pro libito exserere, inque rimas & foramina arborum profunde immittere possunt ad insecta ibidem latitantia transfigen-*

ve ſimili inſetti dimorano; hanno inoltre i piedi corredati di quattro diti, due d' avanti, e due di dietro, la qual conformazione di diti è molto atta a ſalire ſu gli alberi; e queſti diti ſono anco molto accoſti per poter più fortemente nel ſalire che fanno attenerſi. La coda loro è teſa, e dura, ſebbene voltata alquanto a baſſo, con le penne in cima rigide e nude, mediante le quali pure nel ſalire ſi aiutano, e ſi reggono. Si cibano d' inſetti.

Nidificano ne' buchi degli alberi, e le uova di tutte le ſpecie di *Picchi* ſono bianche, e di guſcio tanto ſottile, e diafano, che facilmente vi ſi vede dentro il torlo, e ne ſogliono partorire cinque in Aprile, e cinque altre dopo d' aver rilevati i figli nati dalle prime.

La ſpecie per altro rappreſentata in queſta Tavola non cova che una ſol volta, e partoriſce ſei, ſette, e otto uova ancora. Da ſe medeſimi fanno queſti un buco negli alberi volendo trovarſi il nido, e lo fanno sì eſattamente tondo, che appena così tondo potrebbe farlo un Geometra con le ſeſte. Scaligero, e Alberto Magno dicono, che i *Picchi* imparino a parlare, ma le oſſervazioni di altri ſono a queſto piuttoſto contrarie.

Il *Picchio* verde da noi indicato non ſolo ſi ciba di Formiche, e delle uova loro, ma volentieri divora i bruci, e le ruche degli alberi, e più d' ogni altra ſpecie di *Picchio* ſtà anco in piana terra, dove pure va cercando i ſuddetti animaletti.

Il Bellonio fa menzione d' un *Picchio* verde, detto da eſſo *maggiore*, o *maſſimo*, che pretende eſſere il terzo nominato da Ariſtotele. Ei lo deſcrive per molto maggiore del *Picchio* verde comune ſoprammentovato, e lo fa contro il ſolito degli altri *Picchi* di becco curvo, la qual varietà quando ſi dia, non ſerve certamente a ſtabilire una ſpecie diſtinta, ma è probabilmente una mera e accidental differenza del medeſimo ſopra deſcritto, o comune verde.

figenda & extrahenda; digitos in pedibus binos ante, & totidem retro habent, quae conformatio arborum ſcanſioni admodum eſt idonea: ſunt vero digiti valde approximati, ut arborem quam ſcandunt firmius apprehendant. Caudam habent rigidam & duriuſculam, deorſum paullulum inflexam, & caudae pennas in extremitatibus ſuis ferme nudas, quibus inter ſcandendum innituntur, & ſe ſuſtentant. Inſectis veſcuntur.

In cavis arborum nidulantur, & ova alba pariunt omnes, cortice tenuiſſimo, & adeo diaphana, ut intro vitellus facile diſtinguatur; Ova quinque ut plurimum Aprili menſe, totidemque alia cum primi pulli educati fuerint, deponere ſolent.

Species vero ſub hac Tabula deſignata ova ponit & pullos educat una vice ſex, ſeptem, & octo etiam quandoque. Locum in quo nidulaturi ſunt in arboribus ipſi excavant, foramine adeo affabre facto, ut vel admoto circino rotundius reddi ab experientiſſimo Geometra vix poſſet. Picos *humano ſermoni aſſueſcere Scaliger & Albertus tradunt, quod aliorum obſervationibus minime reſpondet.*

Picus *hic noſter viridis non tantum Formicis, earumque ovis veſcitur, ſed Erucas etiam & Coſſos devorat, terraeque ſaepius inſidet, quam alii* Pici, *& in ea etiam memorata animalcula quaerit.*

Bellonius Picum *habet viridem* maiorem *ſeu* maximum, *quem pro tertio Ariſtotelis obtrudit.* Pico *viridi vulgari ſupra deſcripto longe maiorem facit, ac roſtrum ei tribuit incurvum, praeter normam aliorum huius generis; quae Avis differentia licet aliquando obſervata ſit, ad veram tamen ac peculiarem conſtituendam ſpeciem aegre admodum meo iudicio ſufficere poteſt; non alia certe erit Avis, quam fortuita & minime conſtans* Pici *viridis communis ſupra deſcripti varietas.*

T. CLXVI. B. - 7. 2.

PICCHIO vario, altrimenti detto Picchio ſarto mezzano, e anco in diverſi luoghi d' Italia Pigozzo, Pipo, e Culroſſo. — *Picus varius medius.* — *An Picus varius maior* Willugh. & Charlet. — *Picus varius ex albo & nigro* Geſn. — *Picus varius* Briſs. ſp. 14. *Picus [maior] albo, nigroque varius, ano verticeque rubris* Linn. Syſt. Nat. ſp. 10. — Gall. *Le Pio varié, Pic rouge; Epeiſche; Cul rouge.* — Angl. *French-Pie.*

DI groſſezza è maggiore, o non inferiore di una *Merla*; il maſchio porta ſul capo, come ſi vede nel noſtro, un tratto di color roſſo allegro, e bello, poſto a traverſo tra bianco e bianco in tutte due le guance. Nella femmina tanto la gola, che il petto è di co-

MErulae *par eſt vel maior; mari infra verticem ductus, ut in noſtro, obſervatur miniaceus pulcherrimus tranſverſus, qui ab albo ad album in utraque maxilla producitur. Foeminae gula & pectus ex albo ſordide flavent. Venter in-*

lore giallo ſudicio. Il baſſo ventre preſſo la coda è di color cremiſi aſsai bello, dimanierachè è ſtato perciò anco nominato *Culoroſſo*. Le dita d' avanti ſono inſieme attaccate fino a tutto il primo internodio; il quarto dito poi è lunghiſſimo, e cortiſſimo il primo. Queſta ſpecie è propria d' Europa.

inferior ſub cauda colore phoeniceo ſeu miniaceo pulcherrimo tingitur; hinc Avis Podex flammeus *dicta fuit. Digiti antici ad primum uſque articulum connectuntur; digitus quartus longiſſimus, primus breviſſimus. Species haec Europaea eſt.*

T. CLXVII. B. – 7. 2.

PICCHIO vario maggiore, volgarmente Picchio ſarto maggiore (maſchio) — *Picus varius maior* Rai. — *Picus niger, occipite, & uropygio coccineis* Barr. Ornith. — *Picus diſcolor* Friſch. — *Picus varius maior* Briſs. ſp. 13. — Gall. *Le grand Pic varié; Grand Grimpereau, ou Piverd bigarré.* — Angl. *Great Spotted Wood-Pecker; Greater Spotted Wood-Pecker; Witwal.*

LA femmina ſi diſtingue dal maſchio per non aver ella ſul capo macchia alcuna di color roſso. Egualmente che l' antecedente ſi ciba d' inſetti, e pone il ſuo nido ne' fori degli alberi ſenza porvi coſa alcuna, che ſerva di letto, e ſoſtegno delle uova.

FOemina a mare diſcrepat in eo quod in occipitio nil rubri habeat. Inſectis ut ſuperior victitat, & in arborum foraminibus nidificat, nihilque in nido pro ovorum fulcro ſubſternit.

T. CLXVIII. B. – 7. 1. ½

PICCHIO vario maggiore con le penne del petto mutate, o ſia inferiormente giallo. — *Picus varius maior, pennis in pectore mutatis, ſcilicet inferne luteus.*

IL *Picchio* è un Uccello, che ha uſo in medicina, ſpecialmente appreſso il popolo ignorante. Alcuni applicano la polvere di eſſo, ſeccandolo in forno, con l' aggiunta del ſale ſulle moroidi. Viene ſtimato poi valevole a diſincantare gli affaſcinati, mangiato arroſtito, o leſsato, e ad accreſcer la viſta portato addoſso; e parimente a togliere il dolore de' denti, della gola, e della natura muliebre, portato che ſia il ſuo becco legato al collo; ma ſono queſte viſioni di vecchierelle. E' ſtato parimente detto, che portandolo addoſso ſi può ſciamare e cavare il miele dagli Alveari ſenza eſser danneggiati dalle Api: che non ſi poſsa fiſsare un chiodo, o una bietta in quell' albero dove il *Picchio* ha il nido, e che avendo qualcuno turato l' apertura del ſuo nido con un ſaſso, o con del legno, egli accorrendovi, con l' applicazione di un' erba, che ſi pretende ſia la Linaria maggiore, o l' Etiopide, immediatamente lo riapra: le quali coſe ſono egualmente favoloſe.

PIcorum *uſus in medicina frequens eſt, apud vulgus praecipue. Cum ſale Avem hanc torrefactam quidam ad hemorrhoidas applicant. Aſſatam autem vel elixam incantatione ligatos ſolvere; oculis geſtantibus viſum acuere, roſtrum e collo ſuſpenſum dentium, vulvae, & tonſillarum dolorem curare fertur, ſed anicularum ſunt deliramenta. Eamdem ferentes ab Apibus, etiamſi favos & mella earum eximant, non feriri: clavum & cuneum arbori in qua nidificant infixum diu non haerere. Foramen vero nidi lapide vel ligno obſtructum, herba appoſita, ſeu Linaria maior, ſeu Aethiopis illa ſit, eamdem aperire pari fide affirmatur.*

T. CLXIX. B. – 9. 2.

PICCHIO vario maſſimo, volgarmente Picchio ſarto maſſimo. — *Picus varius maximus.*

SChiamazzando il *Picchio* più del ſolito fu creduto anticamente, che predicesse pioggia, e perciò fu anco nominato Uccello della pioggia. Tra gl' inſetti, e i vermi, de' quali il *Picchio* ſi nutriſce, ſono da eſso molto ricercate le Ruche, che ſogliono ſtare ſotto la ſcorza degli alberi. Mediante il fortiſſimo rumore che egli fa col becco le ſpaventa, e le met-

VAlidius quam ſoleret ſtridens pluviam praeſagire, antiquitus tamen, credebatur, hinc ei Pluviae Avis *apud veteres nomen. Inter inſecta & vermes, quibus maxime* Pici *delectantur, ſunt Coſſi, qui ſub lignorum corticibus degunt. Roſtri*

mette in qualche moto ; e lo ſteſso produce a riguardo d' ogni altro inſetto, ſicchè appoggiatovi ſopra il becco, e applicatovi anco l' udito ſi accorge ſe vi ſieno, e conoſciuto di sì, col becco, che attiviſſimo è per ſegare e trivellare le trova, e introdottavi la lingua, che è lunghiſſima e con una punta acuta, oſsea, e dentata, le inveſte, e le tira fuori. Queſta lingua viene eſattamente deſcritta negli Atti dell' Accademia Reale di Parigi per l' anno 1709. e nelle Tranſazioni d' Inghilterra ancora. Tutta l' Anatomia poi di queſto Uccello ſi può vedere appreſso l' Aldrovando.

ſtri ſono terrefaciente ipſos, quod & aliis inſectis accidit, in motum agit, ipſoſque admoto roſtro, & auditu percipit, indeque roſtro ſecante, & terebrante ipſos detegit, praecipueque ipſos lingua praelonga, & in exitu aculeo oſſeo dentato munita invadit ac depromit. Picorum *lingua in Actis Academiae Regiae Scientiarum Pariſienſis anni 1709. necnon in Tranſactionibus Anglicanis deſcribitur. Eiuſdem pariter linguae ſtructuram, necnon univerſam* Pici *Anatomen Aldrovandus exhibet in ſua Ornithologia.*

T. CLXX. B. -- 4. 2. -- 4. 1.

Fig. 1. PICCHIO vario minore, volgarmente Picchio ſarto minore [maſchio.] — *Picus varius minor [mas.]*

APpena è del peſo d' un' oncia. La femmina in queſta ſpecie ſi diſtingue dal maſchio per aver eſsa ſul capo una macchia bianca, dove egli l' ha roſsa. L' Aldrovando aveva detto, che queſta ſpecie tanto nel capo, che ſotto la coda non era macchiata di roſſo, ma queſto non ſi verifica, come abbiamo avvertito, che nella femmina. Trovaſi in Toſcana, e in tutto l' anno facilmente, nè mai ſi parte da quei luoghi, ne' quali abita, come ſono le noſtre montagne di Piſtoia.

POndere vix unciali eſt. Huius ſpeciei foemina a mare differt, quod vice maculae rubrae in capite, macula alia alba inſtruatur. Aldrovandus huic ſpeciei maculas illas rubras in vertice & uropygio deeſſe ſcribit, quod de foemina tantum ut diximus verum eſt. In Etruria habitat, totoque anno obvius eſt, nec a montibus noſtris Piſtorienſibus, in quibus praecipue degit, ut obſervare licuit, unquam diſcedit.

Fig. 2. PICCHIO vario, o ſarto minore bianco; mera varietà, o ſcherzo di natura, della ſpecie antecedente, femmina. — *Picus varius minor albus; ſpeeiei ſuperioris ſimplex varietas, atque naturae luſus; foemina forte?*

TUtte le ſopra accennate ſpecie di *Picchi* ritrovanſi in quaſi tutte le diverſe regioni d' Europa, e particolarmente in Italia, ſebbene Plinio abbia ſcritto, che non ſi trovano *Picchi* nel territorio di Taranto, lo che fa ſpecie. Ritrovanſi egualmente in queſta parte di mondo ne' Regni anco più freddi, come la Svezia: tutta volta ſono rari ne' Paeſi baſſi, e particolarmente in Olanda.

SUperiores omnes Picorum *ſpecies in quibuſvis fere Europae Regionibus reperiuntur, praeſertim in tota Italia, quamvis Plinius ſcribat in Tarentino agro negari* Picos, *quod mirum videtur. Reperiuntur etiam in frigidiſſimis eiuſdem Europae Regnis, ut Svecia eſt: rari tamen in Belgio ſunt, & privatim in Hollandia.*

T. CLXXI. B. -- 8. --

PICCHIO vario Indiano. — *Picus varius Indicus.*

SAlgono i *Picchi* per gli alberi come le Tarantole, o ſecondo l'interpetrazione di Plinio, come i Gatti, non ſolamente arrampicandoſi per l' insù, ma per l' indietro ancora degli alberi, e per la parte di ſotto de' rami, con i piedi e il corpo voltato in alto, e il dorſo verſo la terra, come in queſta medeſima Tavola ſta eſpreſso.

SCandunt Pici *per arbores tanquam Stelliones, ſeu, ut Plinius vertit, Feles, non modo ſurſum per arbores reptando, ſed deorſum etiam, & ſub ipſis ramis, pedibus & ventre ſurſum, tergore deorſum terram verſus converſo, ut ab ipſa hac Tabula oſtenditur.*

T. CLXXII. B. -- 15. --

PICCHIO nero, altrimenti detto Picchio Corvo. — *Picus niger* Frisch. & Briss. sp. *6.* — *Picus niger maximus* Willugh. & Rai. — *Picus maximus* Aldrov. & Ionst. — *Picus niger maximus nostras* Klein. — *Picus niger, seu Formicarius* Schw. — *Tertia species Dryocolaptae Aristotelis* Gesn. — *Pyrrhocorax Agricolae* Schw. & Kl. — *Picus [Martius] niger pileo coccineo* Linn. Syst. Nat. sp. 1. — Gall. *Grimpereau noir.* — Angl. *Great Black Wood-Pecker.*

IL maschio di questa specie secondo l' età, per quanto dice il Klein, è nel capo più o meno rosso, e la femmina è tutta nera; dal Brisson poi si vuole, che il maschio sia nero con tutto il di sopra del capo rosso, e le penne della coda nere, e la femmina non nera, ma bruna, e rossa soltanto nel didietro del capo, con le penne della coda parimente brune.

Questa specie pure di *Picchio* è d' Europa, e particolarmente trovasi in Svezia, in tutta la Germania, e negli Svizzeri, e molto ama di stare sugli alberi morti, che egli apre e spacca in traccia dei formicolai, de' quali formicolai simili legnami ne soglion sempre abbondare.

HUius speciei mas dicitur a Kleinio plus minus pro aetate occipite rubro, foemina tota nigra; A Brissonio vero mas dicitur niger, capite superiore & occipitio rubris, rectricibus nigris; foemina autem nigricans, occipitio rubro, rectricibus nigricantibus.

Haec pariter Pici *species Europaea est, ac praesertim in Svecia, Germania tota, & Helvetia habitat, atque arbores antiquas avide frequentat, quas conscindit, ut Formicarum acervos detegere possit, quibus huiusmodi emortuae arbores scatere solent.*

In Gallia, & Anglia quantum scimus non invenitur, quem vero Willughbeius descripsit, Ratisbonae, in suo per Germaniam & Italiam instituto itinere, observavit, eumdemque in foro emit a quodam Aucupe occisum.

In Francia, e nell' Inghilterra, per quanto ci è noto, non annida, e quello che fu descritto di questa specie dal Willughby, l' aveva osservato a Ratisbona nel suo viaggio, che fece per la Germania, e per l' Italia, e l' aveva comprato in quel mercato da un Cacciatore, che l' aveva ammazzato.

T. CLXXIII. B. -- 6. 1.

PICCHIO d' alto volo di Guinea. — *Picus altivolans ex Guinea.*

DI quest' Uccello nella Raccolta Gerini, prescindendo dalla figura, e dal nome, non altra notizia vi era. Parimente molti di quelli, che nelle seguenti Tavole si vedranno, non saranno accompagnati da istoria veruna, perchè tolte alcune esterne differenze, che a sufficienza dalla stessa figura sono dimostrate, non altro hanno, che si sappia di particolare, e che meriti ne sia fatta menzione.

HUius Avis praeter imaginem & nomen, non aliam in Geriniana Ornithologia invenimus notitiam; Plurimae pariter ex iis, quae sequuntur, nullam habebunt adiunctam historiam, quum praeter externam partium differentiam ab ipsa imagine quam satis ostensam, non aliam peculiarem, & ab aliis discrepantem, atque commentatione dignam, nobisque cognitam obtineant naturam.

T. CLXXIV. B. -- 10. --

PICCHIO nero col ciuffo di Caienna. — *Picus niger Cayanensis cristatus* Briss. sp. 12.

ANticamente, per quanto si legge, la carne de' *Picchi* non si mangiava: sebbene per quanto venghiamo accertati da de' Cacciatori, non sia dispiacevole. A Bologna, almeno al tempo dell' Aldrovando, che di questa cosa lasciò notizia nelle sue opere, vendevansi i *Picchi* al mercato per tutto l' Autunno, e in Inverno, nelle quali stagioni titrovansi grassi, e da molti per quanto egli dice, erano comprati, e mangiati.

PIcos *antiquitus in cibum venisse nunquam legimus: caro tamen eorum, ut ex Aucupibus intelleximus, haud ingrata habetur. Bononiae, Aldrovandi saltem aetate, qui notitiam hanc scriptis suis inseruit, tota fere Hyeme & Autumno in foro vendebantur, quo scilicet tempore pinguiores sunt, & a multis ad mensam expetebantur.*

† T CLXXV B. -- 9. 1.

PICCHIO del Capo di Buona Speranza. — *Picus Capitis Bonae Spei* Briſs. ſp. 30. — Gall. *Le Pic du Cap de Bonne Eſpérance.*

† T CLXXVI B. -- 8. --

PICCHIO col capo e collo roſſo di Virginia. — *Picus capite, colloque rubris, Virginianus.* — *Picus capite colloque rubris* Kl. — *Picus capite toto rubro* Catesb. — *Picus Virginianus erythrocephalos* Briſs. ſp. 19. — *Picus* [*erythrocephalus*] *capite toto rubro, alis, caudaque nigris, abdomine albo* Linn. Syſt. Nat. ſp. 13. — Gall. *Le Pic a tête rouge de Virginie; Piverd a tête rouge.* — Angl. *Red-Headed Wood-Pecker.*

FAcilmente trovaſi intorno i luoghi abitati, e ſi ciba anco di biade, e di frutti. E' comune nella Carolina, nella Virginia, e nel Canadà.

* *PAgos libenter frequentat, & fructibus, graniſque delectatur. Valde familiaris in Carolina, Virginia, & Canada.*

T. CLXXVII. B. -- 10. 1. ½

PICCHIO verde col capo grigio di Norvegia. — *Picus viridis capite cinereo Norvegicus.* — *Picus capite griſeo* Edw. — *Picus viridis ſupra uropygium luteſcens, ad radicem roſtri, & ab inferiori mandibula ad latera capitis nigra linea curva, remigibus alarum nigro-fuſcis, albis punctis tranſverſalibus, tectricibus flavicantibus* Kl. — *Picus viridis Norvegicus* Briſs ſp. 4. — Gall. *Le Pic verd de Norvege.*

T. CLXXVIII. B. -- 10. 1.

PICCHIO maggiore variegato del Meſſico. — *Picus varius Mexicanus maior* Briſ. ſp. 21. — *Pica Mexicana* Seb. — *Pica Mexicana alia* Kl. — *Iaculator cinereus* Kl. — *Cornix* Moeh. — Gall. *Le grand Pic varie du Mexique.*

T. CLXXIX. B. -- 10. --

PICCHIO brizzolato di Bengala — *Picus Bengalenſis maculatus.* — *Picus varius Bengalenſis* Kl. — *Picus Bengalenſis* Alb. & Edw. — *Picus viridis Bengalenſis* Briſs. ſp. 2. — *Picus* [*Bengalenſis*] *viridis, occipite rubro, nuca nigra, ſubtus anticeque albus, nigro maculatus* Linn. Syſt. Nat. ſp. 8. — Gall. *Le Pic verd de Bengale; Grimpereau de Bengale.* — Angl. *The Bengal Woodpecker; Spotted Indian Wood-Pecker.*

T. CLXXX. B. -- 8. 1. ½

PICCHIO con i piedi a tre dita — *Picus tridactylus, albo, nigroque varius* Linn. Syſt. Nat. ſp. 13. — *Picus tridactylus* Edw. — *Picus tridactylos anomalus* Mus Petrop.

DI queſta ſpecie, e ſtruttura uno ſe ne trova in Europa, uno in America. L' Europeo è naturale della Svezia, e vive nelle Alpi della Lapponia, e della Daleckarlia, e trovaſi ancora nella Siberia, e ſi diſtingue per aver la ſommità del capo gialla. L' Americano poi in tal poſto è colorito di roſſo, e trovaſi nella Baia d' Udſon, e nell' Iſola di Caienna. Nell' Americano vi è pure della differenza tra il maſchio, e la femmina, mancando queſta del ſopraddetto colorito roſſo nel capo, e non eſsendo punto macchiata di bianco tanto nel dorſo, che nel codrione come il maſchio; per la qual coſa quello che da noi è ſtato rappreſentato è ſicuramente d' America, ed è il maſchio. Una minuta deſcrizione di quello d' Europa l' ha data il Sig. Linneo, ed è inſerita negli Atti dell' Accademia di Stockolm.

* *HUius ſpeciei, ſive ſtructurae Avis invenitur Europaeus & Americanus. Europaeus habitat in Svecia ad Alpes Lapponicas & Dalekarlicas, nec non in Siberia, ac vertice flavo diſtinguitur. Americanus vero vertice eſt rubro, atque frequens eſt ad Sinum Freti Hudſonis, nec non in Cayana. Foemina pariter Americana a mare diſcrepat capitis vertice nequaquam rubro, & dorſo uropygioque maculis albis deſtitutis; quapropter mas eſt, & Americanus, qui a nobis oſtenditur. Accuratam Europaei deſcriptionem dedit Linnaeus in Actis Academiae Stockolmenſis inſertam.*

T. CLXXXI. B. – 8. –

PICCHIO Indiano in gran parte celeſte, ſpecie forſe di Barbuto? — *Picus Indicus totus ferme caeruleus; an Bucconis ſpecies?*

IL genere di Barbuto fu ſtabilito dal Sig. Briſſon, e comprende ſotto di ſe quelle ſpecie d' Uccelli totalmente ſimili a' *Picchi*, fuorchè nel becco, il quale in eſſi è alquanto torto all' ingiù, ſuperiormente conveſſo, e compreſſo ne' lati, con delle penne a forma di peli preſſo l' angolo della mandibula rigidi, e voltati in avanti.

BUcconis *genus a Briſſonio ſtatutum, illas comprehendit Aves, quae per omnia* Picos *aemulantur, excepto roſtro modice deorſum inflexo, ſuperne convexo, lateraliter compreſſo, eiuſdemque roſtri baſi pennis rigidis piliformibus antrorſum verſis obſita.*

† T. CLXXXII. B. 6. 1. ½

BARBUTO, o Boccalone. *Barbutus, vel Bucco.* — *Bucco* Briſs. Tom. IV. ſp. 1. — Gall. *Le Barbú.*

BOccalone è ſtato detto dalla grandezza della bocca, e groſſezza del capo: *Barbuto* poi dalle piume ſottili, e rigide come ſetole, o peli, che ha intorno all' angolo dell' iſteſſa bocca. Per la ſtruttura de' piedi ſi aſſomiglia molto al *Cucule*, ma poi non poco da eſſo differiſce per queſt' accennata ſua grandezza di capo, e per avere alla baſe del becco queſte piume a foggia di pelo, che totalmente mancano nel *Cucule*. Tutte quaſi le ſpecie di queſto genere hanno la coda di dieci penne.

BUcco *a Briſſonio dictus fuit, a buccarum, ſive genarum, & capitis craſſitie:* Barbutus *autem a plumis filiformibus rigidis, quibus ad roſtri baſim & prope mandibularum angulum barbam quaſi mentientibus inſtruitur, dictus quoque eſt. Structura pedum cum* Cuculo *admodum convenit, ab eo tamen differt, & capitis indicata craſſitie, nec non baſi roſtri pennis illis filiformibus obſita, quibus* Cuculus *deſtituitur. Huius generis ſpecierum fere omnium cauda decem tantum rectricibus conflatur.*

T. CLXXXIII. B. – 6. 1. – 6. –

Fig. 1. BARBUTO di Caienna. — *Barbutus Cayanenſis.* — *Bucco Cayanenſis* Briſs. Tom. IV. ſp. 2. — Gall. *Le Barbú de Cayienne.*

Fig. 2. BARBUTO di Caienna brizzolato. — *Barbutus Cayanenſis naevius.* — *Buccus Cayanenſis naevius* Briſs. Tom. 4. ſp. 3.

SOno quaſi della groſſezza di un' *Allodola*. Trovanſi nell' Iſola di Caienna, d' onde il Sig. d' Eſſars gli mandò al Sig. de Reaumur per il ſuo Muſeo, e furono deſcritti, e anco illuſtrati con figure aſſai buone dal Sig. Briſſon. Siccome poi queſti Uccelli ſono ſtati ſcoperti di corto, niente poſſiamo dire de' loro inſtinti, vitto, e qualità.

CRaſſitie Alaudam *criſtatam circiter aemulantur. Habitat in Cayana, unde in Muſeum Realmurianum miſſi fuerunt a Dom. Eſſars, & a Dom. Briſſonio deſcripti, atque figuris perquam optimis demonſtrati. Cum autem huius generis Aves nuperrime detectae atque obſervatae ſint, nullam earum inſtinctus, victus, & qualitatum notitiam recenſere poſſumus.*

4. BARBUTO dell' Iſole Filippine. = *Barbutus Philippenſis.* = *Bucco Philippenſis* Briſs. T. IV. ſp. 4. cum accurata icone. = *Paſſerem domeſticam craſſitie non multum ſuperat; ſuperne obſcure eſt viridis, interne ſordide flavicans, maculis longitudinalibus obſcure viridibus varius; ſincipite & taenia tranſverſa in ſummo pectore rubris, genis, gutture & collo inferiore luteis; rectricibus ſuperne obſcure viridibus, ſubtus cinereo-caeruleis; roſtro, unguibuſque fuſcis, pedibus flavicantibus. Foemina nonnihil mari craſſitie cedit, atque ab illo diſcrepat capite & pectore rubro deſtitutis; genis, gutture, & collo inferiore albo-flavicantibus.*

5. BARBUTO di Maynas = *Barbutus Maynanenſis.* = *Bucco Maynanenſis* Briſs. ſp. 5. cum optima icone. *Praecedentem craſſitie circiter aequat. Superne viridis eſt, inferne albo flavicans, maculis longitudinalibus viridilus varius, vertice & gutture rubris, taeniis dilute caeruleis circumdatis; collo inferiore & pectore luteis; macula in imo pectore rubra; rectricibus viridibus; roſtro cinereo, mandibularum tamen marginibus & apice albo-flavicantibus; pedibus unguibuſque cinereis.*

T. CLXXXIV. B. 7. 1. ½

GALBULA detta da' Braſiliani Iacamaciri. — *Galbula, Braſilienſibus Iacamaciri.* — *Galbula* Moehr. & Briſs. ſp. 1. — *Iacamaciri* Piſon. — *Iacamaciri Braſilienſibus* Marcgr. — *Picus Braſilienſis, Iacamaciri* Marcgr. Willugh. & Klein. — Gall. *Le Iacamar*.

E' groſſo quanto un' *Allodola*. Alcune ſpecie di queſto genere hanno la coda formata da dieci penne, altre da dodici. La ſpecie da queſta noſtra Tavola dimoſtrata trovaſi al Braſile, e nell' Iſola di Caienna.

A Laudam *craſſitie circiter aequat. Nonnullae huius generis ſpecies decem tantum rectricibus, aliae duodecim praeditae ſunt. Quae hic depingitur, in Braſilia, & Cayana habitat.*

T. CLXXXV. B. -- 12. --

GALBULA di coda lunga del Surinam. *Galbula longicauda Surinamenſis.* — *Galbula longicauda* Briſs. ſp. 2. *Iſpida Surinamenſis cauda longiſſima duabus pennis excurrentibus furcata* Klein. — *Iſpida Surinamenſis binis plumis in cauda longiſſimis* Edw. — Gall. *Le Martin-Pêcheur a queüe d' Hirondelle: Le Iacamar.* — Angl. *The Swallow-tail' d Kingfiſher*.

TUtte le penne della coda in queſt' Uccello ſono di lunghezza ineguale. Per la diſpoſizione unicamente delle dita, poſte due d' avanti, e due di dietro, differiſce da altri, che per il reſto delle parti ſi potrebbero dire molto conſimili, e tali ſono fra gli altri le ſpecie d' Uccello *Santa Maria*, o *Alcione*.

OMnes caudae pennae in hac Ave inaequalem obtinent longitudinem. Digitorum tantum diſpoſitione, duobus ſcilicet anticis, totidem poſticis a pluribus aliis Avibus, quoad alias partes non multum diffórmibus, differt, ut inter alias Iſpidae *ſpecies ſunt, ſive* Alcyones.

T. CXXXVI. B. -- 6. --

TORCICOLLO, altrove Collotorto, Tortocollo, Stortocollo, Capotorto, e Verticella. — *Torquilla* Geſn. Schwenck, Friſch. & Briſs. — *Iynx, Torquilla, Turbo Hermolai; Verticella; Verticolla* Scaligeri. *Collitorques* Chrlet. Rai. Geſn. & Aldrov. — *Picus Torquilla* Klein — *Iynx Torquilla* Linn. Syſt. Nat. *ſive Cuculus ſubgriſeus maculatus, rectricibus nigris faſciis undulatis* eiuſd. Fn. Svec. — Gall. *Le Torcol; Turcot; Tercot; Torcon*. — Angl. *The Wryneck; Emmet-Hunter*.

UGuaglia in groſſezza l' *Allodola* comune, o poco di eſſa è minore. La ſua lingua è lunghiſſima e tonda a forma di quella del Lombrico, che termina in una ſpecie di ſpina, o punta di conſiſtenza oſſea, la quale mette molto in fuori, e ritira a forma de' *Picchi*. Alza pure le penne della teſta come la *Ghiandaia*. Torce il capo curioſamente fin dietro le ſpalle, e da queſto è ſtata detta *Torcicollo*. Si ciba di Formiche, le quali prende colla lingua, inveſtendole cioè con la punta di eſſa. La femmina è di color cenerino, o di color più chiaro del maſchio. L' Aldrovando oſſervò che il maſchio diſtinguevaſi da una macchia nera, e lunghetta poſta dietro l' occhio.

Pone il nido ne' fori degli alberi, e al più vi partoriſce cinque uova, le quali per oſſervazione del Ginanni ſono di guſcio bianco, ſottiliſſimo, e diafano. Difficilmente ſi rileva. Si mangia, ma non è di carne troppo buona. Trovaſi in qualunque regione, e nella Primavera canta.

A Laudae vulgari *par eſt, aut tantillum minor. Lingua huius admodum longa, & Lumbriciformis eſt, ſive rotunda, in ſpinulam oſſeam deſinens, quam in longum exerere iterumque* Picorum *more retrahere poteſt. Plumas capitis criſtae fere in modum interdum erigit, ut* Pica glandaria. *Caput ridicule contorquet & ad humeros circumagit, unde* Torquilla *dicta eſt. Formicis veſcitur, quas exerta lingua velociſſime transfigit, aculeo nimirum linguae. Foemina mare pallidior eſt, magiſque cinerea. Aldrovandus retro oculos maculam atram oblongiuſculam in mare obſervavit.*

Nidulatur in foraminibus arborum, & ova quinque ad ſummum uno partu obſervatione Ginannii excludit, quae candida, & tenuiſſimo pellucidoque cortice ſunt. Aegerrime cicuratur. Ipſius uſus in cibis eſt, licet carne minus bona. In quavis quaſi regione conſpicitur, & Vere canora eſt.

† T. CLXXXVII.

CURUCU del Brasile. — *Togon Brasilienſis viridis* Briſs. ſp. 4. — *Trogon* Moehr. — *Avis anonyma tertia* Marcgr.? [*foemina forte*] & Ionſt. — *Picis congener* Aldrov. — *Picis congener, Curucui Braſilienſibus dictus* Marcgr. Willugh. — *Pſittacus flammeus viridis & cinereus roſtro ſerrato* Fevill. — *Tzintzian* [*Mexicanis*] Rai. — Gall. *Le Couroucou verd du Brêſil.*

SI accoſta molto per la grandezza, e groſſezza ad una *Gazzera*. La coda di queſto è lunga cinque pollici e mezzo. Le ſpecie di queſto genere trovanſi in paeſi caldi preſſo il mare Auſtrale, vivono di frutti, e campano anco in gabbia.

MAgnitudine & craſſitie ad Picam *accedit. Caudam habet quinque pollices cum ſemiſſe longam. Huius generis Aves in calidis regionibus vivunt iuxta Oceanum Auſtralem; fructibus veſcuntur, & aluntur etiam in caveis.*

† T. CLXXXVIII. B. -- 11. --

CURUCU cenerino di Caienna. — *Trogon Cayanenſis cinereus* Briſs. ſp. 1. — Gall. *Le Courocou cendré de Cayenne.*

SUpera di poco in groſſezza la *Merla*. Non abbiamo di queſti Uccelli altre notizie per eſſere ſtati ſcoperti e oſſervati ne' Muſei d' Europa aſſai di corto.

MErulam *craſſitie paullulum antecellit. Notitias alias harum Avium non habemus, cum recenter detectae, & in Muſea Europaea miſſae ſint.*

T. CLXXXIX. B. -- 10. 1. ½

CURUCU di Caienna verde. — *Trogon Cayanenſis viridis* Briſs. T. IV. pag. 168. ſp. 2. T. XVII. fig. 1. — Gall. *Le Courocou verd de Cayenne.*

4. CURUCU di Caienna verde nel dorſo e nelle altre parti ſuperiori, e bianco nella pancia. = *Trogon Cayanenſis viridis, ventre candido* Briſs. ſp. 3. = *Praecedenti paullulum craſſitie & longitudine cedit. Superne viridi-aureus, inferne albus, capite ſuperiore & collo caeruleo-violaceis, viridi-aureo colore variantibus, genis & gutture nigris; taenia tranſverſa in pectore viridi-aurea; rectricibus nigris, binis intermediis viridi-aureo mixtis, duabus utrinque ſequentibus exterius viridi-aureis, tribus utrinque extimis apice oblique albis; roſtro cinereo-albo; pedibus ad exortum uſque digitorum plumulis nigricantibus veſtitis; digitis cinereo-albis, unguibus cinereo-fuſcis. In Cayana habitat.*
5. CURUCU del Meſſico = *Trogon Mexicanus* Briſs. ſp. 5. = *Tzanatltototl, ſeu Avis ſimilis, aut congener Tzanatal* Fernand. Hiſt. Nat. nov. Hiſp. = *Cum Sturno noſtrate craſſitie convenit; ſuperne albo, nigro, & fulvo variegatus, inferne rubeſcens; capite nigro; rectricibus nigris, tribus utrinque extimis apice albis; roſtro pedibuſque cinereis.*
6. CURUCU del Meſſico variegato, = *Trogon Mexicanus variegatus* Briſs. ſp. 6. = *Quaxoxoctotol* [*Mexicanis*] Fernand. & Rai. = *Columbam craſſitie circiter aequat; cyaneo, luteo, viridi, & nigro variegatus; vertice cyaneo; roſtro nigro.*

T. CXC. B. -- 12. 1.

CROTOFAGO. — *Crotophagus* Briſs. T. IV. pag. 177. ſp. 1. — *Crotophagus nigro-violaceis* eiuſd. — *Crotophagus ater, roſtro breviori compreſſo, ſuperne arcuato cultrato* Brow. — *Monedula tota nigra* Catesb. — *Monedula tota nigra maior, garrula, mandibula ſuperiore arcuata* Sloan. — *Cornix garrula maior* Klein. — *Pica nigra Iamaicenſis, plumis interſperſis purpureis, e viridi reſplendentibus, roſtro novaculae formi* Klein. — *Pſittaco congener, Ani Braſilienſium* Marcgr. Willugh. & Rai. — *Ani Braſilienſibus* Marcg. — *Cacalototl, ſeu Avis Corvina* Fernand. — Gall. *Bout de Petun.* — Angl. *Great Black Bird.*

LA ſpecie deſcritta dal Willughby, dal Bronw, e altri, intieramente nera, ſembra una varietà molto diſtinta, ſebbene altri la reputino l' iſteſſa, e ſoltanto cangiabile di colore a motivo dell' età, e della ſtagione. Uguaglia in groſſezza la *Merla*.

SPecies, quam deſcribunt Willughbeius, Brown, aliique totam nigram, varietas valde diſtinguenda videtur, licet ab aliis pro una eademque ſpecie, coloribus nempe pro aetate vel anni tempeſtate variantibus, ſtatuatur. Corporis craſſitie Merulam *circiter aemulatur.*

T. CXCI. B. -- 17. --

CROTOFAGO maggiore — *Crotophagus maior* Briſs. ſp. 2. — Gall. *Le grand Bout de Petun.*

QUeſte ſpecie d' Uccelli, e in ſpecie l'antecedente, gridano con alta voce *iili* d' un tuono ſolo, ma più alto in mezzo. Se ne trova quantità nell' Iſola di Caienna, e formano nidi vaſtiſſimi nelle ſiepi, ponendovi, e covandovi da 50. uova per volta; per altro non ſono buoni a mangiarſi.

HUius generis Aves, ac praeſertim ſpeciei ſuperioris, clamant elata voce iiii *uno tono, in medio elevatiori. Frequentes ſunt in ſylvis omnibus Cayanae Inſulae, & ampliſſimos in ſepibus nidos conſtruunt, & quinquaginta ſimul in uno eodemque nido ova ponunt, iiſque incubant; verum cibo inutiles ſunt.*

T. CXCII. B. – 9. 1.

CROTOFAGO vario Indiano. — *Crotophagus varius Indicus* nobis. — *Picus Indicus* Gerin. Ornith.

TRovavaſi queſto un tempo a Verſaglies, d' onde dipinto fu fatto venire; ivi era moſtrato per un *Picchio dell' Indie*.

VErſaliae olim vivebat haec Avis, ubi depicta fuit, atque ſub Pici Indici *nomine demonſtrata, & Florentiam imagine miſſa.*

T. CXCIII. Fig. 1. B. -- 5. -- Fig. 2. B. -- 4. 1.

Fig. 1. PECIOTTO, altrimenti Picchio piccolo grigio, o cenerino, detto a Ravenna Raparino. — *Sitta ſeu Picus minor cinereus.* — *Sitta, ſeu Picus cinereus* Aldrov. & Rai. — *Picus cinereus* Ionſt. Sibbald. & Friſch. — *Picus cinereus, vel ſubcaeruleus* Geſn. — *Picus Pyrenaicus, cinereus, puſillus* Barr. Ornith. — *Parus facie Pici* Klein. — *Sitta* Briſs. T. III. ſp. 1. pag. 588. vel potius *Sitta minor* eiuſd. ſuperioris varietas pag. 592. — *Sitta* [*Europaea*] *rectricibus nigris, lateralibus quatuor infra apicem albis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Torchepot Grimpereau, Torchepot.* — Angl. *Nut-Hatch.; Nut-Iobben.*

SEcondo il Willughby è qualcoſa minore di un *Fringuello*, e appena del peſo d' un' oncia. Altri però come il Briſſon lo fanno groſſo quanto un' *Allodola*; ma ſiccome queſt' Autore ne deſcrive una varietà, che egli chiama *minore*, da eſſo però non veduta, perciò è credibile, che queſta noſtra ſia la minore. Trovaſi in Toſcana, dove dimora tutto l' anno.

Cova una ſol volta, ma quando gli ſia guaſtato il nido, torna a covare per la ſeconda volta. Cova negli alberi, e con terra riduce aſſai piccolo l' ingreſſo del nido, qualora foſſe la buca molto grande, e lo riempie con foglie di Quercia. Pone ſei, o ſette, e anco otto uova, le quali ſono di guſcio finiſſimo, tutto ſparſo di macchiette rotonde, e di ſpruzzi di color di cannella.

FRingilla *paulo minor eſt, atque unciae vix pondere Willughbeii obſervatione; alii vero, ut Briſſonius eamdem faciunt ac* Alaudam *craſſitie; cum vero Briſſonius aliam huius varietatem deſcribat, quam* minorem *dicit, ab ipſo tamen nunquam viſam, manifeſtiſſime hanc noſtram huic varietati a Briſſonio deſcriptae reſpondere eruitur. In Etruria per totum anni decurſum habitat.*

Nidum unica vice ſtruere ſolet, tamen iterum nidum aedificat, cum primum deſtructum reperiat, illumque in arborum foraminibus ponit; oſtium autem, per quod introitus eſt, ſi nimis amplum fuerit, partem eius artificioſe luto opplet, anguſto tantum aditu ſibi relicto, cavitatem autem reliquam & internam foliis Quernis fulcit. Ova autem ſex, vel ſeptem, quandoque octo deponit, quae tenuiſſimo ſunt cortice maculis rotundis, punctiſque caſtaneis aſperſa.

Fig. 2. PECIOTTO del Canadà. — *Sitta Canadenſis.* — *Sitta an Canadenſis* Briſs. ſp. 2.?

LA deſcritta dal Briſſon non è inferiormente di color di roſa sì vivo, ma per la ſua deſcrizione languidamente roſſiccia, il qual colore moſtra di dover eſſere piuttoſto ſimile al caſtagno roſſiccio. Trovaſi nel Canadà, e come i *Picchi* ſale per i tronchi, e rami degli alberi.

QUae a Briſſonio deſcribitur inferne minus roſeo ac vivido colore tincta deſcribitur, diciturque in iis partibus rufo diluto tincta, qui color ad caſtaneum potius rufeſcentem pertinet. Habitat haec in Canada, & truncos ac ramos arborum Picorum *norma ſcandit.*

T. CXCIV. Fig. I. Fig. II. B. -- 3. 1.

Fig. 1. PECIOTTO, altrimenti Picchio minimo celeſte di Ceilan. — *Sitta, ſive Picus minimus caeruleus Ceylanenſis.*

Fig. 2. PECIOTTO, o Picchio minimo dell' Indie. — *Sitta, vel Picus minimus Indicus.*

L' Uccello moſtrato da queſta ſeconda figura per la poſizione delle dita, due d' avanti, e due di dietro, e per la coda rigida, moſtra d' eſſere propriamente un *Picchio*, e che così debba chiamarſi. Quello poi della figura prima ſembra d' un genere affatto diverſo, e che doveſſe eſsere collocato tra le *Paſſere*, o tra altri piccoli Uccelletti; ma ſiccome nella Raccolta Gerini trovavaſi poſto quivi, e difficile eſſendo dalla piccola e ſola figura ricavare tutte le ſegnature, che neceſsarie erano a determinare il vero ſuo genere, perciò neppur noi lo abbiamo rimoſſo.

AVem hanc figura ſecunda oſtenſam, digitorum diſpoſitione, duobus ſcilicet anticis totidemque retro poſitis, atque cauda rigidula, ad Pici *proprium genus pertinere, nec aliter appellari debuiſse manifeſtiſſimum eſt. Quae vero ſub prima icone oſtenditur, ad aliud forte genus inter minimas Aves, ſive* Paſſeres *pertinet. Hoc loco tamen in Geriniana collectione cum inveniſſemus, nos pariter hic poſuimus, cum difficile fuiſſet a ſola, & puſilla icone omnes characteres ad proprium certumque ſtabiliendum genus neceſſarios eruere.*

5. PECIOTTO, o Picchio piccolo cenerino col capo nero della Giammaica. = *Sitta, vel Picus minor cinereus capite nigro Iamaicenſis.* = *Sitta, ſeu Picus cinereus, maior, capite nigro* Sloan & Rai. = *Bariſtus maior ſubcinereus, capite nigro* Brow. = *Merops maior capite nigro* Barr. Hiſt. = *Merops Americanus, cinereus, capite nigro* Barr. Ornith. = *Sitta Iamaicenſis* Briſs. ſp. 3. = *Cum Alauda craſſitie convenit; ſuperne cinerea, inferne alba, vertice nigro, rectricibus lateralibus nigricantibus, apice lineis tranſverſis albis notatis; roſtro, pedibus, & unguibus nigris. Huius ſpeciei maior, & minor invenitur. Minor a* Sloanio in Hiſt. nat. Iamaicae *dicitur* Bariſtus minimus pullus, vertice nigro: *nec niſi magnitudine, qua ei cedit, a praecedente differt.*

6. PECIOTTO, e Picchio piccolo della Carolina. = *Sitta Carolinenſis* Briſs. ſp. 4. = *Bariſtus minor ſubcinereus, vertice nigro, pectore albido* Brow. = *Parus facie Pici* Klein. = *Sitta capite nigro* Catesb. = *Iamaicenſi dictae nonnihil craſſitie cedit, ſuperne cinerea, inferne candicans; imo ventre rufeſcente; capite & collo ſuperius nigris; rectricibus lateralibus albo & nigro variis; roſtro nigro, pedibus & unguibus fuſcis. Truncos & ramos arborum ſcandit; in Iamaica & Carolina habitat, ibique pullos educat, & per totum annum manet.*

7. PECIOTTO, o Picchio piccoliſſimo della Carolina. = *Sitta Carolinenſis minor* Briſs. ſp. 5. *An Sitta, ſeu Picus cinereus maior roſtro curvo* Sloan. = *Sitta capite fuſco* Catesb. = *Praecedentibus multum craſſitie cedit; ſuperne cinerea, inferne ſordide alba; capite & collo ſuperius fuſcis; macula in occipitio ſordide alba; rectricibus lateralibus nigris; roſtro nigro, pedibus & unguibus fuſcis. Inſectis victitat, totoque anno in Carolina habitat.*

T. CXCV. Fig. I. B. -- 3. -- Fig. II. B. -- 3. 1.

Fig. 1. CERZIA cenerina, altrimenti Picchio paſſerino, volgarmente Rampichino. — *Certhia griſea, ſeu Picus cinereus minimus.* — *Certhias, vel Certhius Ariſtotelis* Geſn. — *Scandulaca arborum* Schwenk & Rzac. — *Falcinellus arboreus noſtras* Klein. — *Certhia* Aldrov. Ionſt. Rai. Willugh. & Charlet. — *Certhia* Briſ. ſp. 1. — *Certhia puſilla* [*aeque ac ea, quae ſub Tab. CXCVI. Fig.* 1.) Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. — Gall. *Le Grimpereau, ou petit Grimpereau.* — Angl. *Creeper, or Tree-Creeper; or-Eye-Creeper.*

E' Un Uccelletto aſſai piccolo, e appena più groſſo d' un *Re di macchia*. Secondo l' Aldrovando cova come i *Picchi* ne' fori degli alberi, e depone un gran numero di uova, cioè qualche volta fino a 20. la qual coſa non ſembra probabile, eſsendo così piccolo, e impotente perciò a riſcaldarle. Secondo però l' oſservazione dell' accuratiſſimo Conte Ginanni ne depone ſoltanto cinque, e ſono di guſcio piuttoſto duro, di color cenerino, punteggiate, e ſtriate per lo lungo di color più cupo.

PErexigua eſt Avicula, & Regulo *tantillum maior. In cavis arborum referente Aldrovando more* Picorum *nidificat, & ovorum maximum numerum, viginti nempe quandoque parit, quod improbabile videtur, cum Avis haec tam parva ſua corporis mole fovere ea non poſſit. Ginanni accuratiſſimi viri obſervatione numero tantum quinque ab hac deponuntur cortice duriuſculo, colore griſeo, & colore obſcuriore ſimul punctata, atque longitudinaliter ſtriata.*

E' *Fre-*

E' un Uccello, che in Inghilterra si trova frequentemente, ma appresso di noi è raro. Continovamente passeggia per i tronchi, e rami degli alberi, come i *Picchi*, mediante la disposizione de' suoi piedi, e della coda, e non stà fermo se non quando dorme.

Frequens in Anglia est Avis, rara vero apud nos. Iugiter per arborum truncos ac ramos ut Picus *apta pedum & caudae dispositione perreptat, nec nisi dormiens stat.*

Fig. 2. CERZIA scura minore Indiana. — *Certhia minor fusca Indica.* — *Certhia fusca minor* Edw. — *Falcinellus fuscus ventre albicante* Klein. — *Certhia Indica* Briss. sp. 9. — *Certhia* [*pusilla*] *supra grisea, subtus alba, rectricibus fuscis, extimis apice albis* Linn. Syst. Nat. sp. 2. — Gall. *Le Grimpereau des Indes.* — Angl. *Honey Thief; or the little brown, and White Creeper.*

QUesto è proprio dell' Indie Orientali, e alcune specie di questi, o genere, si soglion confondere con i *Colibri* per avere il becco sottile, lunghetto, e alquanto arcato. Questi Uccelletti per testimonianza del Klein cantano, con qualche modulazione non molto diversa da quella del *Rusignolo*, laddove i *Colibri* non cantano.

IN India Orientali habitat, nonnullaeque huius Avis species cum Mellisugis *confundi solent rostro praesertim tenui, producto, & aliquantulum falciformi. Aviculae hae referente Kleinio canorae sunt, vocesque* Lusciniae *pronunciant cum* Mellisugae, *sive* Colibri, *non sint canorae.*

T. CXCVI. Fig. I. B. — 4. 1. Fig. II. B. — 3. 1. ½

Fig. 1. CERZIA volgare maggiore, altrimenti Picchio Passerino maggiore, e Rampichino maggiore. — *Falcinellus arboreus nostras* Klein. — *Certhius maior* Frisch. Klein. — *Certhia maior* Briss. sp. 1. variet. A — *Certhia* [*familiaris*] *supra grisea, subtus alba, remigibus fuscis, decem macula alba* Linn. sp. 1.

PEr i costumi, e per le qualità conviene molto con la specie dimostrata dalla Tav. CXCV. Fig. 1. e differisce solo nella grossezza, essendo di quella minore. Alcuni dicono, tra' quali il Klein, e Linneo nel suo Sistema della Natura dell' edizione decima, che partorisce 20. uova; si dice pure che stà sugli alberi, negli spaccati de' quali và in caccia delle uova e crisalidi degl' insetti, e che teme l' uomo meno di qualunque altro Uccelletto.

Uno di questi, detto della specie maggiore, fu preso con le proprie mani dal Klein tronco di un albero.

CUm Certhia *Tab. CXCV. Fig.* 1. *plurimum in qualitatibus & moribus convenit, nec nisi magnitudine, qua ei cedit, ab ipsa discrepat. Hanc ova ponere viginti referunt nonnulli, inter quos Kleinius, & ipse Linnaeus in suo Naturae Systemate editionis decimae; dicitur in arborum truncis habitare, inque eorum rimis legere insectorum ova, & larvas, hominesque minus metuere quam aliae Aviculae.*

Hanc maiorem proprie dictam, truncum arboris ascendentem, manu prehendit per sylvam ambulans Kleinius. passeggiando per un bosco, allorchè saliva sul

Fig. 2. CERZIA blù del Surinam — *Certhia Surinamensis caerulea* Edw. — *Falcinellus gula, alisque nigris* Klein. — *Falcinellus Papilio* eiusd. — *Certhia Cayanensis caerulea* Briss. sp. 12. — *Certhia* [*caerulea*] *remigibus rectricibusque nigris* Linn. Syst. Nat. sp. 3. — Gall. *Le Grimpereau bleu de Cayenne, ou du Surinam.* — Angl. *The blue Kreeper.*

VAria questa per le penne delle ale, e della coda, ora scure, ora brune, ora nerissime. Per la grossezza supera qualche volta la specie, che si vede sotto la Figura prima.

REmigibus rectricibusque nunc fuscis, nunc nigricantibus, nunc nigerrimis variat. Certhiam *autem sub Fig.* 1. *depictam sive nostratem crassitie aliquando etiam superat.*

T. CXCVII. B. — 6. —

CERZIA muraiola, o Picchio muraiolo — *Certhia muralis* Briss. sp. 2. — *Picus murarius* Aldrov. Ionst. Chalet. Rai. & Willughb. — *Picus muralis* Gesn. & Schwenk — *Meros pirenaicus, cinereus, alarum costis coccineis, reptatrix* Barr. Ornith. — Gall. *Le Grimpereau de Muraille, ou Pic de Muraille.* — Angl. *The Spider-catcher.*

QUalche volta è grossa quanto uno *Storno*, ma comunemente è poco più grossa di una

STurni *fere crassitiem quandoque adaequat, ut plurimum vero* Passere domestico *paullo maior*

una *Paſſera ordinaria*. L' Aldrovando, che fra gli altri ſcrittori delle coſe degli Uccelli, deſcriſse diligentemente queſta ſpecie d' Uccello, la cita per molto ovvia nel Bologneſe: anco intorno Firenze, ne' luoghi però non tanto ſalvatici, più volte è ſtata oſſervata, e ammazzata. Cova per altro ne' fori degli alberi. Dal Willughby, e dal Raio mai non è ſtata veduta in Inghilterra, ſebbene altri aſſeriſcano ritrovarviſi. Nel volo ſomiglia molto la *Bubbola*, imperocchè come eſsa ſcuote ſempre le ale, nè mai ſtà ferma. Sale ſopra le muraglie, e ſopra le ſcoſceſe rupi de' monti, come appunto ſale il *Picchio* ſugli alberi, e ſi ciba degl' inſetti, che in tali luoghi ritrova. Nell' Inverno ſi vede anco nelle Città ſulle muraglie delle torri.

E' un allegro Uccelletto, e canta anco ſoavemente. La femmina differiſce dal maſchio per avere la gola bianca, che nel maſchio è nera. La lingua di queſto animaletto è molto appuntata, verſo la baſe poi più larga, e corredata ne' lati di due appendici, come ſeparatamente dall' Uccello è ſtata delineata.

ior eſt. Aldrovandus, qui inter alios Ornithologos ſatis accurate Avem hanc deſcribit, eamdem in agro Bononienſi ſatis obviam dicit: apud nos etiam in montibus prope Florentiam minus ſylveſtribus, pluries reperta, & occiſa fuit. Nidulatur tamen in foraminibus arborum. In Anglia nunquam a Willughbeio & Raio conſpecta fuit, licet ab aliis inibi inveniri dictum fuerit. Upupae *in volatu ſimilis, quoniam alas ut illa ſemper motitat, nec uno loco reſidere novit. Muros & montium ſcopulos ſcandit eodem modo, quo* Pici *per arborum truncos ramoſque aſcendunt, & inſectis in ipſorum rimulis habitantibus victitat. Brumae tempore in Urbibus etiam ad turrium muros conſpicitur.*

Avicula eſt hilaris, & ſuavem vocem edit. Foemina a mare diſcrepat gutture albido, quod in mare nigrum eſt. Aviculae huius lingua apice valde acuta, ad baſim vero dilatata, & appendicibus ad latera inſtructa, ſeorſim in ipſa noſtra Tabula, ut ab Ave avulſa fuit, depicta obſervatur.

ſi vede in queſta medeſima Tavola, dove ſe-

T. CXCVIII. Fig. I. B. -- 2. 2.

Fig. II. B. -- 3. 1. *Quae ſub ſigno * ad Tab. CCXXXIV. videatur.*

Fig. 1. CERZIA minore Indiana bianca, nera, e roſsa. — *Certhia minor ex albo, nigro, & rubro varia Indica.* — *Certhia minor ex albo nigro & rubro varia* Edw. — *Falcinellus Bengalenſis* Klein. — *Certhia Bengalenſis* Briſs. ſp. 31. — *Certhia* [*cruentata*] *nigro-caeruleſcens, ſubtus alba, vertice, cervice, dorſo, uropygioque rubris* Linn. Syſt. Nat ſp. 4. — Gall. *Le Grimpereau de Bengale; Petit Grimpereau des Indes, noir, blanc, & rouge.* — Angl. *The little black, white, and red Indian Creeper.*

PRopriamente il becco di queſta deve eſsere più lungo, o ſottile di quello che dalla figura ſi dimoſtra, e trovaſi nel Regno di Bengala.

HUius roſtrum longius, ac tenuius revera eſt, quam ab icone demonſtretur, haec autem Avis in Bengalenſi Regno habitat.

*Fig. 2. quae ad Tab. Tomi huius CCXXXIV. ſigno * notata videatur.*

CERZIA ſcura, o nera, e gialla d' America. — *Certhia ex fuſco vel nigricante, & luteo colore varia Americana.* — *Luſcinia, ſive Philomela e fuſco & luteo varia* Sloan. Rai. Klein. & Edw. — *Certhia, ſive Saccharivora Iamaicenſis* Briſs. ſp. 33. in ſupplem. — *Certhia* [*flaveola*] *nigra, uropygio, pectoreque luteo, ſuperciliis, macula alarum, rectricumque apicibus albis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 5. — Gall. *Le Grimpereau noir & iaune; Le Grimpereau, ou le Sucrier de la Iamaique.* — Angl. *Black and yellow Bird.*

QUella, che ſi vede riportata in queſta Tavola, e ſotto queſta figura è ſtata sbagliata, ed è una *Capinera di Giammaica*, o ſia una *Paſſera Scopaiola* di tal Paeſe, da deſcriverſi altrove.

Realmente la *Cerzia* per grandezza, colore, e formazione di becco è molto da queſta diverſa, come dalla citata Tav. CCXXXIV. ſotto il ſegno * dove è ſtata riportata, ſi potrà ricavare. Trovaſi queſta alla Giammaica, alla Martinicca, e in altri luoghi ancora d' America. Un' altra di queſta ſpecie, e forſe la femmina di queſta, ſi troverà più ſotto al numero 36.

QUae errore depicta Avis fuit ſub hac Tabula Curruca Iamaicenſis *eſt*, *ſive* Paſſer Sepiarius Iamaicenſis, *alio loco deſcribenda.*

Certhia *autem magnitudine, coloribus, & roſtri configuratione multum ab hac diſcrepat, ut in indicata Tabula CCXXXIV. ſub ſigno * videre eſt. In Iamaica, Martinica, nonnulliſque aliis Americae locis habitat. Alia valde huic ſimilis, & forte ſpeciei huius foemina, deſcribetur infra ſub num. 36.*

T. CXCIX. Fig. I. B. — 3. 1. Fig. II. B. — 4. 1. $\frac{1}{2}$

Fig. 1. CERZIA cenerina e gialla dell' Iſole Filippine. — *Certhia ſuperne griſea inferne lutea Philippenſis*. — *An Certhiae minoris Philippenſis* Briſsonii ſp. *6.* varietas? quae infra ſub num. 18. videri poteſt. — Gall. *Le petit Grimpereau gris & iaune des Philippines*.

Fig. 2. CERZIA di color violetto del Senegal. — *Certhia Senegalenſis violacea* Briſs. ſp. 29. — Gall. *Le Grimpereau violet du Senegal*,

NOn è molto più groſsa d' un *Re di macchia*, ed è di coda lunga, come dalla figura ſi rileva, ma il becco non è ſi groſso alla baſe, come è ſtato eſpreſso. Alcune di queſte ſpecie d' Uccelli da altri ſono ſtate nominate diverſamente, e collocate fra i *Colibri*, o *Trochili* di Linneo, e anco tra le *Cutrettole*. Il preciſo loro carattere ſi deſume dal becco. La *Cerzia* lo ha ſottile, inarcato, e andando verſo la punta ſempre ſottile di più. Ne' *Colibri*, o *Trochili* è ſottile egualmente, e inarcato, ma verſo la cima piuttoſto ſi allarga, come meglio ſi rileverà al ſuo luogo, allorchè ſi moſtreranno, e deſcriveranno alcuni individui di queſt' ultimo genere.

COrporis craſſitie Regulum *non multum ſuperat, caudaque ſatis longa, ut ab icone oſtenditur, donatur, roſtro vero aeque longo, ſed minus verſus baſim craſſo. Nonnullae huius ſpeciei Aves aliter a diverſis Auctoribus appellantur, collocanturque inter* Melliſugas, *ſive* Trochilos *Linnaei, atque inter* Motacillas. *Earum praecipua diſtinctio in roſtris reſidet.* Certhiae *roſtrum filiforme eſt, arcuatum, & verſus apicem craſſitie ſenſim, atque ſenſim minuitur; in* Melliſugis *autem, ſive* Trochilis *roſtrum filiforme pariter eſt, & arcuatum, ſed per totam ferme longitudinem aeque craſſum, immo verſus apicem parumper ampliatum, ut melius cognoſci ſuo loco poterit, in deſcriptione & oſtenſione nonnullarum poſtremi huius generis Avium.*

T. CC. Fig. I. & II. B. — 3. 1. $\frac{1}{2}$

CERZIA, detta porporina, dell' Iſole Filippine, maſchio, e femmina. — *Certhia purpurea dicta Philippenſis mas, & foemina. Figura vero* 1. *non ut in inſcriptione ipſius Tabulae legitur marem oſtendit, ſed foeminam. Figura autem* 2. *marem demonſtrat.* — *Falcinellus colore Paſſeris Hiſpanici* Klein. — *Troglodytae adfinis* Moehr. — *Certhia Philippenſis purpurea* Briſs. ſp. 27. — Gall. *Le Grimpereau pourpré des Philippines*,

IL Klein aſſeriſce, che totalmente ſi raſſomiglia alla ſpecie più comune dimoſtrata dalla Tav. CXCVI. e dice che canti come un *Ruſignolo*. Veramente la noſtra per la lunghezza della coda, e per il becco, che è molto lungo e groſso, ſiccome per i colori delle penne, come a ſufficienza vien dimoſtrato dalla figura, non pare, che ſi poſſa prendere sbaglio a ſtabilir diverſa dalla ſpecie indicata dell' Iſole Filippine.

TOta facie cum noſtrate ſive vulgari Tabulae CXCVI. hanc convenire aſſerit Kleinius, eamdemque canoram dicit, & Luſciniae *voces pronunciare. Revera Certhia vulgaris noſtras, caudae & roſtri longitudine, quod maximum eſt, & coloribus, ut a pictura luculenter oſtenditur, ab hac Philippenſis dicta ſatis diſcrepare videtur.*

T. CCI. Fig. I. B. — 8. — Fig. II. B. — 6. 1.

Fig. 1. CERZIA di coda lunga del Capo di Buona Speranza. — *Certhia longicauda Capitis Bonae Spei* Briſs. ſp. 22. — Gall. *Le Grimpereau a longue queve du Cap de Bonne Eſpérance*,

IN queſta ſpecie dall' una e l' altra parte ſotto il forte dell' ala trovaſi una macchia grandetta gialla, che ad ale ſerrate, come ſtà la noſtra, non ſi vede. Quella rappreſentata dal Briſson ha pure una piccola ſtriſcia nera di piuma come il velluto tra il becco, e l' occhio, la quale pure manca nella noſtra.

In

IN hac infra humeros maiuſcula macula elegenter lutea, utrinque adeſt, quae alis complicatis, ut noſtra in imagine poſita eſt, nequaquam conſpicua evadit. Quae a Briſſonio quoque oſtenditur in utroque capitis latere exigua extat roſtrum inter & oculum taenia longitudinalis nigra, & villoſa, ut holoſericum ſplendens, quae in noſtra deficit.

Cor-

In grosezza è simile al *Beccafico*. Dell' istessa Regione, e parimente di coda lunga un' altra se ne trova descritta, detta *minore*, della quale se ne troverà fatta menzione più sotto al num. 31.

Corporis crassitie Ficedulam *circiter aequat. Huius speciei, & Regionis, minor quoque invenitur, quae sub num.* 31. *describetur.*

Fig. 2. CERZIA di coda lunga del Senegal. — *Certhia longicauda Senegalensis.* — Briss. T. III. sp. 21. pag. 645. — *Avicula Amboinensis, discolor & perpulchra* Seb. — *Sylvia versicolor* Klein. — Gall. *Le Grimpereau a longue queve du Senegal.*

TRovasi nel Senegal, ed è poco più grosso d' un *Re di macchia*.

IN Senegalensi Regione habitat, corporisque crassitie Regulum *non multum antecellit.*

T. CCII. Fig. I. B. -- 4. 2. Fig. II. B. -- 4. --

Fig. 1. CERZIA nerastra, o sia superiormente scura, e inferiormente di più colori, del Brasile. — *Certhia Brasilienſis nigricans, vel potius fusco-nigricans, inferne varie picta Brasilienſis.* — *Certhia Brasilienſis nigricans* Briss. sp. 28. T. III. pag. 658. — Gall. *Le Grimpereau noiraſtre du Bresil.*

Fig. 2. CERZIA porporina di Virginia. — *Certhia Virginiana purpurea* Briss. sp. 26. T. III. pag. 654. — *Avis Virginiana phoenicea* Seb. — *Falcinellus phoeniceus* Klein. — Gall. *Le Grimpereau pourpré de Virginie.*

E' Poco più grosa di un *Beccafico*. Realmente queste specie di Uccelli devono esere descritte fra le *Passere*, o altri piccoli Uccelli; ma siccome la nostra Ornitologia originale le aveva quì collocate, e lo stesso Raio le descrive dopo i *Picchi* propriamente così detti, neppur noi abbiamo fatto diversamente, tanto più, che tramezzando degli Uccelli piccoli, e de' grandi, è stata valutata da alcuni una miglior disposizione, specialmente per contentare la vista. La riunione di molti consimili, per quanto ci è stato detto, non era accetta alla maggior parte.

CRassitie Ficedulam *paullulum antecellit. Huiusmodi Aves revera inter* Passeres, *aliasque Aviculas describendae ac locandae erant; sed cum Ornithologia nostra eas hic loci ostenderet, ipseque Raius post* Picos *proprie dictos easdem describat, non aliter & nos facere decrevimus, eo magis cum nonnullas minores Aves maioribus intersecando melior, & visus oblectamento praestantior dispositio pluribus visa fuerit. Similium enim, & affinium multitudo innumeris, ut intelleximus, displicuit.*

16. CERTIA dell'Isole Filippine. = *Certhia Philippensis* Briss. sp. 4. = *Certhiae pusillae nostrati, sive minori sub Tab. CXCV. Fig.* 1. *demonstratae crassitie aliquantulum cedit; superne griseo fusca, ad virideſcentem colorem inclinans, inferne alba ad sulphureum vergens; rectricibus binis intermediis nigris, oris exterioribus viridi-aureo colore variantibus, lateralibus nigricantibus apice albidis; rostro, pedibus, & unguibus nigris.*
17. CERZIA dell'Isole Filippine, cenerina. = *Certhia Philippensis grisea* Briss. sp. 5. cum optima icone. = *Praecedente crassitie etiam minor; superne griseo-fusca, inferne albo-flavicans; collo inferiore taenia longitudinali saturate violacea insignito; rectricibus alarum superioribus violaceo-calybeis, rectricibus nigris, exterius violaceo-calybeo fimbriatis, lateralibus apice albis; rostro, pedibus & unguibus nigris.*
18. CERZIA dell' Isole Filippine minore. = *Certhia Philippensis minor* Briss. sp. 6. cum optima icone. = *Praecedenti crassitie multum cedit; superne griseo-fusca, inferne lutea; gutture macula saturate violacea insignito; rectricibus saturate fuscis, binis utrinque extimis apice albo-flavicantibus; rostro, pedibus, & unguibus nigricantibus.*
19. CERZIA del Capo di Buona Speranza. = *Certhia Capitis Bonae Spei* Briss. sp. 7. cum accurata icone. = *Regulum crassitie circiter aequat; griseo-fusca, superne saturatius, inferne dilutius; rectricibus nigricantibus, oris exterioribus griseo-fuscis, extima exterius albo fimbriata; rostro, pedibus, & unguibus nigricantibus. Coloribus nullo modo lucidis perlustratur, forsan cuiusdam speciei foemina est.*
20. CERZIA dell' Isola di Baama. = *Certhia Bahamensis* Briss. sp. 8. = *Luscinia pectore flavo* Klein. = *Parus Bahamensis* Catesb. = *Parvula est Avis, rostro aliquantisper curvato, pectore, colloque inferne lutei coloris, superne fusca, taenia supra oculos candida; marginibus alarum luteis; cauda producta ex fusco & albo varia; rostro nigro, pedibus & unguibus fuscis.*
21. CERZIA di color d' oliva dell' Isole Filippine. = *Certhia Philippensis olivacea* Briss. sp. 10. cum accurata icone. = *Crassitie cum Regulo convenit, superne obscure olivacea, inferne lutea; collo inferiore & pectore splendide ac saturate violaceis, rectricibus fuscis, oris exterioribus obscure olivaceis; rostro nigro, pedibus & unguibus saturate cinereis.*
22. CERZIA di color d' oliva del Madagascar = *Certhia Madagascariensis olivacea* Briss. sp. 11. cum icone. = *Cras-*

Craſſitie a ſuperiore vix recedit ; ſuperne obſcure viridi-olivacea, vertice obſcuriore, inferne griſeo-fuſca ; oculorum ambitu candicante, rectricibus fuſcis, oris exterioribus obſcure viridi-olivaceis ; roſtro nigricante ; pedibus, & unguibus fuſcis .

23. Cerzia blù del Braſile . = *Certhia Braſilienſis caerulea* Briſs. ſp. 13. cum accurata icone. *Falcinellus de Guitguit* Klein. = *Avicula de Guitguit ex Inſula Cuba* Seb. = *Colius* Moehr. = *Guira-coereba Braſilienſibus* Marcgr. Willugh. & Rai. = *Certhiam vulgarem noſtram minorem craſſitie nonnihil excedit ; ſplendide cyanea, collo ſuperiore, dorſo ſupremo, & taenia per oculos ſplendide nigris ; vertice cyaneo-beryllino, remigibus exterius & apice nigris, interius ſulphureis ; rectricibus nigris ; roſtro nigro, pedibus rubris, unguibus nigricantibus,*

24. Cerzia verde del Braſile . = *Certhia Braſilienſis viridis* Briſs. ſp. 14. = *Sylvia viridis capite cyaneo* Klein. = *Quae inter Paſſeres, ſive Aviculas minores, atque ſub nomine* Sylviae, *vel* Muſcicapae *deſcribetur, & cum icone inſequente n.* 25. *oſtendetur .*

25. Cerzia verde con teſta nera del Braſile . = *Certhia Braſilienſis viridis atricapilla* Briſs. ſp. 15. *quae ſuo loco inter Aves minores, cum ſuperiore, ſub* Sylviae, *vel* Muſcicapae atricapillae *nomine videatur .*

26. Cerzia verde con capo nero d' America = *Certhia Americana viridis atricapilla* Briſs. ſp. 16. *Avicula Americana altera* Seb. = *Sylvia, Avicula Americana altera* Seb. Klein. = *Fringillam circiter craſſitie aemulatur ; ſuperne ſplendide viridis, inferne ſaturate caerulea ; capite & gutture ſplendide nigris ; rectricibus ſaturate viridibus ; roſtro candicante .*

27. Cerzia verde di Caienna. = *Certhia Cayanenſis viridis* Briſs. ſp. 17. cum optima icone = *Certhiam noſtratem minorem craſſitie circiter aemulatur ; ſuperne ſplendide viridis inferne lineolis longitudinalibus albis, viridibus, & caeruleis varia, faſciola utrinque ſecundum maxillae inferioris longitudinem caerulea ; gutture, & macula utrinque narem inter & oculum rufeſcentibus ; rectricibus viridibus, lateralibus interius nigricantibus ; roſtro nigro, pedibus & unguibus griſeis. Pariſiis in Muſeo Dominae de Baudeville quaedam ſervantur huius ſpeciei individua in univerſo corpore caeruleo varia, caeruleo in aliis maius, in aliis minus ſpatium occupante . Foemina a mare diſcrepat coloribus non ita vividis, & in eo quod colore rufeſcente in gutture & capite careat, nihilque caerulei habeat .*

28. Cerzia di color violetto del Madagaſcar. = *Certhia Madagaſcarienſis violacea* Briſs. ſp. 18. cum accuratis maris & foeminae iconibus . = *Craſsitie Regulum non antecellit ; ſuperne ſplendide viridis ad violaceum inclinans, inferne pallide flava, dorſo infimo & uropygio fuſco-olivaceis ; taenia duplici tranſverſa in pectore, una caeruleo-violacea, altera caſtanea ; rectricibus nigris, extima ultima medietate oblique griſeo-fuſca, proxime ſequenti apice griſeo-fuſca ; roſtro, pedibus, & unguibus nigris . Foemina magnitudine paullulum craſſitie cedit, & coloribus minus vividis perluſtratur. In univerſo enim corpore ſuperne fuſco-olivacea eſt, alis vero & cauda ut in mare .*

29. Cerzia verde del Madagaſcar . = *Certhia Madagaſcarienſis viridis* Briſs. ſp. 19. cum maris & foeminae accuratis iconibus . = *Avis Ceilonica omnicolor* Seb. = *Falcinellus omnicolor Zeylanicus* Klein. = *Virore ſulfuſa elegantiſſimam omnifarii coloris mixtionem evibrat, auri mixtura dives ; roſtro, pedibus, & unguibus nigris . Ad Ficedulae craſſitiem accedit . Mas inferne, pariterque in alis & cauda ſplendide niger eſt ; foemina inferne ſordide alba nigro maculata, alis caudaque non ita, ut in mare, ſplendide nigris.*

30. Cerzia del Capo di Buona Speranza col collarino. = *Certhia torquata Capitis Bonae Spei* Briſs. ſp. 20. cum accurata icone . = *Praecedenti multum craſsitie cedit ; ſuperne viridi aurea, cupri puri colore varians, inferne griſea ; pectore rubro ; taenia tranſverſa collum inter & pectus calybea, viridi colore variante ; pectore infimo, & lateribus luteo notatis ; rectricibus ſplendide nigricantibus oris exterioribus viridi-aureis, cupri puri colore variantibus, marginibus in apice griſeis, extima exterius griſea ; roſtro nigricante, pedibus vero & unguibus nigris .*

31. Cerzia di coda lunga del Capo di Buona Speranza, minore . = *Certhia longicauda minor Capitis Bonae Spei* Briſs. ſp. 23. cum optima icone . = *Maior huius Regionis ſub Tab. CCI. oſtenſa fuit . Haec minor dicta Certhiam noſtratem minorem non multum craſſitie antecellit ; ſuperne ſplendide violacea ad viride inclinans, inferne ſplendide crocea ; dorſo infimo & uropygio fuſco olivaceis ; rectricibus fuſco-nigricantibus oris exterioribus olivaceis, duabus intermediis longiſsimis ; roſtro, pedibus, & unguibus nigricantibus .*

32. Cerzia roſſa del Meſſico, = *Certhia Mexicana rubra* Briſs. ſp. 24. = *Trochilus coccineus* Linn. Syſt. Nat. edit. 6. ſp. 3. = *Falcinellus Mexicanus* Klein. = *Avicula Mexicana* Seb. = *Trogloditae adfinis* Moehr. = *Praecedentem craſsitie paullulum craſsitie antecellit ; ſaturate rubra, capite ſuperius dilute rubro ; gutture viridi ; rectricibus ſaturate rubris, apice ſubcaeruleſcentibus, roſtro, pedibus, & unguibus dilute luteis .*

33. Cerzia roſsa del Meſſico col capo nero . *Certhia Mexicana rubra atricapilla* Briſs. ſp. 25. = *Avicula de Tatac, ex nova Hiſpania, Paſseris magnitudine, roſtro longo* Seb. = *Sylvia rubra roſtro longiori* Klein. = *Colius* Moehr. = *Ficedulam circiter craſsitie aemulatur ; dilute rubra ; capite nigro ; tectricibus alarum ſuperioribus aureo colore tinctis ; remigibus, rectricibuſque ſaturatius rubris .*

34. Cerzia di color violetto del Braſile . = *Certhia Braſilienſis violacea* Briſs. ſp. 30. cum optima icone. = *Cum praecedente craſsitie convenit ; nigra plurimum eſt, vertice viridi aureo ; gutture ſplendide violaceo ; pectore caſtaneo-purpuraſcente ; dorſo infimo & uropygio ex violaceo ad chalybis politi colorem vergentibus, rectricibus nigris, oris exterioribus violaceo-chalybeis ; roſtro nigricante, pedibus & unguibus griſeo-fuſcis .*

35. Cerzia variegata d' America. = *Certhia Americana varia* Briſs. ſp. 32. = *Avicula Americana variis coloribus picta* Seb. = *Sylvia verſicolor* Klein. = *Fringillae craſsitie eſt ; ſuperne ex caeruleo, ſubnigro, albo, flavoque undulata, inferne citrino & croceo variegata, vertice coccineo ; occipitio cyaneo ; pedibus brevibus, unguibus ſatis longis,*

36. CERZIA detta *Mangia zucchero* della Martinicca . = *Certhia Martinicana , ſive Saccharivora* Briſs. ſp. 3. = *Vix a noſtra Tab. CXCVIII. fig. 2. differt ; taenia enim ſupra oculos in hac albo-flavicans adeſt , in altera candida ; haec gutture albo , altera vero icone oſtenſa , gutture & collo inferiore nigris donatur. Magnitudine autem exacte conveniunt ; utraeque ad Certhiam flaveolam* Linn. Syſt. Nat. ſp. 5. *pertinent , forte ex ſexu tantum varietates.*

T CCIII. B. 1. 3. 1.

TUCANO Mangiapepe . — *Tucana Piperivora* . — *Tucana* Charl. — *Tucana , quam Lerius & Thevectius vocant Toucan* Io. de Laet. & Ionſt. — *Avis Piperivora* Aldrov. — *Pica Braſilienſis* Alb. — *Naſutus* Klein. — *Rhamphaſtos , Hipporynchos & Burynchos* aliis Klein. — *Pica Barbara & Piperivora* nonnullis . — *Bucco* Moehr. — *Toucan Braſilienſibus* Marcgr. — *Roſtrata Americana nigra* Barr. Ornith. — *Tucana Braſilienſis & Cayanenſis gutture luteo* Briſs. ſp. 2. & 5. — *Ramphaſtos* [*piperivorus*] *roſtro nigro carina craſſiſſima* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Le Toucan ; Pie du Breſil* ; *Le Toucan a gorge jaune du Breſil , ou de Cayenne.* — Angl. *Great Beakt Pie of Braſil , or Pepper Pie ; The Braſilian Pie .*

SI contano almeno dodici differenze di queſt' Uccello , riguardo alla groſſezza dell' animale, riguardo a' colori, e riguardo alle varietà del becco . Queſto *Tucano* , ſiccome quello di Caienna citato dal Briſſon ſp. 2. hanno diverſe penne delle copritrici della coda, tanto di ſopra , che di ſotto , di color cremiſi ; e quello del Braſile ſp. 5. del medeſimo Briſſon ha le ſuddette penne di color giallo , differenza in vero aſſai piccola , che non deve formare una diverſa ſpecie , e perciò queſte differenze devono dirſi accidenti d' una ſpecie ſola .

Hanno queſti i piedi ſimili a quelli de' *Picchi ;* e il becco lungo e groſso quanto il capo, e dentato più , o meno, a foggia di ſega , e la lingua della figura di una penna . La ſoſtanza del loro becco è ſottiliſſima, quanto una membrana , ma di ſoſtanza cornea , o d' oſſo , diafana , levigatiſſima , vuota , e capaciſſima ad eſſer ripiena d' aria .

Per ragione di queſto becco così grande , e più ancora per eſſer curvo differiſce il *Tucano* da' *Picchi* ; non uſa neppure l' iſteſſo cibo , non potendone far uſo , a cagione della deſcritta conformazione del becco . Per quanto ſi ſa il *Tucano* non prende inſetti, ma va dietro a' ſemi delle piante , alle bacche , e altri frutti , e particolarmente è avido del Pepe , che ſuol rendere per eſcremento intiero , e non alterato . I Paeſani , che ſuppongono per queſta ragione domata in eſſo molta della ſua acrimonia , antepongono queſto a quello colto dalla pianta .

* *DUodecim ſaltem huius Avis , quoad magnitudinem , colores , & roſtri varietates , enumerantur differentiae .* Tucana *haec noſtra , & Cayanenſis Briſſonii ſp. 2. tectricibus nonnullis caudae ſuperioribus & inferioribus donatur coccineis ; Braſilienſis vero eiuſdem Briſſonii ſp. 5. iiſdem caudae tectricibus donatur luteis , minima certe varietas , quae diſtinctam ſpeciem conſtituere non poteſt , ideoque una eademque Avis dicenda .*

Digitorum diſpoſitio in hac Ave , Picorum *more , obſervatur : roſtrum longum craſſitie caput aequans ſerrae inſtar plus minus denticulatum ; lingua vero pennae aemula , ſive pennacea . Subſtantia roſtri eſt tenuiſſima inſtar membranae , ſed cornea , vel oſſea , ſplendida , laeviſſima , cava , atque aeris intus capaciſſima.*

Hac roſtri magnitudine , & ſignanter curvatura , qua donatur , plurimum a Picis *differt ; eodemque nec cibo utitur , nec indicata roſtri ſtructura uti poteſt .* Tucana , *quantum novimus , vermipeta non eſt , ſed ſemina plantarum , baccas fructuſque , imprimis Piperis quaerit , quod inconcoctum & crudum adhuc eiicit . Incolae , vim ea ratione Piperis domitam credentes , illud ab Ave deiectum recenti praeferunt .*

T. CCIV. B. -- 16. 1.

TUCANO del Braſile detto Aracari . — *Tucana Aracari Braſilienſibus* . — *Cuculus Braſilienſis , Aracari* Marcgr. Klein. — *Aracari* Piſ. — *Aracari Braſilienſibus* Marcgr. Ionſt. Willugh, & Rai. — *Tucana Braſilienſis viridis* Briſs. ſp. 9. — Gall. *Le Toucan verd du Breſil ; Oiſeau des Terres neufes .*

E' Queſto un Uccello della grandezza del *Picchio Marzuolo*, che ſi vede alla T. CLXXII. ed ha la lingua come l'antecedente, lunga da quattro pollici , nera , e della figura appunto di una penna . Trovaſi nel Braſile , al Surinam ,

* PIci Martii *ſub Tab.* CLXXII. *expoſiti magnitudine eſt Avis . Linguam habet ut ſuperior laeviſſimam , quatuor digitos longam , nigram , & aſpectu plane pennam referentem . Habitat haec ſpecies in Braſilia , Surinama , & Cayana.*

Eiuſ-

nam ; e a Caienna. Forſe è una ſemplice varietà del deſcritto più a baſso ſotto il num. 4.

Alcuni di queſti Uccelli hanno le narici collocate fuori della ſoſtanza cornea, che forma il becco, preſso la baſe di eſſo, e ricoperte dalle piume; altri le hanno ſituate ſulla ſoſtanza ſteſſa del becco, e ſcoperte.

Eiuſdem forte ſub num. 4. deſcriptae tantum varietas.

In nonnullis huius generis Avibus nares prope mandibulae ſuperioris exortum & extra materiam corneam ſunt collocatae, & plumis coopertae; in aliis ſupra ipſam materiam corneam, & conſpicuae ſive nudae.

3. TUCANO comune. = *Tucana* Briſs. ſp. 1. = *Pica Braſilica* Geſn. Aldrov. Willugh. & Rai. = *Pica Braſilica, aliis = Pamphaſtos Hipporynchos, & Burinchos, aliis Barbara, & Piperivora* Ionſt. = *Roſtrata Americana, nigra, ventre & uropygio coccineis* Barr. Ornith. = *Avis Piperivora nonnullis* Willugh. & Rai. = *Ramphaſtos* [*Picatus*] *roſtro rubro, apice nigro, carina compreſsa* Linn. Syſt. ſp. 3. = *Superne nigro-viridans eſt, dorſo infimo & uropygio ad cinereum vergentibus; pectore aurantio; ventre & rectricibus caudae inferioribus coccineis; rectricibus ſuperne nigro-viridantibus, ſubtus nigris, apice coccineis. Roſtro inter congeneres magno donatur, baſi nigricante, nunc rubro apice nigro, nunc flavicante viridi obſcuro adumbrato apice rubeſcente; Guineae, & Braſiliae indigena.*

4. TUCANO di gola e collo inferiormente bianco del Braſile. = *Tucana Braſilienſis gutture & collo inferiore candidis.* = *Aracari* Marcgr. = *Picus Americanus* Hernand. = *Paſser longiroſtrus* Nieremb. = *Xochitenacatl tertia* Rai. = *Pica Braſilienſis* Edw. = *Tucana Braſilienſis gutture albo* Briſs. ſp. 3. = *Ramphaſtos* [*Aracari*] *roſtro nigro, maxilla ſuperiore lateribus alba baſi triloba* Linn. Syſt. Nat. ſp. 4. = *Columbam domeſticam craſſitie circiter aemulatur; nigro viridans; genis, gutture, & collo inferiore candidis; taenia tranſverſa in ſummo pectore coccinea, uropygio, & rectricibus caudae ſuperioribus albis, inferioribus pallide rubris; roſtro parum conſpicue denticulato, luteo-virideſcente, exceptis marginibus aurantiis, & exiguis taeniis tranſverſis nigricantibus inſignitis, & excepto quoque apice per unius circiter pollicis intervallum ſplendide coccineo, in mandibula ſuperiore; inferiore vero apice coccinea, in reliqua vero ſui longitudine caeruleo imbuta colore, exiguis taeniis tranſverſis nigricantibus ad margines. Aracari altera ſpecies ſub Tab. CCIII. oſtenditur.*

5. TUCANO di gola, e collo inferiormente bianco di Caienna. = *Tucana Cayanenſis gutture & collo inferiore albis.* = *Tucana Cayanenſis gutture albo* Briſs. ſp. 4. cum optima icone = *Plurimum cum ſuperiori convenit, exceptis rectricibus caudae ſuperioribus ſulphureis, inferioribus coccineis, roſtri taenia ad baſim nigra, altera inde flavicante, altera inſequente nigra, & altera tandem uſque ad apicem flavicante, in mandibula ſaltem ſuperiore. Pedibus donatur plumbeis, unguibus nigris. Cuncta ſibi oblata devorat.*

6. TUCANO del Meſſico col collare. = *Tucana Mexicana torquata* Briſs. ſp. 6. = *Cochitenacatl* Fernand. = *Superne nigra, inferne viridis; torque coccineo; collo inferiore in infima parte dilute luteo, rubris maculis atriſque lineis vario, imo ventre & rectricibus caudae inferioribus rubris; rectricibus nigris; mandibula ſuperiore candicante, inferiore nigra, pedibus e cinereo virescentibus. Habitat in Mexico circa Maris littora, & Piſcibus victitat.*

7. TUCANO verde del Meſſico, *Tucana Mexicana viridis* Briſs. ſp. 7. = *Xochitenacatl* Fernand. = *In toto corpore eſt viridis, rubro & pavonino colore variegata; roſtro luteo ac nigro colore vario; pedibus & unguibus nigris. Magnitudine Tucanam Tab. CCIII. aemulatur. Habitat in Mexico, ibique regiones maritimas frequentat.*

8. TUCANO verde di Caienna. = *Tucana Cayanenſis viridis* Briſs. ſp. 8. cum accurata icone. = *Merulam craſſitie corporis non multum ſuperat; ſuperne obſcure viridis, inferne ſulphurea, capite & gutture nigris; uropygio coccineo; rectricibus ſuperne obſcure viridibus, inferne viridi-cinereis; mandibula ſuperiore lutea lateribus rubris, duos iſtos colores taenia exigua utrinque diſtinguente longitudinali nigra; mandibula vero inferiore nigra, ad baſim rubra; pedibus plumbeis, unguibus nigris. Foemina in hac ſpecie diſcrepat capite, gutture, & colli inferioris parte gutturi finitima eleganter caſtaneis, quae partes in mare nigrae ſunt.*

9. TUCANO di gola gialla di Caienna del Briſson. = *Tucana Cayanenſis gutture luteo* Briſs. ſp. 2. = *Videatur Tucana Tab. CCIII. quae ab hac vix differt, immo una eademque Avis a nobis credita. Braſilienſis Briſſonii donatur rectricibus caudae ſuperioribus ſulphureis, inferioribus coccineis, Cayanenſis vero ſuperioribus, inferioribuſque coccineis, Braſilienſis inſuper taenia tranſverſa in ſummo pectore diſtingnitur coccinea, Cayanenſis autem in toto pectore & ſuprema ventris parte coccineo colore imbuitur, in reliquis vero partibus & coloribus exacte conveniunt, ideoque contemnendae prorſus varietates. Etiam mandibularum margines dicuntur rubrae in Cayanenſi; cum reliquo roſtri colore, ſcil. nigro, concolores in Braſilienſi, quae partium diſcrepantia varietatem tantum, non ſpeciem diverſam conſtituere valent.*

10. TUCANO di Caienna col collare. = *Tucana Cayanenſis torquata* Briſs. ſp. 10. cum optima icone. = *Roſtrata Americana viridans roſtro nigro partim rubro* Barr. Ornith. = *Pica minor roſtro denticulato vario* Barr. Hiſt. = *Ramphaſtos* (*Tucanus*) *roſtro rubro, carina obtuſa alba* Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. = *Corporis craſſitie Merulam ut plurimum aemulatur; viridi-olivaceo colore in univerſum praecipue tingitur; capite, collo, pectore & medio ventre nigro-calybeis; macula ad aures flavo-aurea, collo ſuperiore torque flavo-aurantio cincto; tectricibus caudae inferioribus coccineis; rectricibus ſuperne viridibus, inferne fuſcis, apice caſtaneis; roſtro ſatis conſpicue denticulato; Mandibula ſuperiore exiguo intervallo ad baſim rubra, in reliqua vero longitudine nigra, inferiore vero a baſi uſque ad medium rubra, a medio ad apicem nigra; pedibus plumbeis, unguibus nigris.*

11. TUCANO giallo. = *Tucana lutea* Briſs. ſp. 11. *Xochitenacatl* Ionſt. & Charlet. = *Alia Xochitenacatl* Nieremberg. & Willugh. = *Magnitudine & craſſitie Columbam adaequat. Dilute lutea eſt, taenia utrinque longitudinali a roſtro ad pectus uſque nigra; rectricibus alarum ſuperioribus minimis luteis; rectricibus albo & nigro variis; roſtro nigro, pedibus fuſcis, unguibus vero ex albo nonnihil luteſcentibus. Habitat in Mexico.*

12. TUCANO blù. = *Tucana caerulea* Briſs. ſp. 12. = *Pica Breſſilica ſecunda* Aldrov. = *Pica Xochitenacatl dicta* Ionſt. = *Altera Xochitenacatl* Nieremberg. & Fernand. = *Magnitudine & craſſitie cum praecedente convenit; in toto corpore caeruleo & cinereo variegatur; oculi ſunt nigri; ipſorum irides ex luteo rubeſcentes; mandibula ſuperior lutea, inferior vero ſubnigra, & in purpureum colorem vergens. Habitat in Mexico, ubi* Xochitenacatl *appellatur, ibique Maris littora frequentat, & Piſcibus victitat.*

T. CCV. B. -- 10. --

UPPUPA volgarmente BUBBOLA, e in qualche luogo d'Italia detta anco Galletto di Marzo, e Galletto di Maggio. — *Upupa* Geſn. Aldrov. Ionſt. Willugh. Rai. Schwench. Charl. Sibbald. Rzac. Friſch. Moehr. Klein. — *Upupa; Epops* Geſn. — *Upupa varia, criſta rufa, in ſummo nigra* Barr. Ornith. — *Upupa Plinii; Gallus lutoſus; Gallinaceus ſtercorarius* Rzac. — *Upupa* [*Epops*] *criſtata variegata* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Hupe; Purput; Lupoge; Puput.* — Angl. *Hoop; Hoopoop.*

UGuaglia in groſſezza quaſi la *Merla*, o il *Tordo*, e ſuol peſare tre once. La ſua lingua è cortiſſima, e ripoſta aſſai indentro, non appuntata, e non intagliata, ma di forma triangolare. Si ciba di vermi, formiche, bruci, e altri inſetti. Mangia pure avidamente diverſe bacche di alberi, e ſull' entrare dell' Autunno ſi ſazia d' uva, come oſſervarono diverſi degli antichi, e fra gli Autori noſtri Italiani l' Olina, il quale anco ci ha laſciato ſcritto, che partoriſce tre o quattro uova nelle buche degli alberi, o delle muraglie, le quali ſecondo l' Ionſton ſono ſimili a quelle di *Pernice*, ſebbene più piccole, più dure, e alla viſta più brutte. Il Willughby vedde delle *Bubbole* in quantità preſſo Colonia, e in altri luoghi della Germania ſuperiore. Il Turnero aveva detto, che queſt' Uccello non trovavaſi punto in Inghilterra; ma ciò non è vero, perchè in Northumberland, e nel territorio di Surrey alcune volte ſi vede, per quanto almeno fu riferito al medeſimo Willughby, e da oſſervatori degni di fede.

Ariſtotele, e Olao Magno aſſeriſcono che incroſta il nido con lo ſterco, e particolarmente con l' umano, in vece di ſervirſi di terra, e che ciò faccia per allontanare col fetore di eſſo, o gli uomini, o gli animali velenoſi. Aſſai di rado poſa ſu gli alberi, ma quaſi ſempre in terra, ſpecialmente dove ſono immondezze. Ha la *Bubbola* un volo molto tardo, e vola a ſalti. Una gran parte dell' anno ſtà celato nelle buche degli alberi, e in altri naſcondigli, e perciò nella Primavera compariſce ſpelato.

Per aſſerzione del Sig. Linneo trovaſi anco ne' boſchi della Svezia, dove per oſſervazione dello ſteſſo depone nelle buche degli alberi due ſole uova di color cenerino. Con la voce pronunzia quaſi il nome che ha, cioè *bu bu*, ovvero *pu pu*, per la qual coſa facilmente ſi diſtingue dagli altri Uccelli. Vogliono alcuni, che nell' Eſtate canti alquanto diverſamente dall' Inverno; ſe produce una ſpecie di gemito indica

piog-

* *CRaſſitie* Merulam *circiter, vel* Turdum *aequat, penditque uncias tres circiter. Lingua huic breviſſima in profundo latitans, obtuſa, integerrima, triquetra. Vermibus, Formicis, Erucis, aliiſque inſectis veſcitur. Uvis etiam, aliiſque baccis ſub Autumno eam ſe ſaturare tradiderunt veteres, obſervavitque inter Italos Auctores Olina, qui eandem ova tria, quatuorve in arborum, murorumque cryptis parere ſcripſit, quae* Perdicum *ſimilia, ſed minora, duriora, & aſpectu deformiora dixerat Ionſtonus. Circa Coloniam & alibi in Germania ſuperiore frequentes* Upupas *obſervavit Willughbeius; Turnerus in tota Britannia nuſquam reperiri hanc Avem dixit; verum falſum hoc eſt, nam in Northumbria, & agro Surreiano interdum cerni ab idoneis teſtibus memorato Willughbeio relatum fuit.*

Ariſtoteles, & Olaus Magnus nidum, luti vice, ſtercore humano potiſſimum, circumlinire teſtantur, ſeu ut intolerabili odoris foeditate homines ab eodem fuget, ſeu ne venenata ad eundem animalia accedant. Rarius arboribus inſidet, ſaepius in terra, maxime ubi immundities eſt. Lente admodum volat atque interrupte. Plurimo anni tempore in montium anguſtiis, & arborum cavis locis latitat; ideo Verno tempore deplumis conſpici ſolet.

Teſte Linnaeo in Sveciae etiam vaſtiſſimis ſylvis habitat, cuius Auctoris teſtimonio ova duo in cavis arboribus ponit cinerea. Sono proprium quaſi nomen recitat, ſcilicet bu bu, *vel* pu pu, *unde facile dignoſcitur. Vox vero per Aeſtatem, ut aſſerunt quidam, ab illa quam per Hyemem edit diverſa eſt; ſi gemit pluviam,*

ſi

piogga ; ſe alza la voce indica eſservi nella macchia vicina la Volpe ; ſe canta avanti la ſtagione delle viti , vogliono , che ſignifichi abbondanza di vino ; ma per i contadini Svedeſi è augurio di Guerra . Grand' uſo è ſtato fatto di eſsa in medicina , particolarmente dagli antichi , e dagli Arabi , ma circa a queſte ſue mediche virtù , credo ſenza errore di poter dire che ſieno tutte favole . Si dice che la femmina ſia ſempre più grande del maſchio . Per teſtimonianza dell' Olina vive da tre anni o poco più . Da queſto autore ſi può apprendere la maniera di farla campare , e ſuſſiſtere in gabbia .

Nel manoſcritto di queſt' Ornitologia trovanſi regiſtrate alcune oſſervazioni del Sig. Marcheſe Giovanni Gerini , ſtimate non diſpregevoli , e perciò ſi ſono quì aggiunte , e ſono le ſeguenti .

La *Bubbola* ſi vede in Toſcana ſulla fine di Aprile , e tra l' Agoſto e il Settembre ſpariſce , paſsando forſe in altri paeſi . Cova due , e tre volte all' anno facendo quattro , o cinque uova , e alcuna volta anco ſei , ponendo il ſuo nido nelle buche degli alberi , o delle fabbriche deſolate , e intonacandolo internamente di ſterco di Vacca . Queſto medeſimo Illuſtriſsimo ed eſattiſſimo oſservatore delle coſe attenenti all' Iſtoria degli Uccelli vedde pure nel noſtro mercato una *Bubbola* con le penne che formano la ſua creſta colorite in cima di celeſte pieno , e un' altra volta tornò a vedere una *Bubbola* ſimile a queſta nelle Alpi del Mugello preſſo a Ronta . Queſta pure nell' originale trovaſi dipinta , ma per non allungarci poco neceſsariamente l' abbiamo laſciata .

ſi clamat Vulpem in vepretis haerere indicat ; ſi ante vitium tempus canit , inſignem vini copiam praenunciare tradunt ; Sveciae Ruſticis vero Bellonae omen evadit . Magnum in medicina uſum obtinuit , praecipue apud veteres & Arabes , verum quae de facultatibus eiuſdem medicis adducuntur , fabulas eſſe omnes non dubito . Foeminam mare maiorem ſemper eſſe aiunt . Olina teſte tres circiter annos vivit . Ab hoc ipſo Auctore norma , qua in cavea enutriri poteſt , deſcribitur .

In MS. noſtrae Ornithologiae obſervationes nonnullae a Marchione Io. Gerinio inſtitutae , ac commemoratione non indignae recenſentur , quas hic tradere nemini iniucundas fore arbitrati ſumus , & quae ſequuntur ſunt .

Upupa *in Etruria exeunte Aprile adparet , & inter Auguſti , ac Septembris menſes ab hominum conſpectu ſe ſe ſubtrahit , alias forte Regiones quaerens ; bis , terque in anno ova parit numero quatuor , quinque , ac interdum ſex , nido in cavis arboribus , murorumque deſertorum , aedificiorum foraminibus adcomodato , ac ſtercore Bubulo circumlinito . Illuſtriſſimus idem & accuratiſſimus Ornithologus aliam huius ſpeciei Avem in foro huius Civitatis obſervavit , quae pulcherrima inſtruebatur criſta , pennis in ſummitate intenſe caeruleis , quam varietatem & iterum in Alpibus noſtris Mugellanis circa Oppidum vulgo Ronta vidit . Haec pariter in Codice autographo depicta eſt , ſed brevitatis laudabilioris gratia a nobis ſupprimitur .*

T. CCVI. B. — 10. —

UPPUPA, o BUBBOLA Americana gialla . — *Upupa Americana lutea* . — *Upupa crocea* Linn. Syſt. Nat. edit. 6. gen. 45. ſp. 2. quae in edit. 10. deeſt . — *Upupa Americana , crocea , ſaxatilis* Barr. Ornith. — *Gallus ferus , ſaxatilis , croceus , criſtam e plumis conſtructam gerens* Barr. Hiſt. — *Rupicola* Briſs. T. IV. gen. 55. pag. 437. — Gall. *Le Coq-de Roche* . — Angl. *Widdehop ; Hoopoe Hen* .

PEr ragione del becco corto , groſſo , e verſo la cima lateralmente compreſſo , e non lungo , nè ſottile e alquanto inarcato , come nella ſpecie antecedente , ſi deve queſta rimuovere dal genere di *Bubbola* , e col Briſſon riportare ad un genere diſtinto , quale è quello di *Rupaiola* . Il Briſſon la diſſe latinamente *Rupicola* dall' abitare eſsa nelle rupi de' monti . Per queſta medeſima ragione altri l' avevano chiamata *Galletto ſalvatico* , e *ſaſſaiolo* . In groſſezza uguaglia un *Piccion groſſo* . Trovaſi al Surinam , e per tutta la Guiana . Linneo cita alcune altre ſpecie di *Bubbola* , quali ſono le appreſſo ,

ROſtro brevi craſso verſus apicem lateraliter compreſſo , nec ut in ſuperiori ſpecie longo , gracili , ac parum arcuato , revera ab Upupae *genere diſiungenda haec Avis videtur , & cum Briſſonio ad aliud diſtinctum genus , nempe ad* Rupicolam *reducenda . Ob habitationem eius in rupibus optime* Rupicolae *nomen a Briſſonio inditum huic fuit . Hac ipſa eademque ratione alii ipſam* Gallum ferum , & ſaxatilem *appellarunt . Craſſitie cum* Columba Romana *convenit . In Surinama , & Guiana tota habitat . Linnaeus alias* Upupae *ſpecies habet , & quae ſequuntur ſunt* .

3. Uppupa, o Bubbola di Paradiso. *Upupa [Paradisea] rectricibus duabus longissimis* Linn. Syst. Nat. sp. 2. = *Avis Paradisiaca Manucodiata cristata Orientalis* Seb. = *Upupa Manucodiata* Klein. = *Cauda mediocri donatur, sed ex uropygio procedunt super caudam duae fulvae pennae, trunco Avis quadruplo longiores, unde Paradisiaca appellata fuit. In capite cristam amplam gerit cum collo coracini coloris; dorso fulvo; ventre cinereo; rostro pedibusque plumbeis. Habitat in Asia.*

4. Uppupa, o Bubbola Eremita. *Upupa [Eremita] viridis, capite flavo, cervice iubata* Linn. Syst. Nat. sp. 3. = *Hanc inter* Coracias *descripsimus num. 7. pag. 40. ideoque ibidem, quae de hac Ave observanda sunt, videnda.*

5. Uppupa, o Bubbola, detta Pirrocorace = *Upupa (Pyrrhocorax) atra, rostro pedibusque rubris* Linn. Syst. Nat. sp. 4. = *Hanc quoque ad* Coraciam *reduximus, ideoque eius varia nomina & qualitates videri possunt pag. 37. Tab. CXLIX.*

T. CCVII. B. 1. 4. --

GALLO comune, o domestico. — *Gallus vulgaris, sive Gallus Gallinaceus* Gesn. Ionst. Carleth. — *Gallus domesticus* Schwen. & Briss. sp. 1. — *Gallus versicolor vulgaris* Barr. Ornith. — *Gallus cauda erecta, crista carnea* Brown. — *Ales lucis Martialis* — *Ales praenuncia lucis Ovidii.* — *Phasianus (Gallus) cauda compressa adscendente* Linn. Syst. Nat. gen. 90. sp. 1. — Gall. *Coq; Gau; Geau; Gal; Gog; Poule commune.* — Angl. *Cok; Dunghill-Cock; Huse.Cock; Roost Cock.*

Gli Uccelli di questa Famiglia hanno il becco corto, forte, e alquanto curvo per raccorre comodamente i granelli de' quali in specie sogliono cibarsi; il corpo grosso, e molto carnoso; le ale corte, e concave, per la qual cosa non volano molto alto, nè molto lontano; il ventricolo armato di robusti muscoli per triturare i granelli anco durissimi, specialmente con l' aiuto di qualche sassuolo, che sogliono per tale effetto ingoiare; l' intestino ceco lunghissimo; la carne di color bianco, particolarmente quella del petto, e più che mai quando è cotta. Questa proprietà è affatto particolare agli Uccelli di questa Famiglia, e ciò significa esser la loro carne molto sana, e d' ottimo sugo.

Partoriscono moltissime volte. Nidificano in piana terra, e ciò nasce dal non essere alimentati dalla madre, ma bensì tostochè sono nati, dall' essere in stato di lasciare il nido, e seguitando dovunque la madre, di beccare, e alimentarsi da se stessi. Essendo poi questi per quanto si è detto corpulenti, nè molto atti al volo, si cibano passeggiando, e beccando sul terreno, e però hanno le dita larghe, mediante le quali meglio si sostengono, e corrono vigorosamente. La maggior parte, se non tutti, usano aspergersi di polvere. Non a tutte le specie di questa Famiglia, ma bensì al solo genere del *Gallo* la natura ha conceduto gli sproni.

Il Willughby distinse gli Uccelli di questa Famiglia in mansueti, o domestici, e in fieri, o salvatici; questi poi in quelli, che trovansi corredati del dito di dietro, come il *Fagiano*, e in quelli, che ne sono senza, come l' *Otarda*; finalmente distinse quelli corredati del dito posteriore, in granivori, e in erbivori, o baccivori, i quali possono essere distinti da un contrassegno anco più manifesto, come è quello d' avere i sopraccigli rossi, o cremisi. Il resto si troverà citato più a basso.

Gallinaceae Familiae Aves rostrum habent breve, validum, & nonnihil incurvum ad grana colligenda, quibus praecipue victitant, perquam idoneum; corpus crassum carne multa; alas breves, & concavas, quapropter altivolae non sunt, brevesque volatus faciunt; ventriculum crassis musculis instructum, quorum actio est grana duriora comminuere, calculorum adminiculo, quos hae Aves subinde deglutiunt; intestina caeca longissima; carnem albam, praecipue musculorum pectoris, qui color a coctione se prodit manifestius. Haec nota huic Avium familiae peculiaris est, quod indicium praebet carnem earum saluberrimam esse & optimi succi.

Multiparae sunt. Huni nidificant, cuius & ratio est, quia Pulli recens excluſi non aluntur a matribus, verum nidum deserunt, huc illuc cursitantes matres sequuntur, atque ipsi seipsos pascunt, cibum rostellis colligentes. Quoniam ut diximus corpulentae sunt Aves, nec admodum volaces, in terra plerumque obambulantes vescuntur, atque ideo latos obtinent digitos ad ei firmius insistendum, & plerumque etiam cursu valent. Pulveratrices sunt pleraeque, si non omnes. Gallinaceo generi soli, non omnibus aliis huius familiae speciebus calcaria conceduntur.

Aves hasce distinxit Willughbeius in mansuetas seu domesticas, & feras seu sylvestres; sylvestres ulterius in postico digito donatas, ut Phasianus, *& postico digito carentes ut* Tarda; *denique postico digito donatas in granivoras & phytivoras seu bacciferas, aut certiori nota superciliis rubris coccineisve insignes. Reliqua vide infra.*

T. CCVIII. B. 1. 8. –

GALLO con la creſta a paniera. — *Gallus Gallinaceus criſta in calathi modum efformata.*

TUtte le ſpecie di *Gallo* domeſtico, o ſia di *Gallina*, non ſono ſpecie reali, ma piuttoſto varietà; imperocchè tutte quelle differenze, per le quali ſi vedono gli uni differire dagli altri, ſi trovano alcuna volta riunite in un ſolo individuo. In queſto genere di Uccello la coda è di una forma particolare, dimanierachè ella potrebb' eſsere un ſufficientiſſimo carattere per diſtinguerlo da tutti gli altri generi, quando una ſimile ſtruttura ſi trovaſse coſtantemente in tutte quante le ſpecie, ma vi è qualche *Gallo*, che non ha punta coda.

Queſta coda, che vien portata ſempre alta, è compoſta da 14. penne, delle quali 7. ſono inclinate per un verſo, e 7. per l' altro in maniera che fra di loro formano un angolo molto acuto; una tal direzione di penne caudali è totalmente particolare agli Uccelli di queſto genere, e non trovaſi in altro genere finora conoſciuto. I *Galli* hanno le ali corte, e che non oltrepaſsano l' attaccatura della coda. I maſchi hanno in ciaſchedun piede uno ſprone, che non di rado diviene molto lungo e acuto. Il *Gallo* ſi può certamente dire l' orologio de' contadini, il maeſtro di tutti gli uomini, il modello de' Principi nel governare, l' immagine di un vero padre di famiglia, un valoroſo militare.

OMnes Galli, & Gallinae *domeſticae ſpecies non ſunt verae ſpecies, ſed potius varietates; omnes enim differentiae, quibus aliae ab aliis diſcrepant, quandoque in uno eodemque individuo ſimul coeunt. Cauda in hoc genere Avium ſingularem formam obtinet, quae caudae forma ad hoc genus ab omnibus aliis diſtinguendum omnino ſufficeret, ſi omnes huius ſpecies eſſent caudatae, ſed aliqua ex his cauda prorſus caret.*

Cauda, quam geſtant erectam, quatuordecim conſtat rectricibus, ſeptem in unum latus, ſeptem in alterum inclinatis, & ita diſpoſitis, ut inter ſe angulum acutum efforment, quae rectricum directio huius generis Avibus peculiaris eſt, & nulli alteri Avi notae convenit. Alis donantur brevibus, & caudae exortum non excedentibus. Mares in utroque pede calcari donantur quandoque longiſſimo & acutiſſimo. Gallus *equidem Agricolarum horologium, hominum magiſter, Principum in regendo exemplar, patris familiae exactiſſima imago, ac ſtrenuus miles merito dici poteſt.*

T. CCIX. B. $\frac{1}{1}$ $\frac{10.}{5.}$

GALLO Padovano. — *Gallus Patavinus* Aldrov. & Briſs. — *Gallus criſtatus* Barr. — *Gallus maior exoticus* Schnweck. — Gall. *Poule de Caux*.

I *Galli*, e le *Galline*, che ſi dicono Padovane, vengono propriamente da Polverara Borgo diſtante poche miglia da Padova. Queſte non differiſcono dalle noſtrali, che nella grandezza, e nel color delle penne più vago; e quando ſieno altrove portate inſenſibilmente degenerano e riduconſi alla grandezza delle comuni, s' intende ſempre la loro figliuolanza, non già quelle ſtate di là traſportate.

Il *Gallo* ſolamente fra gli Uccelli diurni, toltone il *Ruſignuolo*, canta di notte, cioè dopo la mezza notte due o tre volte avanti il far del giorno, a diverſe diſtanze. Il Klein lo chiama *Alector*, perchè ci riſveglia, e ci fa alzare dal letto.

GAlli, *ſive* Gallinae, *quae Patavinae dicuntur*, e *Pulverara vico aliquot milliaribus a Patavio diſtante, mittuntur. Hae vulgaribus maiores tantum ſunt & ſpecioſiores, & ſi in alias regiones transferantur, degenerant paulatim, & ad indigenarum magnitudinem brevi contrahuntur; earum vero progeniem, non ipſas translatas intellige.*

Gallus Gallinaceus *e diurnis Avibus ſolus, ſi* Philomelam *excipias, internoctu cantat, poſt mediam ſcilicet noctem, duabus tribuſve vicibus per intervalla ante lucis ortum. A Kleinio dicitur* Alector, *quia nos a lecto reſuſcitat.*

T. CCX. $\frac{1}{1}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{2}{-}$

GALLINA Padovana barbuta. — *Gallina Patavina barbigera. Gallina magna Longobardica, vel Italica quorumdam.*

QUelle *Galline*, che quaſi tutto l' anno, e quaſi ogni giorno fanno l' uovo, come fra le

GAllinae *quae per maximam anni partem ac dietim plerumque ova edunt, ut Patavinae, in-*

le altre ſono le Padovane, non durano però lungo tempo in ſimile fecondità, ma dopo tre anni, o quattro al più, ſi riducono ſterili, perchè venendo loro a cadere dal fondo dell' ovaia tutti i principj dell' uova, che in origine ſi erano generati, e non formandoſene di nuovo, ceſſano di partorire.

L' età di queſti animali non è certa, quantunque l' Aldrovando la ſtabiliſca di dieci anni. Non ſi tengono dagli uomini che per frutto e guadagno, e ſiccome le *Galline* divengono ſterili aſsai preſto, ed i *Galli* con gli anni diventano poco buoni a mangiarſi, perciò non ſon laſciati invecchiare. Quella grand' età che da alcuni viene a' *Galli* attribuita la credo favoloſa, imperocchè in queſto genere d' animale, deſiſtendo la *Gallina* tanto preſto, come ſi è detto, dal partorire, e il *Gallo* ſnervandoſi per la ſalacità, e intemperanza venerea, che ſicuramente deve debilitarlo, ſono argomenti da far credere, che ſenz' altro debbano tali animali invecchiar preſto, e vivere non troppo lungamente.

La deſcrizione, e anatomia dell' ovaia delle *Galline*, e delle altre parti inſervienti alla generazione, ſiccome l' iſtoria della generazione, dell' eſcluſione, e cova dell' uova, ſi può diſteſamente vedere nell' Aldrovando, nel Geſnero, nell' Arveo, nel Malpighi, e in altri ancora.

Dell' allevar poi e mantenere queſti Uccelli, per quanto riguarda l' economia, e l' utile, che può ricavarſene, ne ha di corto e minutamente parlato il noſtro Sig. Abate Bonfanti in un libro da noi ſtato citato nel Catalogo degli Autori nel ſupplemento di eſſi poſto alla fine.

inter alias ſunt, tot partubus non diu ſufficiunt, ſed poſt tres quatuorve plurimum annos ſteriles & effoetae fiunt: delapſis enim quae ovario ab initio inerant ovorum rudimentis, parere deſinat neceſſe eſt, cum nova intus non ſuboriantur.

Quamdiu vivant hae Aves non conſtant, quamvis Aldrovandus decennio earum aetatem circumſcribat. Emolumenti enim cauſſa tantum aluntur, & cum intra paucos annos ad generationem ineptae foeminae evadant, & mares valde carne deteriores fiant, ab hominibus diutius non aluntur. Aetatem quam Gallis *nonnulli longiſſimam tribuunt, fabuloſam arbitror, nam in ſuo genere* Gallina *cum admodum cito, ut diximus, effoeta fiat,* Gallus *vero a ſalacitate, & veneris intemperantia, quae corpus, vireſque enervant, debilitetur, ſollicitam ut expediant hae Aves ſenectutem recte arguitur.*

Ovarii, & reliquarum partium generationi in Gallinis *inſervientium anatome & deſcriptio, pariterque de generatione, incubatu, & ovorum excluſione exactiſſima hiſtoria habebitur apud Aldrovandum, Geſnerum, Harveum, Malpighium, alioſque.*

De harum autem cuſtodia, atque utilitate in domeſtica oeconomia, nuperrime & abunde ſcripſit apud nos Dom. Abbas Bonfanti, cuius libri notitiam in Auctorum Catalogo prope finem, ſive in ſupplemento, adiecimus.

Si omnia, quae de Ave hac dicta ſunt, & a praecipuis Auctoribus indicantur, perſtringere voluiſſemus, Lectores certo certius, cum plurima praecipue nota omnibus ſint, taedio nimium afficeremus; ideoque nonnulla tantum, atque ſeparatim, in ſequentibus deſcribemus.

Se aveſſimo voluto raccorre, e ammaſsare quanto di queſti Uccelli vien raccontato, o detto dagli Autori, certamente avremmo molto tediato i Lettori, tanto più che la maggior parte delle coſe, che avremmo potuto dire, è già nota univerſalmente, perciò ſe ne toccheranno ſoltanto alcune, e alla ſtaccata negli articoli che ne ſuccederanno.

T. CCXI. B. 1. 2. —

GALLINA detta la vergognoſa. — *Gallina verecunda dicta.*

SI dice queſta vergognoſa a motivo di quella gran creſta che le pende dal capo, e le ricuopre la fronte, e gli occhi. Il primo Autore di queſta Raccolta trovò molte di queſte *Galline* in Romagna, e benchè aveſſero gli occhi coperti dalla ſpazioſa creſta, oſservò che mediante la loro induſtria nel portare il capo, e nel camminare, arrivavano a veder molto bene. Queſta pure deve dirſi mera varietà, e non ſpecie.

Della maniera di nutrire le *Galline*, i Gal-

VErecunda haec dicitur a magna & propendente criſta, quae huic frontem & oculos tegit. Ornithologiae noſtrae primus Auctor harum copiam per Romandiolae pagos, & rura obſervaverat, quae licet magna criſta oculos omnino tectos habuiſſent, recte admodum adhibita induſtria, peculiari inceſſu, & capitis geſtatione oculis utebantur. Mera & haec varietas non ſpecies dicenda eſt.

Da Gallinarum, Gallorum, & Caponum vi-

Galli, e i *Capponi*, non occorre che molto ne parliamo, essendo cosa alla scienza di tutti; e i precetti, che appartener possono all' ingrassamento loro, spettano piuttosto che a quest' opera ad un Trattato d' Economia. Avidamente si cibano d' Uva, e di Fichi, ma con loro danno, imperocchè le *Galline* cessano di far uova, e i Polli tutti si ammalano di pituita, o pipita. Faranno bensì le *Galline* molte uova se si darà loro del seme di Canapa, e più grosse ancora le faranno dandole dell' Orzo mezzo cotto, o seme di Nasturzio impastato con Crusca e Vino; per ingrassarle poi ottimo è il Grano cotto nell' acqua, siccome il Gran Siciliano, il Miglio, il Panico, l' Orzo, la Vena, e tutte quante le civaie, e molto ancora si loda il Citiso.

Vien costantemente creduto che le uova lunghe e acute sieno atte a produrre delle Pollastre, e che quelle che sono più tonde, o ottuse in quella parte, nella quale sogliono esser più acute, portino de' maschi. L' ingegno ha superato la natura, dice l' Ionston, imperocchè avrai sempre delle Pollastre, se porrai a covare delle uova che sieno nate a Luna piena. Si assegnano di cova fino al nascimento de' Pulcini giorni 21. dalla maggior parte degli osservatori, ma di qual cosa si abbrevia tal tempo, se l' aria sarà tiepida. Principiansi a porre le uova terminato l' Inverno, e ne' luoghi d' aria più temperata e molto fecondi a' primi anco di Gennaio. Migliore fra tutte è la covatura avanti l' Equinozio di Primavera; quelle che nascono dopo il Solstizio non producono tanto frutto, o Polli sì grossi, e sempre peggio vanno le covature, quanto più tardi saranno poste.

Nascono i Pulcini non tanto mediante la covatura delle *Galline*, ma con arte ancora senza di esse, con porre l' uova dentro il concio, o come si usa in Egitto tenendole per alcuni giorni in certi fornelli; ma di questo metodo se ne parlerà sotto la Tav. e num. CCXXXII. poichè questo artifizio può egualmente servire per far nascere tutte quante le uova, specialmente d' Uccelli domestici,

victu non est quod multa dicamus, cum notissima omnibus res sit, maximeque praecepta has Aves saginandi ad oeconomiam pertineant. Uvis & Ficubus impense, sed infeliciter vescuntur, steriles enim Gallinae *evadunt, & pituitosae omnes fiunt. Si semen Cannabis apposueris numerosorum ovorum partu gaudebunt, si vero Hordeum semicoctum, vel Nasturtii semen cum Furfure & Vino subactum exhibueris, maiora deponent; ad saginandum Triticum cum aqua coctum, potu interdicto, tum Mays, Milium, Panicum, Hordeum, Avena, Legumina omnia, atque Cytisus maxime laudantur.*

Gallinarum *ova oblonga & acuta excludere foeminas fertur, quae vero obtusa vel rotundae in ea parte sunt, quae acutior esse solet, mares. Auxit naturae dotes ingenium, inquit Ionstonus, nam foeminas habueris, si Luna plena nata supposueris. Dies ter septem exclusioni adscripserunt plurimi; minuuntur vero si tepidus aer accesserit. Confecta bruma poni incipiunt; circa Calendas Ianuarii etiam locis tepidioribus, & foecundissimis. Optima foetura ante Aequinoctium Vernum editur, post Solstitium nata, magnitudinem non implet, tantoque minus, quanto serius educitur.*

Excluduntur etiam Pulli absque Gallinarum *incubatu artificioso hominum industria adhibito fotu; collectis scilicet turmatim in terra ovis, & fimo infra supraque tectis, vel in fornacibus, ut in Aegypto mos est, ad plures dies detentis; sed de hac methodo sub Tab. & num.* CCXXXII. *cum ad omnia domesticarum praecipue Avium ova extendi aeque haec possit sermonem habebimus.*

T. CCXII. B. I. 4. –

GALLO calzato. — *Gallus pedibus hirsutis, sive pedibus plumosis.* — *Gallus plumipes* Briss. — Gall. *Le Coq patu.*

ANco in questa sorte d' Uccelli se ne danno alcuni tanto maschi, che femmine, con i piedi vestiti di piume, come è l' effigiato in questa Tavola. La femmina suol essere in tutto il corpo di color più giallognola del maschio, e suol avere la cresta piccola, i bargigli più corti, e il becco con i piedi gialli.

Tra i mali a' quali sogliono esser soggetti i Polli, uno è la Pipita, o catarro del capo, e l' altro il morbo pedicolare, o sieno i pollini, che sono per essi infestissimi mali.

SUnt quoque in hoc Avium genere pedibus quandoque hirsutis, quales sunt, quos damus, Gallus & Gallina. Gallina *vero in toto corpore flavescere plus minus solet, cristamque minimam gerere, paleas pariter breves, rostrum, & pedes luteos.*

Inter affectus corporis quibus Gallinaceum *genus infestatur, Pituita, sive Coryza, quae ipsis peculiaris ac inimicissima est, & ptiriasis, seu*

La Pituita, volgarmente Pipita è un umore, che

che procede in esi dal cervello, e attacca le narici, le fauci, e la lingua togliendo loro l' appetito, e la facoltà ancora sì di bere, che di mangiare. Il Palladio caratterizza questa malattia per una membrana bianca che involge la lingua, non senza pericolo alcuna volta di morte. La lingua divien loro dura, e restano molto danneggiate tutte le funzioni di essa, e delle parti contigue. Si vuole che nasca dall' impura bevanda; e per asserzione di Columella ciò accade specialmente allorchè è freddo, e manchino di cibo. Perchè restino esenti da questo male si dia loro a bere acqua limpidissima. Leontino macerava dell' Origano nell' acqua, che dava loro a bere. Columella poi vuole, che si profumino i Pollai, e ogni tanto si ripulischino da tutti gli escrementi.

Il costume praticato comunemente di trapassare una penna per i fori del naso, e giornalmente smuoverla, piuttosto serve a cagionar loro la morte. Molti sono i rimedj prescritti dagli Autori per questa malattia, e fra gli altri dall' Aldrovando, che volendo si può sopra di questo consultare. Quando il male abbia preso molto possesso, è d' uopo qualche rimedio assai gagliardo; soprattutto è espediente strappare con le unghie la membrana, e con strumento ancora dar esito a certe suppurazioni, che si formano nelle guance, e intorno gli occhi, e poi con appropriati medicamenti risanar la piaga e la ferita fatta.

Il morbo poi pedicolare, che è l' altro, di cui abbiam sopra fatto parola, consiste nell' empirsi essi di pidocchi, e anco di pulci, e specialmente le *Galline* allorchè covano, la qual malattia produce in esse una gran magrezza, e insensibilmente le consuma, ma è molto più facile dell' altro a medicarsi, anzichè i Polli medesimi, ammaestrati dalla natura, se ne liberano da se stessi coll' aspergersi di polvere. Per altro gli antichi scrittori delle cose della Campagna tanto Greci, che Latini, più rimedj hanno ordinato per questo male. Molti dicono, che si guariscono mediante un' unzione d' olio di Lino; il Palladio prescrive una polvere di Stafisagria, e Comino tostato per egual peso, disciolta con Vino; e quando il male abbia preso possesso nel più folto e interno delle penne, loda il decotto di Lupini.

seu pedicularis morbus, peculiares sunt. Pituita est humor e cerebro in nares, nec non in fauces destillans, edendi, bibendique cupidinem eis auferens linguaeque officiens. Palladius albam pelliculam vocat extremam linguam vestientem: adeo ut saepe periculo non careat id malum, & interimat etiam. Lingua eis indurescit, omnesque ad vitam linguae & vicinarum partium functiones labefactat destruitque. A sordido plerumque oritur potu; atque, teste Columella, quum frigore & cibi penuria laborant. Ut ab hoc malo praeserventur, purissimam illis aquam potandam dato. Leontinus Origanum in aqua macerabat, eamque ita bibendam offerebat. Vult autem Columella Gallinaria fumigari, & ab excrementis aliquoties repurgari.

Penna per transversas nares inserta, ac quotidie mota, ut vulgus facit, plures interficit potius. Remedia plura ad hunc morbum facientia Auctores proponunt, atque inter alios Aldrovandus, quem consule. Cum morbus altas egerit radices fortioribus indiget remediis; membrana unguibus rescindi debet, atque saniei collectiones, quae saepius circa genas & oculos oriuntur, ferro aperiri debent, ac postmodum inflictam plagam ad sanationem perducere aptis remediis oportet.

Ptiriasis morbus alter, de quo superius verba fecimus, illis accidit, quum pediculis, atque pulicibus nimium obruuntur, maximeque Gallinae *quum incubant, qui morbus illas extenuat consumitque. Sed pituita valde facilius curatur, quin imo saepenumero sibi ipsis magistrae eo se pulverando liberant. Ceterum & hoc malo affectis veteres, tum Latini, cum Graeci Geoponici remedia plura praescripsere. Multi linimento Olei e semine Lini facillime curari tradunt: Staphisagriam, & torrefactum Cuminum pari pondere cum Vino contusum Palladius proponit; si vero pennarum secreta penetraverit malum, Lupinorum decoctum laudat.*

Sunt qui proprio experimento edocti Gallinas *arena littorali, aut quod praestantius esse aiunt, cineribus saponariorum a lixivio relictis, si se pulverari permittantur, isto malo ocyus liberari referunt. Varro ab iisdem animalculis praeservatum iri tradit, si in cubilibus cum pepererint, auferatur substramen, & recens aliud subiiciatur. Epilepsia etiam* Galli *laborant, praecipue*

Vi sono alcuni, che instruiti dall' esperienza affermano, che facilmente guariscano se si fanno impolverare con arena marina, e meglio ancora con la cenere de' saponai, che avanza alle loro rannate. Varrone pretende, che si liberino da tali animaletti se finita la cova si tolga subito il letto, o altro loro posatoio, e affatto si rinnuovi. Patiscono ancora d' Epilessia, specialmente i *Capponi*, ma di questa, siccome delle altre malattie, alle quali sono i Polli e

Galli ſoggetti, quelli che abbiano queſta curioſità, potranno reſtar pienamente informati da diverſi Autori, che ne trattano, come fra gli altri è l'Aldrovando, a' quali intendiamo rimettergli.

cipue Capones; *ſed de hoc morbo, aliiſque quibus obnoxii interdum ſunt, plures ſunt Auctores, qui curioſos inſtruere poſſunt, praecipue Aldrovandus, ad quos ipſos mittimus.*

T. CCXIII. B. 1. 3. 1.

GALLO cornuto. — *Gallus cornutus.* — *Gallus cornibus armatus.*

QUello, che in queſta figura è rappreſentato, è totalmente moſtruoſo, e così ridotto per arte degli uomini. Se ſi taglieranno ad un *Gallo* adulto, e fornito di lunghi ſproni, coteſti ſproni, e tagliata la pelle del capo ad un altro *Gallo* giovine, o *Galletto*, accomodati ſieno in tal ferita, e diligentemente legati, per forza di natura gli ſi attaccano, e talmente ſi conſolidano, che formano una continuazione così eſatta di queſto nuovo corpo, come ſe la natura glieli aveſſe accordati dalla naſcita. Gli ſproni adunque in queſta maniera accomodati in capo di un Pollaſtro col creſcer di eſſo, anch' eſſi creſcono, e col tempo vengono a comparire veriſſime corna.

Si crede da molti, che il *Gallo* quando è aſſai vecchio faccia alcuna volta un uovo, e che da queſt' uovo ne naſca un Serpente, ma queſto è dimoſtrato falſo dall' eſperienza. Che poi ſia ciò uno ſpacciato error popolare, e un mero ſogno di alcuni lo prova l' inſufficienza medeſima delle parti, anzi la mancanza totale ne' *Galli* dell' organizzazione a produr ciò neceſſaria. Quantunque vi ſieno degli Autori, i nomi de' quali per riſpetto ſi tacciono che credono, e difendono queſt' uova di *Gallo*, a ſufficienza vien ciò dimoſtrato falſo da diverſe eſperienze, che furono fatte a Montpellier.

CUius picturam hic damus, monſtroſus prorſus eſt, atque hominum arte efformatus. Si Gallo *ſeniori, longioribuſque calcaribus inſtructo calcaria ipſa reſecentur, atque in alterius iunioris pulli vertice, diſciſſa arte & cultri ope prius cute implantentur, ac rite deligentur, naturae viribus adhaerent & adglutinantur ita ut unum ac continuum corpus efficiantur, nec non ut membrum a natura eidem a nativitate impertitum videantur. Hac norma calcaria illa inſerta pro aetate iunioris* Galli, *cui adiuncta ſunt, augmentum capiunt, & vera inde cornua ſimulant.*

Gallum *ad magnam praecipue ſenectutem perventum ovum quandoque parere, atque ex eodem ovo Serpentem ortum ducere aſſerunt quamplurimi, ſed falſum experientia hoc ſatis ſuperque demonſtrat. Hoc autem ut falſum magis magiſque oſtendit ipſa partium in* Gallis *ad ovum generandum inſufficientia, immo abſentia, atque ideo pro vulgatiſſimo errore, & nonnullorum ſomnio haberi id debet. Plures licet Auctores, quorum nomina veneratione tacemus,* Gallorum *ova adprobent defendantque, Monſpelii tamen inſtitutae obſervationes & experientiae fuere, quae contrarium teſtantur, atque demonſtrant.*

T. CCXIV. B. 1. 4. —

GALLO nano. — *Gallus pumilio* Aldrov. — *Gallus pedibus breviſſimis* Briſs. — *Gallus Gallinaceus pumilio* Rai. — Gall. *Le Coq nain.* — Angl. *Creeper.*

LA carne di Pollo, ſpecialmente di Pollaſtro, che non oltrepaſſi l' anno, ovvero di Cappone bene ingraſſato, ha per ſentimento univerſale il primo credito nelle menſe, e non cede punto in bontà al *Fagiano*, nè alla *Pernice*.

Il *Cappone* quantunque non differiſca in ſpecie, non oſtante da alcuni Ornitologi è ſtato deſcritto e dimoſtrato con diſegno ſeparamente. La differenza che cade in eſſo conſiſte nella qualità diverſa della ſua carne, e nel-

CArO Gallinacea, Pulli praeſertim anniculi, aut Caponis *bene ſaginati, omnium fere iudicio primum in cibis dignitatis locum ſibi vindicat, nec* Phaſiani, *aut* Perdicis *carnibus bonitate cedit.*

Capo *licet ſpecie non differat, ſeparatim a nonnullis depictus ac deſcriptus fuit. Differentia, quae intereſt unica, in carnis mutata temperie, & teſticulorum privatione, ob quam propagationi haud idoneus redditus eſt, conſiſtit. Quot enim*

nella mancanza de' genitali, per la quale è inetto alla propagazione. Quante ſpecie e varietà vi poſſono eſſer di *Galli*, tante ve ne poſſono eſſer di *Capponi*; imperocchè tutte quante le varietà de' *Galli* ſi poſſon caſtrare, e per ciò unicamente ridurſi *Capponi*. Non oſtante però ne' *Capponi* le penne del collo, e della coda ſi fanno più lunghe e grandioſe, e qualche volta anco gli ſproni divengono più lunghi che ne' *Galli*, mentre però la voce loro ſi fa più baſſa e roca. Negli uomini caſtrati però ſuccede tutto il contrario, mancando in queſti la barba, e la voce facendoſi più acuta.

I *Galli* ſi caſtrano unicamente per utile della tavola, cioè per la ſquiſitezza della carne, che mediante tale artifizio, e accomodatura mantengono oltrepaſſando ancora la tenera età, ma anzi la perfezionano di più in delicatezza, e ſapore, divenendo più graſſi. Gli antichi caſtravano i *Galli* diverſamente da noi, caſtrandoli con un ferro infuocato, come atteſta Varrone, Columella, e Plinio, e ſi può credere, che non pochi in tale operazione moriſſero, giacchè qualcuno ne muore anco adeſſo, quando qualcoſa venga traſcurata, o sbagliata nell' accomodargli col metodo noſtro. Siccome poi la norma di queſt' acconciatura è notiſſima coſa, ſtimiamo ſuperfluo il farne parola.

enim Gallorum *ſpecies, ſive varietates ſunt, totidem etiam* Caponum *eſſe poſſunt; etenim omnes caſtrari queunt, & ſola ferme caſtratione a* Gallis *differunt*. Caponibus *tamen iuba eſt maior, quam* Gallis, *& caudae pennae longiores, calcaria quoque interdum longiora, vox demiſſior & rauca. Contrarium vero in hominibus caſtratis accidit, cum iis barba non amplius exurgat, voxque acutior fiat.*

Galli *caſtrantur unice ad Menſae uſum propter carnis praeſtantiam, quam tali pacto adcomodati longius ultra primam aetatem ſervant, immo molli & ſapida addita inde pinguedine adaugent. Apud antiquos* Galli *longe alio modo, quam nunc caſtrabantur, nempe candenti ferro, ut meminit Varro, Columella, & Plinius inurebantur; ſuſpicari autem licet multos antiquitus ex inflicto illo vulnere cum candente ferro interiiſſe, uti quandoque aliqui ex noſtris moriuntur, ſi erratum aliquod in caſtratione contingat. Hodierna caſtratio, ut notiſſima, mulierculis etiam, relinquitur.*

T. CCXV. B. 1. 6. 2.

GALLO ricciuto. — *Gallus cincinnatus*. — *Gallus plumis criſpis* Barr. —. *Gallus Gallinaceus criſpus* Will. — *Gallus criſpus* Briſs. & Linn. Syſt. nat. — Gall. *Le Coq friſè*.

LA *Gallina* di Friſlandia citata dal Willughby ſi deve conſiderare per una varietà di queſta ſpecie, e ſi chiama di Friſlandia non perchè da tal Regno ſia in origine a noi venuta, ma per eſſerſi alcuni dati a credere nel vederla di piuma aſſai creſpa, poter eſſer nativa d' un paeſe aſſai freddo qual è la Friſlandia, e che l' effetto dell' increſpatura, e arricciatura delle ſue penne proceda unicamente dall' orrido freddo di quelle contrade.

La propenſione, che hanno i *Galli* nel combattere fra loro, è notiſſima coſa. Gl' Ingleſi ſpecialmente mediante una particolar maniera di cibargli, e d' inſtruirgli ſi occupano in ciò con mirabil riuſcita. Di queſti combattimenti molti ne accadono nelle maggiori Terre, non in giorni fiſſi, ma ſecondo le occaſioni, e ſecondo che vien ſtabilito da' padroni de' *Galli*. Per tal coſa ancora ſi alzano eſpreſſamente de' Teatri ſopra de' quali ſi eſeguiſcono tali ſpettacoli, a oſſervare i quali concorre da ogni parte gente infinita, e vi ſuccedono ancora grandi ſcommeſſe.

I *Galli*, che più degli altri ſono animoſi non cedono mai, ma vogliono piuttoſto reſtar morti, che darſi per vinti.

GAllina *Friſlandica Willughbeii ad varietatem hanc reduci debet, diciturque Friſlandica, non quia e Friſlandia ad nos primum certe delata fuerit, ſed quia nonnulli probabili argumento ſibi perſuaſerunt Friſlandicae eam originis eſſe, quod ſcilicet plumae frigoris vehementia per totum corpus inhorreſcentes hoc modo criſpatae videantur.*

Gallorum *pugnacitas nulli ignota eſt. Ab Anglis praecipue ad pugnam diligenti cura & exacta victus ratione ali & praeparari ſolent. Sunt autem frequentia per Oppida maiora, non ſtatutis diebus, ſed pro re nata indicta Gallorum certamina, quandocunque ſcilicet voluerint, vel inter ſe conſenſerint, qui* Gallos *alunt. Quin etiam Theatra paſſim extructa ſunt, in quibus exhibeantur huiuſmodi ſpectacula, ad quae magno numero undique concurritur. Sporſiones deinde utrinque fiunt ingentis non raro pretii.*

Galli *generoſiores cedere neſciunt, & mori quam vinci, aut ignominioſa fuga ſibi conſulere malunt.*

T. CCXVI. B. — 15. —

GALLO ſcherzoſo. — *Gallus naturae luſus.*

SOpra ogni altro genere d' Uccelli ſcherza, e varia in moſtruoſità il *Gallo*. Voglio tacere la *Gallina* petrificata, e con le penne forti come l' Iſtrice, ſtata trovata fra due muraglie, e dall' Aldrovando deſcritta, ſiccome quel *Gallo* ſtato oſservato dal medeſimo Autore in Toſcana alla Corte del Granduca Franceſco de' Medici, nel quale, oltre una particolar diſpoſizione, e conformazione, tanto di penne, che di parti, era oſſervabile una lunga coda a forma appunto de' quadrupedi. Voglio parimente tacere tutte quelle moſtruoſità d' individui, che ſono corredati di tre, o cinque piedi, o di due corpi, o più teſte, come accade alcuna volta ne' feti umani. Coſe tali ſuccedendo aſſai di rado, e da molti non eſsendo anco credute, perciò non appartengono a queſta Iſtoria voluta breve, e veritiera.

Per queſta medeſima ragione ſi tralaſciano più altre coſe attenenti all' indole de' *Galli*, ed agli uſi, e facoltà, ſpecialmente mediche, delle *Galline*, e delle uova, ſiccome nulla abbiamo creduto dover toccare dell' uſo loro relativamente alla religione, ai preſagi, ai prodigi, ai ſimboli, o miſteri, alle favole, e più altre ſimili coſe, delle quali a ſufficienza ne parlano altri.

* *SUpra reliquas certe Aves monſtrificus appellandus eſt* Gallus. *Tacebo* Gallinam *in lapideam ſubſtantiam inter parietes converſam pennis Hiſtricis inſtar horridam, & ab Aldrovando deſcriptam, pariterque* Gallum *in Aula Sereniſſimi Magni Ducis Etruriae Franciſci Medicei ab ipſo Aldrovando obſervatum, cui praeter inſolitas partium & pennarum plures conformationes longa inſtar quadrupedum erat cauda; tacebo pariter monſtroſos illos tribus, & quinque pedibus inſtructos, ſive bicorporeos, vel capitibus pluribus a nativitate, ut in foetibus humanis aliquando obſervatur, donatos. Haec ad Hiſtoriam noſtram concinnam, magiſque probatam, cum minime faciant, ut inſolita, vel quia a pluribus ut fibuloſa recipi facile poſſunt, libenter omittimus.*

Eademque de cauſſa plurima alia reticemus, quae ad Gallorum *mores*, Gallinarum *& ovorum uſus ac facultates, praecipue medicas pertinent, pariterque earumdem Avium uſus in ſacris, praeſagia, prodigia, myſtica, fabuloſa, & alia multa, quae de his dici poſſent, & apud Auctores abunde occurrunt, tacemus.*

11. GALLO e GALLINA bianca con gran ciuffo di penne in teſta. = *Gallus & Gallina alba criſta in vertice plumoſa.* = *Gallus Gallinaceus criſta in vertice plumoſa denſiſſima, & undequaque diffuſa* Rai. = *Gallina alba criſtata* Aldrov. = *Gallina villatica alba criſtata* Willugh. = *Gallus criſtatus, & Gallina criſtata* Briſſ. = *Phaſianus Gallus criſtatus* Linn. Syſt. Nat. = *In omnibus cum aliis conveniunt, praeterquam quod habeant in vertice pennas longiores, quae criſtam plumoſam efformant, nec a Gallo noſtro Patavino ſub Tab. CCIX. relatum longe differunt.*

12. GALLO e GALLINA con i piedi di cinque dita. = *Gallus & Gallina pentadactylos* Briſs. = *Gallus & Gallina domeſtica* Friſch. cum accuratis iconibus. = *Pullicenus quinque digitis in utroque pede* Aldrov. pariter cum icone, ſed minus accurata. = *Ab aliis tantum differunt digitorum numero, quae varietas monſtroſa eſt.*

13. GALLO e GALLINA di Turchia = *Gallus Turcicus & Gallina Turcica* Aldrov. Briſs. & Willugh. = *Colorum varietate & pulchritudine a noſtratibus praecipue differunt.*

14. GALLO e GALLINA d' Inghilterra. = *Gallus & Gallina Angliae.* = *Gallus Anglicanus & Gallina Anglicana* Friſch. cum accuratis iconibus. = *Gallus Anglicanus, & Gallina Anglicana* Briſs. . = *Craſſitie noſtras non antecellunt, verum altitudine ſuperant; cruribus enim & pedibus donantur, quam in aliis multo longioribus. In ceteris cum noſtratibus conveniunt.*

15. GALLO e GALLINA di Bantam. = *Gallus Banticus, & Gallina Banticana* Briſs. = *Phaſianus Gallus & Gallina Bentamenſis* Alb. cum depictis maris & foeminae iconibus, ſed minus accuratis. = *Gallus minor Banticus* Brown. = *Gallus parvulus* Bont. = *Phaſianus Gallus Puſillus* Linn. Syſt. Nat. = *Varietas haec Gallo Tab. CCXII. ſimilis eſt, habetque ut ille pedes ad digitos uſque plumoſos, ſed in latere exteriore tantum. Ab eo etiam differt pennis crurum longiſſimis, & ultra calcaneos multum extenſis. Mas audaciſſimus eſt, & libenter praelium committit contra Gallos etiamſi ſe ipſo duplo maiores.*

16. GALLO, e GALLINA di Mozambico - = *Gallus Mozambicanus, & Gallina Mozambicana* Briſs. = *Mozambicana Gallina* Nieremb. = *Gallus & Gallina carne nigra* Bont. = *Genuina ac diverſa videtur ſpecies, quae ab aliis diſcrepat non ſolum colore pennarum, quae fere in omnibus nigrae ſunt, ſed quia in hac criſta, paleae, epidermis & perioſteon nigro colore imbuuntur, ita ut cocta, in atramento elixa putetur.*

17. GALLO e GALLINA di Perſia. = *Gallus & Gallina ex Perſia* Aldrov. = *Gallus Perſicus & Gallina Perſica, ſive Gallus uropygio carens* Briſs. = *Gallus Gallinaceus, cauda ſeu uropygio carens* Rai. = *Gallus Perſicus & Gallina Perſica* Ionſt.. = *Gallus non caudatus & Gallina non caudata* Friſch. cum accuratis iconibus. = *Phaſianus Gallus ecaudatus* Linn. Syſt. Nat. = *In omnibus cum noſtratibus conveniunt; ſed uropygio & rectricibus prorſus carent.*

18. GALLO e GALLINA del Giappone. = *Gallus Iaponicus, & Gallina Iaponica; ſive Gallus pennis pilorum aemulis* Briſs. cum optima icone foeminae = *Gallina lanigera forte* Aldr. cuius iconem quoque affert, licet parum accuratam. = *Huiuſmodi Gallinae, inquit* Aldrovandus, *albae ſunt inſtar nivis, & non pennis, ſed lana ut pecus tectae ſunt.* Paulus Venetus *ſcribit in Civitate Quelinfu in Regno Mangi Gallinas inveniri, quae loco pennarum pilos habeant, ut Cati, nigri coloris, & ova optima pariant. Hanc Gallinae ſpeciem fabuloſam exiſtimat* Willughbeius, *ſed minus recte, illamque, quam pro Gallina piloſa deſcribit* Paulus Venetus, Emeu *Avem fuiſſe ſuſpicatur. Revera ſi varietas tota alba datur, nigram quoque dari nil repugnat. Species autem alba huiuſmodi pennis ſingularibus diſiunctis, & pilorum aemulis, in Muſeo Realmuriano Pariſiis aſſervabatur, & a Briſſonio deſcripta fuit. Pedes in hac ad digitos uſque plumoſi quoque erant in latere exteriore, & digitus trium anticorum extimus ad unguem uſque pariter plumoſus.*

Galli vel Gallinae aliae ſpecies, ab Aldrovando *Indicae dictae, alibi deſcriptae a nobis ſunt, praecipue ſub Tab. CCXXVIII. & CCXXIX. Excellentiſſimus, atque inclytus Eques* Daniel Farſetti *Patritius Venetus Gallinarum, Columbarum, & aliarum domeſticarum praecipue Avium innumeras ſpecies & varietates alit, aſſervatque, quas deſcribere difficile propemodum eſſet. Veneta autem Regio domeſticis Avibus propitia eſt, ſylveſtribus vero, ut Phaſianis & Perdicibus non ita, quae acclivia & ſaxoſa praecipue amant loca. Maxime autem nobiliſſimus hic Vir Botanica, & Hiſtoria naturali univerſa generoſo ac ſtudioſiſſimo animo delectatur, ſummas pro Viridariis, Ornithotrophiis, & Muſeis impendit expenſas, & in ſcientiis hiſce peritos omnes munificentiſſime diligit, atque protegit.*

19. GALLINA Padovana col becco conico diritto, lungo, e acuto, forſe ſcherzo della natura Ger. = *Gallina Patavina roſtro conico recto longiore & acuto, naturae forte luſus.* = *Hanc brevitatis ratione icone non demonſtravimus. In Geriniana autographa Ornithologia obſervatur haec Gallinae varietas, quae Florentiae olim vivebat, in toto corpore nigra, caruncularum rudimentis duobus coccineis in fronte, & criſta magna pennacea alba in vertice. Ob roſtri ſupra indicatam ſtructuram capite lateraliter declinato, ſive inflexo, alimentum legere cogebatur. Crax nigrae Linnaei, ſi ſpecies conſtans & ſylveſtris eſſet, videretur affinis.*

T CCXVII. B. 2. 15.

PAVONE maſchio, detto anco Paone. — *Pavo, vel Pavus mas.* — *Pavo longicaudus* Barr. Ornithol. — *Pavo* Geſn. Aldr. Ionſt. Rai. Willugh. & aliorum. — *Pavo, ſeu Pavus; Avis medica Varroni; Iunonia Avis* Ovidio, Rzac. — *Pavo cauda longa, plumis uropygii pulcherrimis* Brown. — A Kleinio *Avis Perſica etiam dicitur.* — *Phaſianus criſtatus* Briſs. ſp. 7. — *Pavo criſtatus* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Le Paon*, — Angl. *Pea-Cock.*

La femmina ha le penne aſſai meno varie, ed è tutta di un colore ſcuro, che volta al cenerino, fuorchè nel collo, e nel petto dove le penne ſono verdi, ma quelle del petto terminano in bianco. L' iride dell' occhio nel maſchio è giallognola, nella femmina piombina, e il mento di queſta è bianco.

I *Pavoni* ſi cibano di quell' iſteſſe coſe, delle quali cibanſi le *Galline*; ma infra le altre piace loro l' Orzo. Alberto diſſe, che mangiano i Serpi, onde non è maraviglia ſe dalla voce del *Pavone* reſtino queſti ſpaventati. Queſt' Uccello, a noi foreſtiero un tempo, trovavaſi ſolo alla corte de' Regi, oggigiorno dovunque, e appreſſo i contadini ancora. Linneo aſſegna ad eſſo per patria l' Indie Orientali, e particolarmente l' Iſola di Ceilan. Vien detto, che i *Pavoni* campino fino a cent' anni, e il Willughby ſi ſoſcrive a queſt' opinione.

Il maſchio, dice Columella, nella ſalacità s' aſſomiglia molto al *Gallo*, e perciò gli ſi debbono dare cinque femmine; dimodochè ſe non ne ha alcun' altra nel tempo, che una trovaſi in cova, aſſalta quella, e rompe le uova. Di queſto coſtume eſſendo dalla natura ammaeſtrata la femmina, pone il nido per quanto ella può in luogo naſcoſto. Apportano i *Pavoni* ſterminio agli orti, e guaſtano tutti i tetti. Quantunque il *Pavone* ſia belliſſimo al-

IN foemina pauca admodum colorum conſpicitur varietas. Tota fuſca eſt ad cinereum vergens, collo & pectore viridibus, apicibus pennarum in pectore albis. Oculorum iris in mare luteſcit, in foemina plane plumbea; mentum in hac totum candidum eſt.

Pavones *iiſdem, quibus* Gallinae *veſcuntur, Hordeo autem inprimis, delectantur. Albertus Serpentes a* Pavonibus *edi dixit, unde non mirum Serpentes eorum voce terreri. Peregrina origine Avis eſt: olim nonniſi Regibus, nunc ubique gentium, & ruſticis etiam familiaris. Linnaeus Indiam Orientalem, Zeylonam praecipue, pro natali ſolo iiſdem tribuit.* Pavones *vitam ad centum uſque annos (cuius ſententiae pariter eſt Willughbeius) protrahere affirmant plures.*

Maſculus, inquit Columella, Gallinaceam ſalacitatem habet, atque ideo quinque foeminas deſiderat; imo, ni adſit alia, cum qua coeat, incubantem foeminam invadit, & ova frangit, cuius rei conſcia foemina nidum quantum poteſt occultat. Maximam hortis peſtem inferunt, & tegulas tectorumque culmos evertunt. Pavo, *etſi Avis viſu pulcherrima ſit, oculorum tamen vo-*

lu-

la vista, egli è altrettanto disgustevole e incomodo per la voce, onde di esso si può dire:

Angelo appar per le dipinte penne,
Ma ladro il piè lo scuopre,
E per l' iniqua voce
Dall' Erebo venuto alcuno il tenne.

luptas plurimo aurium taedio compensatur, unde dictum fuit:

Angelus est pennis, pede latro, voce Gehennus.

Klein. pag. 112.

T. CCXVIII. B. 2. 13. 1.

PAVONE, o Paone bianco. — *Pavo albus* Gesn. Aldr. Ionst. Briss. & aliorum. — *Pavo colore albo* Rai. — *Pavo candidus* Schwenck. — Gall. *Le Paon blanc.* — Angl. *White Pea-Cock.*

QUegli occhi, o macchie, che si vedono in punta delle penne copritrici il di sopra della coda, quantunque sieno anch' esse tutte bianche, si distinguono però bene a motivo de' diversi gradi di bianco, da' quali son esse formate.

I *Pavoni* bianchi sono stati supposti da alcuni esser naturali de' paesi Settentrionali, ma ciò è contro le osservazioni. Questo genere d' Uccello è realmente Orientale, come lo devono essere anco le sue specie, e varietà. Luigi Cadamosto ci assicura aver trovati de' *Pavoni* bianchi, e in quantità nell' Isole Madere.

I *Pavoni* partoriscono fra noi cinque, o sei uova, e di rado otto, avanti il tempo di covare; e siccome covano due volte l' anno, sedici al più sono le uova che depongono in un anno. Quest' uova sono di guscio assai duro, di color bigio, che piuttosto inclina ad un color terreo chiaro, e gentilmente traforate nella superficie.

Pietro Martire racconta, che nell' Indie partoriscono venti, e anco trenta uova, ma non si sa se dentro l' anno, o in ciascuna covatura. Se le uova di *Pavone* si porranno a covare sotto la *Gallina*, insegnano gli Autori, che chi n' avrà la cura si porti spesso al covo, e le rivolti, perchè difficilmente le rivolta la Chioccia, essendo esse più grandi e gravi delle proprie, e perchè sia ciò fatto anco meglio, vogliono, che da una delle parti si segnino con dell' inchiostro; in questa maniera si potrà certamente sapere se saranno, o non saranno dalla *Gallina* state rivoltate.

MAculae, quibus tectrices caudae superiores in apice praeditae sunt, quamquam ipsae sint in toto albae, attamen paullulum apparent, quia variis efformantur albedinis gradibus.

Pavones *colore albo Septemtrionalibus regionibus peculiares fuisse nonnulli crediderunt, quod observationibus opponitur. Orientalis revera est Avis, ut reliquae omnes sunt huius generis species & varietates. In Insulis, quas Maderas appellant, plurimos albos* Pavones *nasci, Aloysius Cadamustus testatur.*

Pavones *apud nos ova quinque aut sex, perraro octo ante incubationem edunt; cum vero intra annum bis incubent, sexdecim ad summum sunt ova ab iisdem quotannis excluſa. Haec autem cortice sunt solido, cinereo colore imbuta, diluto admodum, sed ad fuscum inclinante, & punctulis in superficie leviter perforata.*

Petrus Martyr in India Pavones *aliquando ova viginta, immo triginta parere refert; an vero infra annum, vel in singulis incubationibus accidere id soleat nescimus. Si* Pavonina *ova* Gallinae *fovenda supponantur, praecipiunt Auctores, ut saepe ad cubile incubantis accedat custos, illaque, cum propter magnitudinem difficilius, quam sua a* Gallina *moveantur, manu verset, atque ut diligentius id fiat, unam partem ovorum atramento notari volunt, quoniam eo signo, an a* Gallina *conversa fuerint, nec ne manifeste diiudicari poterit.*

T. CCXIX. B. 1. 11. —

PAVONE della China maschio. — *Pavo Sinensis mas.* — *Phasianus Pavoneus* Klein. — *Phasianus Pavonicus Chinensis* Edw. — *Phasianus Pavo Sinensis* Briss. sp. 9. — *Pavo* [*bicalcaratus*] *capite laevi, calcaribus duobus* Linn. Syst. Nat. sp. 3. — Gall. *Le Paon de la Chine.* — Angl. *The Pea-Cock Pheasant from China.*

QUantunque il *Pavone* sia un Uccello bellissimo, la sua carne però è dura, asciutta, e di difficil concozione, e per questa ragione cotta che sia si conserva lungamente, e difficilmente si putrefà. Guardinsi, dice l' Aldro-

Licet Pavo *pulcherrima sit Avis, eius tamen caro durior, siccior, & difficilioris concoctionis censetur. Hac de causſa cocta longius asſervatur, difficillimeque putrescit. Caveant, inquit Aldrovandus, a* Pavoninarum *carnium esu,*

qui

vando, dal mangiar carni di *Pavone* chi fa vita ripoſata, imperocchè convengono, o almeno nuccono meno alle perſone eſercitate, e ſoltanto anco per queſti conviene quella dei *Pavoncini* più teneri. I Romani eſsendo meno delicati, e dediti alle fatiche della Ginnaſtica, e della campagna, e più ancora per ragione di grandezza ſtimavano molto la carne di queſt' animale, La carne poi de' piccoli, e piu giovani *Pavoni* ſi ſtima aſſaiſſimo anche oggigiorno, come tenera, delicata, e ſaporitiſſima, nè generalmente ſi ſa poſporre a quella delle *Pernici*.

qui quiete fruuntur; ſiquidem conveniunt, aut ſaltem minus nocent, hominibus multum ſe exercentibus, iiſque tantummodo iuniorum Pavonum, *utpote teneriorum. Romani minus delicati, ac gymnaſticis, & agrariis laboribus aſſueti, maximeque luxus ratione, plurimi huius volucris carnem fecerunt. Iuniorum vero* Pavonum *carnem teneram, delicatam & ſapidiſſimam hisetiam diebus dicunt omnes, nec* Perdicinam *ei praeferre ſciunt.*

T. CCXX. B. 1. 2.

PAVONE della China femmina. — *Pavo Sinenſis foemina* Briſs. ſp. 9. — *Phaſianus fuſcus* Klein.

SI dice la femmina della ſpecie antecedente, ma per aver la coda larga e lunga, e le penne molto belle a' occhi celeſti, e di turchino contornati, tanto nelle ale, che nella coda, i quali caratteri ſoglion mancare nelle femmine, vi è da ſoſpettare, che non altrimenti ſia una femmina, ma bensì una diſtinta varietà, e maſchio anch' eſſo.

HAbetur pro foemina ſuperioris ſpeciei, ſed ob caudam amplam & oblongam, pariterque ob pennas admodum pulchras, oculatas, cyaneo & obſcure caeruleo colore pictas in alis, caudaque, qui characteres in huius generis avibus deſiderari in foeminis ſolent, ſuſpicari recte poſſumus, non foeminam ſupraindicatae ſpeciei hanc eſse, ſed diſtinctam Pavonis *Sinenſis varietatem, maremque potius eſſe.*

† T. CCXXI. B. 1. 2. —

PAVONE del Regno di Tibet. — *Pavo Tibetanus* Briſs. ſp. 10. — Gall. *Le Paon du Tibet.*

6. PAVONE della ſpecie comune vario. = *Pavo varius* Briſs. ſp. 7. variet. A. = *Pavo varius* Friſch. cum accurata icone. = *Noſtro Tab. CCXVII. ſimilis; differt tamen genis, gutture ſuprema ventris parte, alarumque tectricibus albis.*

7. PAVONE del Giappone. = *Pavo Iaponenſis* Aldrov. & Ionſt. cum iconibus maris & foeminae, licet non ſatis accuratis. = *Pavo Iaponicus* Charlet. & Briſs. ſp. 8. = *Mas ſuperne caeruleo & viridi varius eſt, inferne leucophaeus nigris maculis inſignitus, rectricibus, ſive caudae pennis, quam in noſtrate, multo longioribus colore fuſco ad caſtaneum vergentibus, ſcapo candidiſſimo, & maculis verſus apicem tectricum, quam in noſtro maioribus, in medio aureis, dein caeruleis, marginibus viridibus. Oculorum ambitus in hoc eſt ruber, pupilla nigra, eorumque irides luteae; roſtrum cinereum, ſed quam in noſtro longius & tenuius; Pedes leucophaei. Foemina vero mare minor eſt, ventre prorſus nigro; rectricibus caudae multo brevioribus, & rectricibus viridibus,*

T. CCXXII. B. 1. 8. —

GALLO PAVONE, altrimenti anco detto Pollo d' India, e Gallo d' India, col ciuffo; in Toſcana volgarmente chiamato Tacchino, o Tacchina, e Pollo Dindo. — *Gallo-Pavo criſtatus* Briſs. ſp. 1. variet. A. — *Meleagris Gallo-Pavo criſtatus* Klein. — *Meleagris [Gallo-Pavo] capite caruncula frontali, criſtaque gulari, maris pectore barbato* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Le Dindon huppé.* — Angl. *Creſted Turkey.*

GLi Uccelli di queſto genere furono portati per la prima volta dalla Turchia, per quanto almeno ſi crede, e perciò furono detti *Turcheſchi*. Ora però ſono frequentiſſimi in Europa, e conoſciuti da tutti. Avendo poi queſt' Uccello gran ſomiglianza a prima viſta, e per l' indole ancora, con il genere Gallinaceo, e non poca convenienza ancora con il *Pavone*

HUius generis Aves primum e Turcia delatae creduntur, ideoque ab Anglis Turkeis *appellatae ſunt. Nunc vero in Europa paſſim notae, & ubique fere obviae factae ſunt. Eximium hunc alitem quum primo intuitu, & moribus & figura corporis, ad Gallinaceum genus pertinere videatur, communem vero cum* Pavonibus *pro-*

Per

per la grandezza del corpo, e per l' abilità, che ha di alzare, e aprire in ventaglio la coda, e come esso di godere nel guardarsela, lo hanno addimandato *Gallo-Pavone*, con vocabolo vale a dire, che ritiene e somministra l' idea dell' uno, e dell' altro genere, e che significa partecipare della natura, o delle qualità tanto del *Gallo*, che del *Pavone*.

Il *Gallo-Pavone* salvatico della nuova Inghilterra citato dal Raio, è molto più nero di colore del volgare, e molto più grosso ancora, trovandosene ivi qualcuno, che arriva a pesare 40. e 60. libbre, secondo Iosselino, che ha descritte le rarità di tal paese. Può ridursi a variare, e a divenir sì grosso per il favorevol clima di tal luogo, e per l' alimento, che vi trova; essendo certo, che anco là è dall' Affrica.

proceritatem, & caudae explicationem habeat; atque ut ipse eam admiretur, & contemplari gestiat, Gallo-Pavonis *ei nomen imposuerunt, nomen scilicet, quod* Galli *&* Pavonis *ideam servat, ipsamque Avem ab illis non alienam, sed potius de ambobus participem significat.*

Gallo-Pavo *sylvestris novae Angliae Raii vulgari nigrior est, & ab eo magnitudine insigniter differt, cum ibi reperiantur qui 40. imo 60. libras pendant teste Iosselino in rarioribus Novae Angliae. Varietatem hanc, sive potius magnitudinem adquirere illic potest ob coeli conferentiam, atque pabuli bonitatem & copiam; ceterum & Novae Angliae adventitia illa est ex Orientalibus Regionibus, ex India scilicet, aut ex Africa translata.*

è stato portato d' altronde, cioè dall' Oriente,

T. CCXXIII. B. 1. 6. 2.

GALLO PAVONE, o Pollo d' India bianco con macchie nere, o sia Pollo d' India comune. — *Gallo-Pavo albus, maculis nigris consperſus, ſive Gallo-Pavo vulgaris.* — *Gallo-Pavus* Gesn. & Schwen. = *Gallo-Pavus, ſive Gallus Indicus* Frisch. — *Gallo-Pavo* Aldrov. & Ionst. — *Gallo-Pavo, ſive Meleagris, & Numidica Avis* Willugh. — *Gallo-Pavo: Gallus Indicus: Meleagris* Charlet. — *Meleagris vulgaris* Klein. — *Meleagris verſicolor vulgaris* Barr. Ornith. — *Meleagris caudam erigens* Brown. — *Gallus Indicus vulgo: Meleagris Graecis: Gallo-Pavus* Gesnero: *Pavo-Gallus* Aldrovando: *aliis Avis Lybica, & Avis Numidica* Rzac. — *Cenchramus* Moehr. — *Gibber* Bellon. — *Gallo-Pavo caruncula in fronte donatus* Briss. sp. 1. — *Meleagris Gallo-Pavo* Linn. Syst. Nat. sp. 1.

I *Polli d' India* amano i luoghi caldi: tuttavolta allorchè sieno fatti grandi, e si sieno assuefatti sono tollerantissimi anco del freddo. I nati di corto sono però tanto delicati, e soggetti a restar danneggiati dall' ingiurie de' tempi, e de' luoghi, che non si possono rilevare e tenere senza impiegarvi molta attenzione,

GAllo-Pavones *loca calidiora amant; frigidiora tamen postquam adoleverint, iisque assueverint haud difficulter tolerant. Pulli autem admodum sunt delicati, & tenelli, atque iniuriis tempestatum obnoxii, ut non sine diligenti cura educari possint.*

T. CCXXIV. B. 1. 6. =

GALLO PAVONE, o Gallo d' India bianco con macchie bionde. — *Gallo-Pavo albus, fulvo maculatus.*

LE uova di quest' Uccello sono di guscio assai sodo, alcune volte del tutto bianche, ma in alcune specie, o varietà, esse sono di un colore di acquerello di terra d' ombra con macchie alquanto più scure. Ne genera al più quindici, cominciando a partorirle nel mese di Marzo; e dopo di aver allevato i figli, torna a generarne altrettante, e così fa per la terza volta; e la cova di esse non dura meno di 30. giorni, almeno la naturale, e ordinaria.

OVa huius cortice sunt admodum duro, interdum omnino alba, interdum colore terreo diluto, obscurioribus maculis adspersa, quod in quibusdam huius speciei varietatibus accidere solet. Ova autem ad summum num. 15. edere solet, Martio mense illa deponere incipiendo, & pullis ab hisce exclusis, atque pennis integre obtectis, iterum ova totidem parit, totidemque hisce enatis, per tertiam vicem excludere solet. Unaquaeque vero incubatio, non artificiosa saltem sed naturalis, diebus tricenis perdurat.

T. CCXXV. B. 1. 5. --

GALLO PAVONE, o Pollo d' India nero. — *Gallo-Pavo niger, vel nigricans.* — *Gallo-Pavonis ſylveſtris ſpecies, vel forte varietas?*

POſſiamo dire con l'Aldrovando, che la carne di queſti Uccelli è ſquiſitiſſima, e non indegna delle tavole de' gran Signori. I *Polli d' India* molto giovani ſono aſsai teneri, e di carne faciliſſima a digerirſi. A noi ſon portati in gran quantità dalla Romagna, e qualora ſon graſſi, e cotti arroſto gli troviamo un ſaporitiſſimo, e delicatiſſimo cibo; i groſſi poi, o più duri di rado ſi vedono ſulle noſtre menſe, almeno nelle caſe de' più facoltoſi, ſebbene molti de' noſtri confinanti, e diverſi de' noſtri ancora, aſsuefatti a più ordinarie vivande, ſieno ſoliti di mangiare giornalmente queſt' animale leſſo. Mangiandolo in queſt' ultima maniera reſta al guſto troppo dolce, meno facile a digerirſi, e capace a produrre de' flati, de' dolori inteſtinali, e la diarrea.

Acciocchè queſta carne rieſca più ſana, vuole l' Aldrovando, che non s' indugi troppo ad ammazzarlo, e che gli ſi leghino fortemente i piedi, o ſe gli attacchi un peſo, e ſi ſtropicci gagliardamente, e anco ſi batta, e queſto intendaſi egualmente buono, e utile per la carne di *Pavone*, e di altri; poichè mediante queſta faccenda ſi diminuiſce non poco la durezza della carne, e la tenacità delle ſue fibre. Celio Apicio poi vuole, che queſto Pollame ſi addobbi con molto Pepe, e altre Droghe.

GAllo-Pavonum *caro in cibis laudatiſſima eſt, & Principum epulis digna Auctore Aldrovando; iuniores enim, & Pulli ſatis teneri ſunt, & coctu faciles. Ad nos e Romandiolae terris magna copia afferuntur, & aſſatos, cum pingues ſint, in deliciis, ut ſapidiſſimos & delicatos habemus: adultiores vero & ſeniores raro in cibis ditiores noſtri admittunt, licet plurimi ex noſtris finitimis, aliique etiam apud nos vulgaribus cibis aſſueti ipſos quotidie elixos in menſis expetant. Eorum caro hoc pacto parata dulcior palato videtur, bonae coctioni in ventriculo minus apta, & ad excitandos flatus, ventris tormina, atque diarrheas obnoxia.*

Ut vero eius caro ſalubrior reddatur, praecipit Aldrovandus, ut tempeſtivius Avis iugu-letur, & ad pedes, quod de Pavonibus, *aliiſque plurimis dici aeque poteſt, pondera adiiciantur, vel perſtringantur diutius, fricenturve, & vapulent: hoc nempe ad diſcutiendam carnis duritiem, & frangendam fibrarum tenacitatem plurimum facit. Apicius inde multo Pipere aliiſque aromaticis condimentis Pullos hoſce praeparari iubet.*

T. CCXXVI. B. 1. 6. 2.

GALLO-PAVONE, o Pollo d'India nero con macchie bianche. — *Gallo-Pavo niger maculis albis conſperſus.*

I *Polli d' India*, o *Tacchini*, come da noi ſi chiamano volgarmente, ſi rilevano appunto come i *Pavoni*. Dicono alcuni, che facilmente i *Tacchini* ſi uniſcono con i *Pavoni*, e ne naſcono belliſſime varietà, la qual coſa però ſe ſia vera non ſappiamo accertarla. Il Porta nella ſua Magia naturale, fra gli altri, promette per immancabile, che dal *Pavone* maſchio, e dal *Pollo d' India* femmina ne naſca una varietà molto bella.

GAllopavonum *educatio eadem eſt, quae* Pavonum. *Aiunt nonnulli* Gallo-Pavones *cum* Pavonibus *coire & pulcherrimos ita Pullos procreare, cuius rei fides penes Auctores ſit. Io. Baptiſta Porta inter alios hanc ex* Pavone *maſculo, &* Gallo-Pavone *foemina pulcherrimam enatam generationem in ſuo de Magia naturali libro quam certiſſime promittit.*

T. CCXXVII. B. 1. 7. 1.

GALLO PAVONE del Braſile. — *Gallo-Pavo Braſilienſis* Briſs. ſp. 2. — *Alector Braſilianus* Klein. av. n. 4. — *Phaſianus fuſcus Braſilienſis* Klein av. n. 2. — *Phaſianus Braſilienſis Iacu-pema dictus* Marcgravii Rai. — *Iacu-pema* Piſ. — *Iacu-pema Braſilienſium* Willughb. — *Quan, ſive Guan Americanis* Edw. av. 13. — *Meleagris [criſtata] capite pennis erectis criſtato, temporibus violaceis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. — Gall. *Le Dindon du Bréſil.* — Angl. *The Braſilian Iacupema.*

QUeſto trovaſi ſpecialmente al Braſile. Le penne, che gli ſi vedono in fronte, le ſuol tenere abbaſſate, ma le alza per altro ſpeſſe vol-

AVis haec in Braſilia praecipue habitat. Pennas, quas in vertice gerit, depreſſas ut plurimum tenet, illaſque tamen in criſtam ſaepe ſae-

volte allorchè vuole. Alcuni individui però mancano di queſte lunghe penne ſul vertice, o ſia di queſta creſta; e queſti probabilmente ſono femmine. Il Klein riporta un *Fagiano* ſcuro del Braſile, dove è chiamato *Iacu-pema*, lo dice variegato di bianco e ſcuro, e lo fa diverſo dal *Gallo-Pavone*, o ſia dal ſuo *Alettore*; ma queſta varietà non credo poſſa naſcere, che dal ſeſſo, tantopiù che vedendoſi ſenza la creſta ne riſulta a chi l' oſſerva una ſenſibil diverſità. Edward vuole, che queſt' Uccello ſi trovi anco nell' Iſole Antille,

ſaepius erigit. Quaedam tamen hiſce longioribus in vertice pennis, ſive criſta omnino deſtituuntur: fortaſſe foeminae hae ſunt. Kleinius Phaſianum *ſuum fuſcum Braſilienſem, ſive* Iacupemam *Braſilienſium, quem colore tantum fuſco & albo tinctum dicit, diverſum a* Gallo-Pavone, *ſive ſuo* Alectore *facit; ſed ex ſimplici ſexu varietatem hanc ortam credo, praecipue cum criſtae deficientia maximam intuentibus differentiam repraeſentet. In Antillis etiam Inſulis obviam eſſe hanc Avem ſuſpicatur Edwardus.*

6. GALLO-PAVONE, o Pollo d' India tutto bianco Ger. Ornit. = *Gallo-Pavo omnino albus.* = *Hunc tum niſi coloris differentia a vulgari Gallo-Pavone differret ſupprimere cum inſequenti, ac ipſa de cauſſa, non dubitavimus.*

7. GALLO-PAVONE tutto biondo, o roſſigno, e macchiato di bianco. Ger. Ornit. = *Gallo-Pavo toto corpore flavicans, vel rufeſcens, ex albo maculatus.* = *E Romandiolae Terris, in quibus huius generis Aves abunde, & turmatim aluntur, indicatae ferme omnes varietates advectae fuere.*

T. CCXXVIII. B. 1. 7. 2.

MITUPORANGA del Braſile. — *Mituporanga Braſilienſibus* Marcgr. & Ionſt. — *Mitu, vel Metu alias ſpecies, Mituporanga Braſilienſibus* Marcgr. Rai. & Willugh. — *Mutuporanga* Piſ. — *Gallus Indicus* Sloan. *Phaſianus niger atra criſta eleganter complicata* Barr. Hiſt. — *Crax niger iride ſubfuſca, croceo ventre albido* Brown. — *Phaſianus Crax Guianenſis* Briſs. ſp. 12. — *In Mexico appellatur* Tepetototl, *in Iamaica* Quirizao, *in Africa* Ano. — *Crax nigra* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Hocco de la Guiane, & de Cayenne.* — Angl. *Curacao-Bird.*

IL nome di *Mituporanga*, che è Braſiliano, lo abbiamo adattato a più ſpecie di queſto genere di Uccello, o per meglio dire a più varietà di queſta ſpecie, acciocchè la differenza de' nomi non faceſſe credere alcuni di queſti Uccelli, che per poco diverſificano, come diverſiſſimi di ſpecie e di genere. I due inoltre che ſi dimoſtrano in queſte Tavole, non furono giuſtamente in principio denominati, e perciò non ſi troveranno corriſpondere a' nomi, che ſi ſono quì ora dati loro. La correzione di queſti nomi è ſtata trovata tanto più neceſſaria dopo avere eſaminate le ſpecie riferite dal Briſſon, che quì ſotto ſecondo il ſolito ſaranno da noi regiſtrate. Si deve per altro confeſſare, che tutte queſte, fuorchè la ſeſta denominata del Perù, ſono mere varietà, e che tutte convengono fra loro, poco più, o poco meno, ne' coſtumi, e nelle qualità della carne.

Gli Spagnuoli prendono queſt' Uccello per un *Fagiano*. E' più groſſo d' un *Gallo*, ed ha le penne della teſta, che formano una mitra, ma tenendole egli per il ſolito baſſe non gli ſi vedono; irritato per altro che egli ſia le ſolleva, ſiccome a ſuo piacimento le alza in qualche altra occaſione a foggia di creſta. Se ne truova qualcuno, che ha il becco di un color roſſo sbiadito, o carnicino, o anche giallo, e bianco in punta. Volentieri ſtà ſopra qualche coſa di alto, come il *Pavone*: è Uccello poi agevole, ſo molto facile almeno a farſi manſueto; e la ſua carne è molto ſaporita.

MItuporangae *nomen, quod Braſilianum eſt ad plures eiuſdem generis Aves, ſive potius eiuſdem ſpeciei varietates adcommodavimus, ne nominis differentia, Aves aliquas, quae revera vix ſpecie differunt, ut genere diverſas ſuaderet. Duae inſuper quae a nobis figuris traduntur perperam denominatae initio in Tabulis fuerunt, ideoque denominationibus in Hiſtoria minime reſpondere videbuntur. Neceſſaria autem nominis correctio fuit, aliis obſervatis ſpeciebus a Briſſonio relatis, hicque infra deſcriptis. Fatendum revera eſt omnes eiuſdam ſpeciei, praeter ſextam Peruvianam dictam, eſſe varietates, omneſque moribus iiſdem plus minus, & carnis bonitate convenire.*

Hanc pro Phaſiano *habent Hiſpani. Maior eſt* Gallinaceo, *& pennas quibus in capite veſtitur complicatas in planiſſimam quaſi mitellam gerit, ut neſciens vix eam poſſit agnoſcere, quas iraſcens, aut alia etiam de cauſſa pro lubitu in criſtam erigere poteſt. Interdum roſtrum habet colore rubro magis diluto, ſive incarnato, vel croceo, atque in apice albicans. Libenter in alto ſedet, ut* Pavo: *eſt autem mite animal, vel ſaltem facile manſueſcit; carnem denique admodum ſapidam habet.*

T. CCXXIX. B. 1. 3. 1.

MITUPORANGA Curaſſavica. — *Mituporanga Curaſſavice* nobis. — *Gallus alius Indicus* Aldrov. Rai. — *Gallus Indicus alter* Ionſt. — *Gallina Indica* Aldrov. & Willugh. — *Gallina Indica prima* Ionſt. — *Alector Curaſſaus* Klein. — *Phaſianus Crax Curaſſavicus* Briſs. ſp. 13. — Angl. *Coraſſow-Cock*. — Gall. *Phaiſan, ou le Hocco de Curaſſow*.

E' Naturale della Guiana, e particolarmente dell' Iſola di Curaſſao. E' un animale docile, e amico dell' uomo. Tirando i ſervitori per il ferraiuolo chiede da mangiare: trovando la porta ſerrata di quella ſtanza, nella quale penſa di entrare, picchia col becco. Trovandoſi ſciolto va dietro dietro al Padrone, e tornando eſſo di fuori lo riceve tutto allegro, e facendogli feſta; ſi nutriſce di biade, e d' ogni ſpecie di frumento tanto cotto in forma di pane, che altrimenti impaſtato, e di ſimili cibi. La ſua carne è buona a mangiarſi, ed è graſsa. Il maſchio è nero di colore col baſso ventre bianco, la femmina poi è bruna, colla ſola prima metà del baſſo ventre ſotto il petto bianca.

HAbitat in Guiana, & praeſertim in Curaſſoa Inſula. Mite animal eſt, & amicum homini; cibum apprehenſo domeſticorum pallio exigit; pulſatque roſtro clauſam ianuam, ubi aliquo intrare ei opus ſit. Herum autem ſequitur ſi liberum ſit, venientemque alacriter applaudenſque excipit. Alitur frumentaceis frugibus, ſeu in maſſam, ſeu in panem coctis, aliiſque ſimilibus eſculentis. Edule eſt, ac pingui carne praeditum. Mas corpore eſt nigro, imo ventre albo, Foemina vero corpore fuſco, ſuprema ventris medietate alba.

3. MITUPORANGA *Mitu*, ovvero *Mutu* de' Braſiliani. = *Mituporanga* Mitu, *vel* Mutu *Braſilienſium*. = *Phaſianus niger roſtro cinnabarino* Barr. Hiſt. = *Crax niger, criſta tota atra roſtro cinnabarino* Barr. Ornith. = *Crax niger corolla atra, roſtro rubro* Linn. Syſt. Nat. edit. 6. = *Alector Mitu, vel Mutu* Klein. = *Mutu* Piſon. *Mitu, vel Mutu Braſilienſibus dicta* Marcgr. Ionſt. Willughb. & Rai. = *Phaſianus Crax Braſilienſis* Briſs. ſp. 11. = *Corpore eſt nigro, ventre fuſco, pennis verticis apice ſurſum reflexis & criſpis. Caudam ſemper in latum movet, eamque Pavonum more explicat. Oculos habet magnos nigros, & pone aures maculam cutaceam albeſcentem ut Gallinae. Roſtrum huius coloris eſt egregie incarnati, verſus apicem tamen albicat. Corporis craſſitie Gallum domeſticum antecellit; manſueſcit facile, habitatque in Braſilia & Guiana.*

4. MITUPORANGA del Meſſico, detta ivi *Pauxi*. = *Mituporanga Mexicana* Pauxi *dicta*. = *Pauxi vocata Avis* Fernand. = *Pauxi* Nieremb. Ionſt. Willughb. Rai. & Klein. = *Gallina alia Indica* Aldrov. & Willughb. = *Gallina Indica tertia Numidica dicta* Ionſt. = *Phaſianus Crax Mexicanus* Briſs. ſp. 14. = *Gallum Gallinaceum magnitudine paullulum antecellit. Per univerſum corpus pennis veſtitur nigris ſplendentibus & ad ſubcaeruleum vergentibus. Tuberculum, non ſecus ac ſpecies a Tab. CCXXIX oſtenſa, ad baſim roſtri in fronte gerit magnum, durum, pyriforme, coloris caerulei; roſtrum vero rubicundum habet. Foemina a mare aliquantulum diſcrepat colore. Ubi enim mas niger, ibi foemina fuſca; in ceteris mari ſimilis.*

5. MITUPORANGA del Meſſico, ivi detta Hoactzin. = *Mituporanga Mexicanis Hoactzin vocata*. = *Hoactzin* Fernand. Nieremb. Ionſt. Willugh. Rai. & Charlet. = *Phaſianus Crax fuſcus Mexicanus* Briſs. ſp. 15. = *Magnitudine Gallo-Pavonem foeminam fere adaequat. Criſtam in capite geſtat concinnatam e pennis ex candido in pallidam colorem vergentibus, ſubtus vero nigris. In reliquo corpore colore eſt fulvo ad fuſcum inclinante, pectore candido-luteo, alis & cauda candido & pallenti maculatis. Pedes in hac Ave fuſci ſunt, ungues nigri, Sylveſtris eſt, Veſcitur anguibus. Vox ei eſt magna, & ululàtum quendam repraeſentat. Apparet Autumno, & inauſpicata habetur ab incolis. Vivit in calidioribus regionibus, magnaque diei parte arboribus iuxta flumina conſitis inſidet.*

6. MITUPORANGA del Perù. = *Mituporanga Peruviana*, = *Gallina Peruviana rubra* Alb. = *An Coxolitli* Fernand. Hernand. & Rai. = *Phaſianus Crax Peruvianus* Briſs. ſp. 16. = *Crax* [*rubra*] *capite caeruleſcente* Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. = *Speciei a Tab. CCXXIX. demonſtratae meram ſuſpicantur varietatem* Kleinius, *atque* Linnaeus. *Magnitudine Gallo-pavonem fere adaequat, colore eſt fulvo, collo ſupremo & capite ſaturate cinereis; criſta vero in capite donatur pennis albis, apice nigris conflata. Oculis nigris, iridibus rubis, roſtro ſaturate cinereo, pedibus nigris. In Peruvio praeſertim habitat.*

T. CCXXX. B. — 18. 1.

MELEAGRIDE, o Gallina di Guinea, detta anco Numidica, o Affricana, e volgarmente Gallina di Faraone, e Gallo moro. — *Meleagris, ſive Gallina Guinea, & Numidica, ſive Africana, vulgo Gallina Faraonica.* — *Meleagris* Geſn. Moehr. Briſs. ſp. 1. — *Meleagris vel Gallus Numidicus, aut Mauritanus ſylveſtris* Geſn. — *Gallus niger maculis ovalibus & orbiculatis* Barr. Ornith. — *Gallus clamoſus maculis minoribus orbiculatis varius, criſta cornea, cauda horizontali* Brown. — *Gallus, & Gallina Guineenſis* Sloan. — *Gallina Guinea* Aldrov. Ionſt. Willughb. — *Gallina Guinea veterum, Meleagris* Rai. — *Perdix Terrae novae* Muſ. Worm. — *Gallina Africana, ſive Numidica* Geſn. — *Gallina Peregrina* Alp. — *Alector Guineenſis* Klein. — *Phaſianus*

ſianus [*Meleagris*] *vertice calloſo , temporibus carunculatis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. — Gall. *La Pintade ; Poule Pintade ; Poule de la Guinee ; & Perdris des Terres Neufves*. — Angl. *Pintado ; Guiny-Hen ; Guinea-Hen.*

E' Grande quanto una *Gallina* domeſtica , ma di collo più lungo , e più ſottile , e per la forma del corpo ſimile ad una *Starna* . La ſommità del ſuo capo è corredata di un corpo elevato, e duro come corno , e roſſeggiante di colore. Si dice, che le *Meleagridi* vivono molte inſieme , che ſono aſſai feconde , e che rilevano anco i Pulcini non propri . La femmina ſi diſtingue dal maſchio per il colore delle guance, che nelle femmine è roſſo , ne' maſchi celeſticcio .

GAllinae *vulgari magnitudine par eſt ; collo tamen longiore , & tenuiore ; figura corporis fere ut* Perdix *vulgaris . Medio vertici cornu durum ex fuſco rufum innaſcitur . Gregarias eſſe aiunt has Aves , admodum foecundas , & Pullos communiter alere etiam non ſuos . Foemina a mare diſcrepat colore genarum , quae rubrae in foemina ſunt , in mare caeruleſcentes .*

Meleagrides *revera veterum has fuiſſe validis argumentis probant nonnulli ut Bellonius ; Columella , & Plinius* Numidicas *dixit* .

Che queſt' Uccello ſia veramente la *Meleagride* degli antichi , aſſai convincentemente lo prova il Bellonio ; Columella , e Plinio lo diſsero *Uccello di Numidia* .

† T. CCXXXI. B. -- 16. 2.

MELEAGRIDE , o Gallina di Guinea , o di Faraone bianca . — *Meleagris , ſive Gallina Guinea , vel Numidica alba.*

LE *Meleagridi* riconoſcono l' Affrica per Patria , d' onde ſono ſtate traſportate . Quella di color bianco ſtata quì rappreſentata non è che una mera varietà dell' antecedente . Queſta ſpecie d' Uccello ſuol partorire le uova dal meſe di Maggio al Settembre , ſenza adoprar artifizio alcuno in formar per eſſe eſpreſso nido ; ma le depone per il ſolito in qualche maſſa di letame cavallino, o nella paglia , nel fieno , o ſopra ſimili materie , e qualche volta ancora le laſcia ſulla nuda terra , per i campi , e lungo le pubbliche ſtrade . Sono poi queſt' uova di guſcio molto duro , a ſegno che meſcolate , e battute con quelle di *Gallina* , e d' *Oca* , ſempre queſt' ultime reſtan rotte da eſſe . Sono di color d' ombra chiaro con macchie più cupe , e uniformemente diſtribuite . Per il ſolito i noſtri ne mettono inſieme 30. ovvero 40. e le fanno covare da una *Gallina* , e nati che ſieno i Pulcini gli tirano avanti cibandogli con uova di Formiche .

MEleagrides *Africam ut natale ſolum agnoſcunt , ex Africa vero in varias regiones eductae fuerunt . Candida quae hic depicta obſervatur mera eſt ſuperioris varietas . Huius ſpeciei Aves a menſe Maio ad Septembrem , uſque ſua ova , abſque ulla tutelae cura , atque nidi artificio deponere ſolent : illa enim ſaepius in fimi equini , vel palearum , & ſtipularum acervis locant , aliquando etiam ſupra aridam agrorum terram , ſecuſque publicas vias relinquit . Ova autem earum cortice ſunt ſolidiſſimo , ita ut cum ovis* Gallinarum *& Anſerum intermixta , & colliſa , haec facillime frangant . Colore ſunt caſtaneo diluto obſcurioribus maculis undique , atque uniformiter adſperſa . Triginta & quadraginta etiam horum colligunt ex noſtris nonnulli , &* Gallinae *fovenda ſubmittunt , e quibus cum pulli orti fuerint , Formicarum ovis principio eos nutriunt .*

† T. CCXXXII. B. 1. 6. 2.

MELEAGRIDE diverſa , detta Gallina d' Egitto . — *Meleagris altera Gallina Aegyptiaca dicta* Gerin. Ornith.

QUeſta ſpecie di *Meleagride* ſtata detta *Gallina d' Egitto* viveva a Verſaglies il 1728. nell' Uccelliera del Re. Le *Meleagride* devonſi allevare egualmente , che le *Galline* domeſtiche , e lo ſteſſo trattamento richiedono anco le loro uova, e i loro pulcini. Anzi quel metodo , che nell' Egitto ſi adopra per far naſcere i pulcini dalle uova di *Gallina* , ſi può dire egualmente buono , e da metterſi in pratica per far naſcere anco queſti.

MEleagris *haec* , Gallina Aegyptiaca *dicta , in Aviario Regio anno* 1728. *Verſaliis vivebat* . Meleagrides *aeque ac* Gallinae *domeſticae educari debent , earumque ova & pulli cuſtodiendi ſunt ; immo methodus , quae in Aegypto pro excludendis ex vulgarium* Gallinarum *ovo pullis adhibetur , hiſce quoque extendi poteſt* ,

De-

Democrito vuole, che posto in un guscio d' uovo alquanto sterco di *Gallina* polverizzato, e attorno attorno delle piume del medesimo animale, e collocato sopra quello e queste un uovo diritto, ed in forma, che la parte acuta sia voltata in alto, e coperto indi con altro sterco, e mosso, e rivoltato ogni due o tre giorni, perchè abbia un egual calore, in capo a ventun giorno nasca l' animale. Dice pure, che mettendo ne' gusci d' uova dell' escremento cavallino, e asinino insieme mescolato, in capo a tre giorni vi nascono de' vermi adattatissimo cibo per i nati pulcini.

Si legge, che in alcuni paesi ponendo le uova al Sole, avendole prima coperte di sottilissima piuma, nascano pure da esse dopo il determinato solito tempo i pulcini. Noi frattanto, mediante l' esperienze fatte, siamo certi, che nascono mettendo le uova nel letame di cavallo, che sia in fermentazione. Plinio ci aveva asficurati, che le uova situate nella paglia, ed esposte all' azione di un fuoco continovato, e debitamente rivoltate, felicemente nascevano. Una maniera tuttavolta più sicura, ad esempio degli Egiziani, molti anni sono fu sperimentata quì in Firenze alla Corte de' nostri Granduchi, e dipoi fu ripetuta a Livorno con ottimo successo dal Governatore allora di quel Porto il Marchese Carlo Ginori, la quale consisteva nel tener calde le uova in un Forno ordinario da Pane. La notizia di questo metodo venne a noi certamente dall' Egitto, o dalla Barberia, ne' quali luoghi una tal arte si praticava, e dove per l' esclusione de' pulcini dalle uova si risparmiavano le *Galline*. Modernamente poi il Sig. De Reaumur ha composto un trattato tutto su questo proposito, stampato a Parigi, al quale si rimettono tutti quelli, che intorno a questa cosa desiderano più circostanziate notizie.

Se mai a norma degli Egiziani volessimo far covare, e far nascere le uova, bisogna prendere una gran quantità di esse, accomodarle in alcune paniere, tramezzarle con finissime piume, in maniera che non si tocchino, e ricuoprirle ancora, se così piace, con della pollina, acciò il calore sia più facilmente ad esse tramandato, e conservato, e così aggiustate metterle in un Forno d' ordinaria struttura, essendo però necessario fino al ventesimo primo giorno, nel qual tempo sogliono, con rompere il guscio, nascere i pulcini, riscaldar di bel nuovo ogni giorno il Forno. Per quel tempo che si spende a riscaldare in tutte queste volte il Forno, le uova devono serbarsi in un qualche vicino stanzino ben custodite, e coperte

Testatur Democritus, quod si Gallinacei *excrementi portio in pulverem redacta in ovi medio cortice, antea infra tenuissimas plumas locato reponatur, indeque supra ipsum* Gallinae *ovum erectum ita aptetur, ut angustior eius pars in altum respiciat, ac novo undequaque superaddito fimo Gallinaceo, ut aequaliter vivificandum ovum foveatur, eademque hac de causa si secundo vel tertio quoque die manibus removeatur, intra vigesimam primam diem animal sive pullus orietur. Asserit insuper quod si in corticibus ovorum Equi vel Asini fimus bene mixtus reponatur, trium dierum spatio vermiculos enasci, qui pullis inde exortis aptissimum praebebunt alimentum.*

Diversis ex Auctorum colligimus libris Gallinarum *ova in nonnullis regionibus, scilicet valde Orientalibus vel Meridionalibus, exilissima tantum involuta pluma, & Solaribus radiis exposita intra supra indicatum dierum spatium felicissime excludi. Nos autem experientia duce certi sumus ab ovis in fimum equinum effervescentiam concipientem immissis pullos oriri posse. Affirmat verum Plinius ova pariter supra paleas reposita, atque ignis perenni actioni diu exposita, & revoluta feliciter germinare. Modum tamen faciliorem, tutioremque, Aegyptiorum exemplo, multis ab hinc annis hic Florentiae in Aula Magni Ducis expertus est aliquis, indeque Liburni experientiam ipsam optimo cum successu illius Portus quondam Gubernator Marchio Carolus Ginori aggressus est, iteravitque: qui modus in calefaciendis ovis pistorii furni ope consistit, atque ex voto succedit.*

Mos hic ab Aegypto, & Mauritania, aliisque Meridionalibus plagis, in quibus incolae ea utuntur methodo, & Gallinarum *auxilio pro excludendis pullis parcere solent, ad nos certo certius pervenit. Celeberrimus inde Dom. De Reaumur librum integrum circa hanc methodum Parisiis edidit, quem curiosis, ac plura de hac re scire cupientibus consulendum relinquimus. Si Aegyptiaca norma ova calefacere & fovere voluerimus, illa oportet magno numero, vimineis in cistis prius adcommodata, & tenuissima pluma circumdata, ne invicem se tangant, atque si placet Gallinacei stercoris pulvere consperſa ad calorem melius conciliandum ac retinendum, in vulgaris structurae Furnum immittere, singulisque diebus Furnum de novo calefacere, donec vigesima prima dies pervenerit, in qua ex fracta ovorum crusta pulli omnes emergere solent. Tempore autem quo Furnus novo igne fovetur, in tepido repositorio vel cubiculo ovorum cistae, cu-*

te con de' panni. A motivo di un minor incomodo, e di un utile anco maggiore si può costruire per tal faccenda un Fornello di lastra di ferro, o di rame, nel quale accomodate egualmente, che negli altri le uova in ceste, o paniere, come sopra si è detto, si potrà produrre il necessario grado di calore a forza di lampadi accese.

custodiendae sunt, straguliſque coopertae. Ratione quoque habita minoris incommodi maioriſque utilitatis, Furnunculus ex ferri, vel aeris lamina confici poteſt, & accenſarum lampadum ope, ovis ut ſupra in ciſtis adcommodatis, calefieri.

In hoc etiam Meleagridis genere varietates aliquas dari, nemo inficias ibit. Ab Albino T. II. pag. 24. depingitur Meleagridis ſpecies ſub nomine Gallinae Guineenſis, *quae pectore eſt candido, in reliquis vero ut noſtra Tabulae CCXXX. Hanc ipſam deſcribit Briſſonius T. I. pag.* 180. *appellatque* Meleagridem pectore albo, *quam ex Iamaica accepiſſe dicit. Marcgravius alias vidit e* Sierra Lyona *advectas, quarum collum circumligatum, ſeu circumvolutum erat linteamine quaſi membranaceo coloris cinerei caeruleſcentis. Caput tegebatur criſta obrotundata multiplici, pennis eleganter nigris conſtante. Punctula albicantia, quae per totum corporis ambitum diſtributa obſervabantur, quaſi umbra thalaſſina variegabantur.*

T. CCXXXIII. B. -- 18. --

GALLO di Monte minore, e volgarmente detto Gallo alpestre; Fagiano alpestre, e Fagiano nero. — *Lagopus; Urogallus minor* Klein. — *Tetro, ſeu Urogallus minor* Rai. — *Urogallus minor* Aldrov. Ionſt. Charleth. — *Tetrao minor* Friſch. — *Tetrao minor, ſeu Urogallus minor* Aldrovandi; *Grygallus minor; Tetrax; Phaſianus montanus; Gallus Betularum* Rzac. Auct. Hiſt. — *Tetrax Nemeſiano; Erythrontaon* Plinio; *Grygallus* Aldrovando & Geſnero; aliis *Urogallus minor, Tetrao minor* Rzac. Hiſt. — *Urogallus minor* Briſs. ſp. 2. — *Tetrao* [*Tetrix*] *pedibus hirſutis, cauda bifurcata remigibus ſecundariis baſin verſus albis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 2. — Gall. *Le Coq de Bruyeres a queve fourchue.* — Angl. *The Black game, or Grouſe, called by Turner the more-Hen.*

E' Senza dubbio della famiglia Gallinacea, sebbene sia silvestre, e conviene in molte cose con il *Gallo* alpestre maggiore, descritto e rappresentato alla Tav. CCXXXVI. e dopo di esso tra le specie salvatiche è il più grosso. Il rappresentato in questa Tavola fu portato d' Inghilterra, e trovasi tra le rupi de' più alti monti delle parti Settentrionali dell' Inghilterra, della Scozia, e ne' monti anco degli Svizzeri. Assai di rado si prende vivo, ma si piglia con il laccio, o coll' archibuso. Quando sia preso con il laccio, tosto si dibatte, e si stringe tanto la legatura di esso addosso, che presto muore, e si trova pendente e strangolato, come un malfattore alla forca.

Si trovano de' Cani così addestrati a questa specie di caccia, che perseguitano quest' Uccello fin tanto che non lo abbiano straccato, e ridotto sopra di un albero, dove lo puntano, e lo tengon fermo, e intimorito, fin tanto che sopraggiunto il Cacciatore ivi chiamato dall' abbaiare che fanno, non sia restato ucciso.

Ex Gallinaceo genere eſt ſine dubio, licet ſylveſtris ſit, multaque cum Urogallo *maiore infra deſcripto, & ſub Tab. CCXXXVI. depicto communia habet, atque poſt ipſum inter ſylveſtres* Gallinas *maximus eſt. Hic noſter ex Anglia delatus fuit, habitatque in montium altiorum latebris Regionum Angliae & Scotiae Septentrionalium, & in Alpibus etiam Helveticis. Raro vivus capitur, ſed laqueo, vel ſclopeti ictu interficitur. Laqueo, collo ita exagitato & adſtricto, ſemper ſuffocatur, & inſtar furis dependet.*

Canes nonnulli ita ad venationem hanc ita inſtituti inveniuntur, qui eumdem inſequuntur uſque ad arborem, ſupra quam ſe Avis reduxerit; ibidem autem Canis firmiter ſtat, Avem obſervando, illamque timore deprimendo, atque ſimul Herum latratu commonefaciendo, donec Aucupe illuc adducto Avis interempta fuerit.

T. CCXXXIV. B. -- 17. --

GALLO di monte minore, femmina. — *Tetrao ſive Urogallus minor, foemina.* — *Tetrao minor foemina, ſeu Urogallina minor*; *Gallina Betularum* Rzac. Auct. Hiſt. — *Urogallina minor* Schwenck. — Gall. *Coq de Bruyeres femelle.* — Angl. *Great-Hen.*

IL Celebre Conrado Gesnero, seguitato poi dall' Aldrovando, essendo stato d' opinione, che in veruno animale la femmina potesse aver la

CUm clariſſimus vir Conradus Geſnerus, quem Aldrovandus etiam ſequitur, in nullo animalium genere foeminam mari colorum varietate,

&

la preferenza ſul maſchio nella varietà e bellezza de' colori, reſtò ingannato ne' due *Galli di monte*, cioè a dire nel maggiore, e nel minore, avendo ſtimato ſpecie diverſe quelle che non erano altro che ſole diverſità di ſeſſo; dimodochè di ſole due ſpecie egli ne fece quattro. Gallo di monte maggiore maſchio lo diſſe *Urogallo maggiore*; la femmina *Grigallo maggiore*. L' Urogallo minore maſchio *Urogallo minore*; e la femmina *Grigallo minore*.

& pulchritudine anteire crediderit, praeſumpta hac opinione deceptus in utroque Urogallo, *ſeu* Tetraone, *maiore ſcilicet & minore diverſum ſexum pro diverſa ſpecie habuit, adeoque ex duabus ſpeciebus quatuor fecit: nimirum ex Urogallo maiore mare* Urogallum maiorem *fecit, ex foemina* Grygallum maiorem; *ex Urogallo vero minore mare* Urogallum minorem, *ex foemina* Grygallum minorem.

T. CCXXXV. B. -- 18. 1. ½

GALLO di monte della ſpecie minore diverſo; Ger. Ornith. — *Tetrao, ſive Urogallus minor alter*. Ger. Ornih.

FU queſto mandato al noſtro Sig. Marcheſe Gerini dalle Montagne del Veroneſe. Queſte ſpecie d' Uccelli amano i boſchi ombroſi e naſcoſti, perciò ſtanno nelle grotte, e naſcondigli più alpeſtri, o nelle più montuoſe e denſe ſelve, e ſoltanto eſcono, e volano a' prati, e ne' ſeminati, per ragione di procacciarſi il vitto, ma da queſti ultimi luoghi toſto, e con grandiſsima velocità trapaſſano.

Hic ex montibus Veronenſibus ad Marchionem Gerinium miſſus fuit. Huius generis Aves denſa & opaca loca petunt, ideo ſaepe in latebris montium, & cuniculis, vel denſiſſimis ſylvis degunt, e quibus cibum captandi cauſſa in ſata, & foenilia tantum exeunt, callidiſſimeque poſtrema haec loca excurrunt.

T. CCXXXVI. B. 1. 10. --

GALLO di monte, o alpeſtre, o di montagna, maggiore detto anco Fagiano nero, e Fagiano alpeſtre; propriamente Urogallo; e volgarmente Cedrone maſchio, o Gallo cedrone. — *Urogallus, ſive Tetrao maior; mas* Geſn. Aldrov. & Willugh. — *Urogallus maior* Ionſt. & Schwenck. — *Urogallus maior; Tetraon* Plinii, *Gallus Alpinus & Uragen dictus* Charlet. — *Tetrix Ariſtotelis* Ionſt. & Charlet.. — *Perdix longicauda, Lagopus nigricans, maculis cinereis* Barr. Ornith. — *Lagopus maximus* Klein. — *Urogallus maior* Briſs. ſp. 1. — *Tetrao (Urogallus) pedibus hirſutis, rectricibus exterioribus ſubbrevioribus, axillis albis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 1. — Gall. *Le Coq de Bruyeres, ou Coq de Limoges, & Faiſan bruyant*. — Angl. *Cock of the Wood; or of the Mountain; Mountain-Cock*.

COme le altre ſpecie di queſto genere abita nelle altiſſime rupi, o piuttoſto nelle ſelve più alpeſtri, e trovaſi nella Germania, e in altri Paeſi del Nort. Di queſta ſpecie ſe ne trova in qualche abbondanza nella boſcaglia di Tangermunda, nell' alto Brandenburgheſe, e ne' boſchi della Weſtfalia. Per teſtimonianza di Linneo ſe ne trova pure in Svezia, e per lo più nelle folte macchie de' luoghi paludoſi tra i Pini, e gli Abeti. Per aſſerzione dell' Ionſton ſe ne trova di quelli, che peſano 23. libbre Italiane. Vogliono, che la carne di queſto volatile ſia d' un ſapore sì buono, che niente ceda al *Fagiano*, e che ſembri unicamente prodotta per le menſe de' Sovrani.

UT reliquae huius generis varietates verſatur hic in altiſſimis montium iugis, aut altiſſimis potius ſylvis, & Germaniam, aliaque frigidiſſima & Septemtrionalia loca amat. Horum praecipue copia eſt in ſylva, quae a Tangera fluvio nomen habet in veteri Marchia, & in Weſtphaliae ſylvis. In Svecia etiam teſte Linnaeo reperitur, habitatque in ſylvis caeſpitoſis paludum inter Pinos & Abietes. Teſte Ionſtono reperiuntur huius ſpeciei nonnulli, qui libras viginti tres Italicas pendunt. Carnem huius tam grati ſaporis eſſe dicunt, ut ne Phaſiano quidem cedat, & Principum menſis tantummodo nata videatur,

Avem hanc voluptuoſiſſimus Caligula ſibi in Templo immolari voluit numini proprio, ut Svetonius tradit.

L' intemperantiſſimo Calligola al riferir di Svetonio, comandò che nel Tempio, e avanti il ſuo ſimulacro, foſſero ſacrificati di queſti Uccelli.

T. CCXXXVII. B. 1. 3. --

GALLO di monte maggiore, o Urogallo, femmina. — *Urogallus, ſive Tetrao maior, foemina*. — *Grygallus maior*

maior Geſn. & Ionſt. — *Urogallina maior* Schwenck. — *Tetrax Nemeſiani Poetae, ſeu Grygallus maior* Aldrov. — Gall. *Poule de Limoges, ou de Bruyeres; Faiſan Bruyant femelle.* — Angl. *Mountain-Hen.*

6. GALLO di monte della ſpecie minore inferiormente punteggiato di bianco, detto di Scozia. = *Aliud Galli ſylveſtris genus* Geſn. = *Gallus Scoticus ſylveſtris* Aldrov. = *Urogallus minor punctatus* Briſs. ſp. 2. variet. A. = *Tetrao* [*hybridus*] *cauda bifurca ſubtus albo punctata* Linn. Fn. Svec. edit. alt. 1761. = *Mas & foemina huius ſpeciei marem Tab. CCXXXIII. & foeminam Tab. CCXXXIV. aemulantur: in eo tantum ab iis differunt, quod mas, collo, pectore, alis, cruribuſque punctis rubicundis aſperſus ſit, & foemina leucophaea maculis nigris varia - Mas & foemina ſubtus maculis quibuſdam albis variegantur. Habitant in ſylvis Sveciae & Scotiae.* Linnaeus *ſpeciem hanc hybridam dicit, ſcilicet ex Tetraone* Urogallo, *Tab. CCXXVI. & Tetraone* Tetrice *Tab. CCXXIII. natam. Cauda inſtruitur bifurca,*

7. GALLO di monte della ſpecie minore, di coda lunga, del Canadà. = *Tetrao, ſive Urogallus minor, cauda longiore, Canadenſis.* = *Urogallus minor cauda longiore Canadenſis* Edw. cum optima icone foeminae Tom. III. Tab. 117. = *Tetrao* [*Phaſianellus*] *pedibus hirſutis, cauda cuneiformi, rectricibus tribus lateralibus albis* Linn. Syſt. Nat. ſp. 5.

8. GALLO di monte nereggiante con macchie bianche ſpecialmente dall' una e l' altra parte dell' occhio. = *Lagopus e fuſco & albo in inferiore corporis parte, e fuſco & nigro in ſuperiore, ad oculos duabus lineis albis varius* Klein. = *Tetrao* [*Canadenſis*] *pedibus hirſutis, rectricibus nigris apice fulvis, lituris duabus albis ad oculos* Linn. Syſt. Nat. ſp. 3. = *Urogallus maculatus Canadenſis* Edw. Tom. III. Tab. 118. cum optima icone maris; Tom. vero II. Tab. 71. foeminae. = *Foemina dicitur a* Briſſonio *Bonaſa Freti Hudſonis* ſp. 6. = *Mas vero craſſitie hanc paullulum ſuperat, ac coloribus nonnihil diſcrepat; colore enim magis diluto, vel caſtaneo ſuperne diſtinguitur, atque gula luteſcente donatur, quae partes in mare nigricantes ſunt. Aliae autem nonnullae ſpecies ad* Lagopum *referuntur,*

T. CCXXXVIII. B. - 12. 1.

RONCASO, altrimenti Lagopo, detto volgarmente Francolino di monte. — *Lagopus; aliis Attagen, vel Francolinus montanus.* — *Lagopus altera* Plinii, Willugh. Rai. Sibbald. Klein. — *Attagen* Geſn. Aldrov. Bell. Friſch. — *Attagen; Perdix Aſclepica quibuſdam* Ionſt. — *Attagen minor; Perdix Aſclepica minor* Charl. — *Attagen* Briſs. ſp. 9. — Gall. *Coq de marais; Francolin; La Gelinote hupée.* — Angl. *Red Game; Grey-Game; Gor-Cock; Moor-Cock.*

TAnto queſta ſpecie, che l' altra della Tav. CCXLI. o ſia la prima del T. III. ſi dicono volgarmente *Francolini*, quaſi *Franchi*, o vogliamo dire liberi, e immuni; poichè da' Principi è ſtato vietato al comune degli uomini il potergli ammazzare.

La femmina differiſce dal maſchio per eſſer d' un color roſſiccio più ſmorto, e in tutto il corpo ſpruzzata di macchie bianche. Queſta ſpecie appunto non ſo che troviſi appreſſo di noi, eſſendo piuttoſto particolare delle Regioni più fredde. Trovaſi in più parti della Germania, nella Francia, particolarmente nell' Overgna, ſu i Pirenei, e in Inghilterra, particolarmente negli altiſſimi monti della Provincia di Yorck, e del Principato di Galles:

La carne di queſt' Uccello è oltremodo ſtimata, facile a digerirſi, molto nutritiva, e ſana, onde tanto dagli antichi, che da' moderni è ſtata conſiderata tra i cibi di maggior pregio. Tutto quel di più, che ſi potrebbe aggiungere di queſto volatile, ſi vedrà riportato ſotto la citata Tav. CCXLI. dove ſi troverà una ſpecie d' Uccello, che aſſai poco differiſce da queſto, e che per le noſtre notizie aſſai nelle qualità conviene con queſto. Altra varietà pure ſi troverà più ſotto al num. 4.

* *SPecies haec, nec non alia ſub Tab. CCXLI. ſive prima Tomi III.* Francolini *a noſtris dictae ſunt, quaſi* Franci, *ideſt liberi, ſeu immunes, quod nempe vulgaribus eas venari interdictum, & libertas vivendi a Principibus conceſſa iis ſit.*

Foemina a mare diſcrepat in eo, quod rufo dilutiore tingatur, & maculis albis in univerſo corpore ſit variegata. Hac peculiari ſpecie Etruriam carere credo, cum revera Francolinus *hic* Lagopus *dictus, Septemtrionalia, ac frigidiſſima incolat loca. Reperitur certe in Gallia, praeſertim in Arvernienſibus montibus, & Pyraeneis, nec non in Angliae altiſſimis montibus Eboracenſibus, & Cambro Britannicis.*

Caro huius Avis laudatiſſima eſt, facilis concoctionis, nutrimenti multi, & optimi, unde primum dignitatis gradum, tum apud veteres, tum apud recentiores obtinuit. Reliqua, quae de hac Ave dici poſſunt, ſub indicata Tab. CCXLI. relata ſunt, ibidemque videantur, cum minimum inter ſe differant hae Aves, ipſaſque ferme, quo ad noſtram notitiam, obtineant qualitates. Varietas etiam alia videbitur infra ſub num 4.

T. CCXXXIX. B. -- 12. --

RONCASO, o LAGOPO, detto altrimenti Pernice alpestre, e volgarmente Otorno, — *Lagopus vulgaris, sive Lagopus varia.* — *Lagopus varia* Gesn. — *Lagopus simpliciter* Klein. — *Lagopus Avis* Aldrov. Willugh. Rai. & Sibbald. — *Tetrao* [*Lagopus*] *pedibus lanatis, remigibus albis, rectricibus nigris apice albis, intermediis totis albis* Linn. Syst. Nat. sp. 4. — Gal. *La Gelinote.*

VAria quest' Uccello nella grandezza, e nel colore, come più distintamente s' intenderà da quanto vien riportato sotto la Tavola susseguente. Sempre più piccolo trovasi nelle Alpi più fredde, e settentrionali, come infra le altre sono quelle della Lapponia, dove si ciba particolarmente di foglie e cime della Betula nana. Il Klein riporta l' anatomia di quest' Uccello stata data dal Robergio. Nel ventricolo di esso furono anco trovati non pochi sassuoli. Il maschio si distingue in Estate per esser più rossiccio di colore, e dall' alzare, secondo il Klein, le penne posteriori del capo in forma di ciuffo, o di cresta. Per questa ragione adunque il presente potrebbe essere Tavola antecedente il maschio.

VAriat magnitudine, & colore, ut ab insequentis Tabulae illustratione uberius intelligemus. In frigidioribus & ad Septemtrionem positis Alpibus, ut Lapponicae inter alias sunt, longe minor observatur, ibidemque victitat praesertim foliis, atque summitatibus Betulae nanae. Kleinius anatomen habet huius Avis a Robergio relatam. In huius ventriculo plurimi lapilli reperti fuerunt. Mas in Aestate distinguitur colore magis rufescente, atque capitis pennis posterioribus, quas in cristae formam referente Kleinio erigere solet. Hac de caussa Lagopus, *qui hic conspicitur, foemina forte est aestivis pennis vestita, Tabulae vero superioris mas.* la femmina veduta di Estate, e quello della

T. CCXL. B. -- 12. --

RONCASO, o LAGOPO bianco; altrimenti Pernice bianca di montagna. — *Lagopus alba, sive Perdix alba montana, vel petrosa dicta.* — *Perdix alba, sive Lagopus* Aldrov. & Ionst. — *Perdix alba, Lagopus* Charlet. — *Perdix alba, seu Perdix petrosa, Lagopus dicta* Rzac. — *Attagen candida* Bell. — *Lagopus* Briss. sp. 12. — Gall. *La Gelinote blanche; Perdris, ou Perdrix blanche.* Angl. *The white, and rough-footed Partridge.*

LAgopo fu chiamato quest' Uccello dalla parola Greca, che significa *piede di Lepre*, per avere i piedi simili ad essa, o come essa pelosi; e *Pernice di montagna*, dal ritrovarsi ne' luoghi alpestri. In Inverno è il *Roncaso* tanto bianco, che da' Cacciatori non si distingue sulla neve per altro, che dalla prominenza del suo corpo. Ama tanto il freddo, la neve, e il ghiaccio, che abbandona quei luoghi de' monti, dove le nevi si sogliono squagliare più presto, e si ritira in quelli, che sono a tramontana, e dove la neve, e il ghiaccio vi suole star tutto l' anno. Nell' Estate diventa di color bianco variato di scuro, o giallìccio, come si vede nella specie o varietà riportata dall' Edward, o si vede variegato di color castagno cupo, e di nero, come sono i da noi antecedentemente dimostrati. Quello dell' Edward differisce da tutti gli altri per avere i sopraccigli carnosi, rossi, e assai più rilevati e larghi, ed è probabilmente femmina. Trovasi questo genere di volatile nelle Regioni più fredde, come nella Lapponia, in Germania, negli Svizzeri, nella Savoia, e in alcuni de' più alti monti d' Italia ancora, come sono quelli del Veronese. I maschi distinguonsi dalle femmine per una striscia nera, che dalla base della parte superiore del becco si stende sopra gli occhi verso le orecchie, la quale striscia nera manca totalmente nelle femmine.

LAgopus *a pedibus Leporinis, sive villosis, dictus fuit;* Perdix *vero* petrosa, *quia in rupibus nidulatur. Tanti est candoris tempestate hyemali, ut a venatoribus hoc solo, quod nives superet, visu deprehendatur. Frigore, nive, & glacie ita delectatur, ut loca montium inferiora ubi liquantur nives facile relinquat, & soli aversa, niveque magis obducta loca prosequatur, in quibus nix, glacieque perennant. Aestate ex albo & fusco, vel flavicante variegatur coloribus, ut ab Edwardo in sua Freti Hudsonis specie, vel potius varietate, videre est; vel castaneo saturo & nigro, ut in antecedentibus nostris observatur. Qui ab Edwardo pingitur membrana carnea rubra supra oculis altiore, ac latiore, prae reliquis huius generis donatur, & foemina creditur. Habitat* Lagopus *in Septemtrionalibus praecipue regionibus, ut in Lapponia, Germania, Rhaetia, Sabaudia, & aliquibus Italiae altissimis montibus, ut Veronenses sunt. In maribus a superiore rostri mandibula ductus niger ultra oculos versus aures extenditur, qui in foeminis deest.*

Queſti Uccelli per la ſquiſitezza della loro carne ſi ſoglion dire quaſi univerſalmente *Pernici bianche*; ſiccome poi vivono nelle Alpi quaſi tutto l'anno coperte di neve, perciò la provida natura, in difeſa di tanta aſprezza di freddo, ha loro conceſſo i piedi riveſtiti di lanugine, e di piuma.

Aves hae propter carnis praeſtantiam Perdices albae *communiter appellantur. Cum autem in Alpibus maximam anni partem nivibus obtectis degant, provida ideo natura adverſus frigoris aſperitatem denſo lanuginis & plumarum tegmine earum pedes munivit.*

4. Roncaso, o Lagopo della ſpecie più comune, detto anco Bonaſia, e volgarmente Fagianella, Francolino, e Pernice alpeſtre. = *Lagopus Corylorum* Klein. = *Bonaſia* Linn. Syſt. Nat. edit. 6. = *Gallina Corylorum, ſeu Bonaſa Alberto dicta* Geſn. = *Gallina Corylorum* Aldrovand. Willugh. = *Attagen; Gallina ruſtica; Gallina Corylorum; Perdix montana; Perdix ſylveſtris* Rzac. *Bonaſa* Briſs. ſp. 3. = *Tetrao* [*Bonaſia*] *pedibus hirſutis, rectricibus cinereis punctis nigris, faſcia nigra, exceptis intermediis duabus* Linn. Syſt. Nat. ſp. 7. = *In Germania & circa Alpes invenitur, atque craſſitie Perdicem graecam circiter adaequat. Haec propria ſpecies dicenda videtur, quae vero ſub Tab. CCXXXVIII. & criſtata obſervatur, varietas huius.*

5. Roncaso, o Lagopo, detto de' Pirenei, e Pernice Damaſcena. = *Lagopus Pyrenaicus, ſive Perdix Damaſcena quorumdam.* = *Lagopus altera* Ionſt. = *Lagopus altera; Perdix Damaſcena* Bellon. Aldrov. = *Perdix Damaſcena* Bellonii, quam Aldrovandus *Lagopodem alteram Plinii exiſtimat* Willugh. & Raii. = *Perdix lutea, maculis caſtaneis, cauda duabus pennis nigris longiſſimis terminata* Barr. Ornith. = *Perdix Alcata, ſeu Filacotona* Aldrov. Klein. n. 5. = *Alchata* Geſn. = *Alchata, ſive Filacotona Arabum* Aldrov. & Ionſt. = *Alchata, ſive Filacotona* Aldrov. Charl. = *Oenas* Ariſtoteli; *Lagopus Bonaſa Pyrenaica* Briſs. ſp. 4. cum optima icone. = *Gazae Vinago* Geſn. = *Perdicem cineream craſſitie circiter aequat, olivaceo, flavicante, nigro, & rufo varia; ventre albo, torque duplici nigro; rectricibus duabus intermediis longiſſimis, apice ſtrictioribus; roſtro ac pedibus cinereis, unguibus nigris. Digiti in hac Ave appendices ſquamoſas breviſſimas obtinent, & pedes in parte anteriore tantum breviſſimis pennis albis veſtiuntur. Varietates dantur plus minus coloribus variegatae, nigro, & ſaturate cinereo tranſverſim ſtriatae, atque triplici torque nigro praeditae. Habitat haec Avis ſpecies in Syria, Arabia, atque Pyreneis montibus.* Alchata *nomen eſt Arabicum, ubi haec Avis frequens eſt teſte* Kleinio; *Monſpeſſulanis* Angeli *nomine venit a plumarum pulchritudine.*

6. Roncaso, o Lagopo di Scozia. *Lagopus Scoticus.* = *Gallus paluſtris* Geſn. Aldrov. & Ionſt. = *Bonaſa Scotica, ſive Lagopus Bonaſa Scotica* Briſs. ſp. 5. apud quem optima extat figura. = *Perdicem Graecam craſſitie ſuperat, ruffo & nigricante tranſverſim ſtriata; remigibus maioribus fuſcis, rectricibus quatuor utrinque extimis nigricantibus; roſtro nigricante; pedibus griſeis ad exortum uſque digitorum, in parte anteriore tantum, pennis coopertis cinereo-albis, unguibus griſeis. In Scotiam tantum obſervata Avis.*

7. Roncaso, o Lagopo del Canadà. = *Lagopus Canadenſis.* = *Lagopus Bonaſa Canadenſis* Briſs. ſp. 7. cum optimis maris, ac foeminae figuris. = *Perdici Graecae paullulum craſſitie cedit, ſuperne ex nigricante & cinereo fuſco tranſverſim ſtriata, remigibus maioribus fuſcis, exterius cineraſcente variis; pedibus ad exortum uſque digitorum pennis veſtitis cinereo-fuſcis, digitis, atque unguibus griſeis, roſtro nigro. Foemina mari magnitudine & craſſitie cedit, atque ſuperne rufo admixto, & roſtro fuſco diſtinguitur.*

8. Roncaso, o Lagopo maggiore del Canadà. *Lagopus Canadenſis maior.* = *Lagopus Bonaſa maior Canadenſis* Briſs. ſp. 8. cum accurata icone. = *Perdicem Graecam craſſitie paullulum antecellit, ſuperne ex fuſco, rufo, nigro, & cinereo, ſordide albo admixto varia; faſciculis pennarum nigrarum longiorum ſummis alis incumbentibus; remigibus maioribus fuſcis, exterius ſordide albo variis; pedibus pennis griſeo-fuſcis veſtitis; roſtro, digitis, atque unguibus fuſcis.*

9. Roncaso, o Lagopo d' America con doppio ciuffo dietro il capo. = *Lagopus Americanus a tergo colli dupliciter criſtatus. Lagopus, ſive Urogallus minor Americanus, fuſcus, in cervice plumis alas imitantibus* Klein. n. 7. & Catesb. cum accurata icone. *Lagopus Attagen Americana* Briſs. ſp. 10. = *Terrao* (*Cupido*) *pedibus hirſutis, alis ſuccenturiatis cervicalibus* Linn. Syſt. Nat. ſp. 6. = *Craſſitie tertia circiter parte Perdicem ſuperat; fuſco rufeſcens, lineis nigris & albicantibus tranſverſim ſtriatis; remigibus maioribus nigricantibus, exterius rufeſcente maculatis; rectricibus ſubtus nigris; roſtro fuſco, digitis flavis; pedes autem ad exortum uſque digitorum pennis pariter flavis veſtiuntur. Quod autem in hac Ave maxime ſingulare eſt, quodque ab aliis omnibus notis eam praecipue diſtinguit, ſunt duo pennarum faſciculi tres pollices longi parvulas alas ſatis bene imitantes in parte colli ſuperiore, prope caput, utrinque ſiti, & ad libitum Avis mobiles; Hos fere ſemper ſecundum colli longitudinem extenſos gerit, illoſque non erigit, niſi dum perturbatur. Unuſquiſque faſciculis quinque conſtat pennis, aliae aliis incumbentibus ad inſtar remigum, quaeque gradatim longitudine minuuntur, longiore penna introrſum ſita. Habitat ia America. Foemina iſtis caret pennarum faſciculis; in aliis omnibus mari ſimilis.*

10. Roncaso, o Lagopo col ciuffo di Penſilvania. = *Lagopus criſtatus Penſilvaniae.* = *Lagopus Attagen Penſilvaniae* Briſs. ſp. 11. = *Craſſitie Phaſiano cedit, Perdicem antecellit, ſuperne fuſco & nigro variegatus, inferne albus, aurantio admixto, pectore maculis lunatis nigris vario, rectricibus nigro tranſverſim ſtriatis apice, cinereis; roſtro colore ex corneo fuſco; pedibus plumeis albis pilorum aemulis veſtitis ad digitos uſque colore carneo tinctos. In ſummo capite pennas gerit ceteris longiores, quibus dum eas erigit Avis, criſta efficitur; pars pariter colli ſuperioris pennis regitur longioribus, quas more Gallorum erigit quandoque, & tunc torquem quodammodo efformant.*

FINIS TOMI SECUNDI.

Pappagallo col capo giallo, e rosso. —— Psittacus luteo ac rubro capite.

A Sua Emin.za il Sig.re Card.le Diacono di S. Chiesa, del Tit.lo di S.M.a ad Martires, Principe Dom.co Orsini d'Aragona, Duca di Gravina, Sig.re della Città di Muro, e delle Terre di Solofra, Vallata, Poggiorsino, Foresta, Roccagorga ec. Cav.re del Q. Ord.e di S. Gennaro Gra.de di Spagna di pr.ma Classe, Patri.o Rom.o Veneto, Napol.o ec. Protett.re dei Regni delle due Sicilie appo la S. Sede, Ministro Plenip.o di Sua M. Sicil.na alla Corte di Roma ec.

BLANK
PAGE

CXXII.

Pappagallo giallo, nelle ale, e nella coda verdeggiante. —— *Psittacus flavus, alis et cauda viridiscentibus.*

All'Ill.mo Sig.re Abate Domenico Augusto Bracci Socio della Reale Società degli Antiquarij di Londra, Accademico d'onore di Bologna ec.

BLANK
PAGE

CXXIII.

Pappagallo minore, o Parruchetto, verde, con il collare, o collana. — *Psittacus, Psittacula viridis torquata dictus.*

Al Reñmo P. Don Maſsimiliano Frescel. Dott.re di S.a Teologia, Exgenerale della Congregazione di Vallombrosa, e Abate nel Monastero della SS.ma Trinità in Firenze.

BLANK
PAGE

CXXIV.

Pappagallo, d: Parruchetto, con collana, di capo, e petto vinato. —— *Psittacus Psittacula dictus, torquatus, capite, et pectore vinaceo.*

Al Molto Reñdo Sig.re Francesco Zipoli Cappellano delle LL.AA.RR. in Toscana.

BLANK
PAGE

Pappagallo, d.° Parrucchetto d'America, tutto verde, di coda lunga. —— *Psittacus, Psittacula Americana dictus, totus viridis, macrourus.*

Al Molto Eccell.te Sig.re Franco Becherini Maestro di Chirurgia nel Regio Spedale di S.a M.a Nuova di Firenze.

BLANK
PAGE

Pappagallo d.° Parruchetto verde scuro, con la fronte rossiccia. —— *Psittacus Psittacula ex fusco viridis, fronte rubescente dictus.*

All'Eccell.^mo Sig.^re Dottore Sebastiano Pauli Medico Fisico di Lucca.

BLANK
PAGE

Pappagallo minore, o Parruchetto con la sommità del capo blù, e la fronte gialla. — Psittacus, Psittacula dictus, vertice cæruleo, fronte lutea.

Al Molto Reverendo Don Gio. Batista Rota Patrizio Veneto, e Priore Cassinense.

BLANK
PAGE

Pappagallo d.° Parrucchetto nero del Madagascar. — Psittacus Psittacula nigra Madagascariensis dictus

All'Ill.mo Sig.re Stefano de Lottinger Consigliere di S.M.I.,e Regia Apost.ca nel Consiglio Supremo di Milano

BLANK
PAGE

Pappagallo minore, o Parruchetto, dell'Indie Orientali col capo turchino. — Psittacus minor, sive Psittacula, Orientalis, capite ex cæruleo violaceo.

All'Ecc.mo Sig.re Dott.re Ortensio Scutellari Accademico Fiorentino.

BLANK
PAGE

CXXX.

Pappagallo minore, o sia Parrucchetto dell'Isola di Lucon. = Psittacus minor, sive Psittacula, Lucionensis.

All'Ill.mo Sig.re Francesco Bonvisi Senatore, e Patrizio Lucchese.

BLANK
PAGE

Pappagallo, D. Parruchetto, col ciuffo, del Messico. — Psittacus, Psittacula Mexicana cristata dictus.

All'Ill.mo Sig.re Giuseppe Antonio del Sacro Rom.no Imp.ro Conte di Strasoldo Graffenbrro ec. Ciambrlano delle LL. MM. II. RR. Aposta ec.

BLANK
PAGE

Pappagallo minore, o sia Parruchetto col capo rosso del Regno di Gingi. = Psittacus minor vel Psittacula Ginginiana erythrocephalus.

All'Ill.^ma Sig.^re Filippo Crengo Segret.^rio Regio d'Ambasciata della Sacra Religione Gerosolimit.^na appjo la S.^a Sede.

BLANK
PAGE

Pappagallo piccolissimo con la fronte, e gola rossa. —— Psittacus minimus fronte et gula rubris.

A Sua Eccll.za il Sig.re Conte Filippo Guicciardi Ciamberlano attuale, Tenente Maresciallo, e Comandante di Cremona al Servizio di Sua M.I., Reale, e Apostolica ec.

BLANK
PAGE

L'appagallo piccolissimo con la fronte, e groppa rossa. — *Psittacus minimus fronte ac dorso inferiore rubris.*

All'Eccll.mo Sig.re Bernardino Pupigliani Medico, e Accadem.co Fioren.no e uno dei Medici pratici ordinarj del Regio Spedale di S.a Maria Nuova.

BLANK
PAGE

Pappagallo minore verde, e cremisi d'America. —— *Psittacus minor e coccineo viridis Americanus.*

All'Ill.mo Sig.re Conte Pietro Verri Patrizio Milanese e Ciamberlano delle L.L. M.M. I.I. e R.R. ec.

BLANK
PAGE

Emeu, o Casuario. —— *Emeu, sive Eme, Casuarius alijs.*

All'Ill.mo Sig.re Cav.re Prior Mse Gino Clemente Capponi Nobil Patrizio Fior.no e Gran Conte Stabile dell'Ord.ne di S. Stefano ec.

BLANK
PAGE

CXXXVII.

Struzzo nero, o Struzzo della Libia. —— *Struthio niger; Struthio Camelus, sive Struthio Libicus.*

All'Ill.mo Sig.re Ignazio Pappagalli Patrizio Fior.no e Pistoiese Diretto.re per l'Appalto Generale delle Finanze di S.A.R. del Dipartimento di Pisa

BLANK
PAGE

Struzzo grigio, o cenerino. —— Struthio Camelus griseus, vel cinereus.

Al Molto Ecdl.te Sig.re Francesco Pini Profess.re di Chirurgia Socio dell'Accad.a
di Bottanica di Cortona, Accad.o Apatista, e P.A.

BLANK
PAGE

Struzzo bianco. —— Struthio Camelus albus.

Dd All'Eccell.mo Sig.re Dott.re Ranieri Lamberti Medico di Livorno.

BLANK
PAGE

Corvo, o Corvo maggiore. —— Corvus, vel Corvus major.

Al Sig.re Pietro Chiesa Livornese Costruttore di Vascelli per servizio di S.A.R.

BLANK
PAGE

Corvo reale bianco. —— Corvus albus.

All'Ill.mo Sig.re Gio Rudolfo di Valletraversa negli Svizzeri, Possess.re di un Copioso Museo di rarità naturali, e d'Arte, Accad.co di Londra, d'Upsala, e d'altre Accad.ie tanto degli Svizzeri, che Forestiere.

BLANK
PAGE

Corvo d'Alemagna ieri detto Krè. —— Corvus Germanicus vulgo Krè.

All'Ill.mo Sig.re Avvocato Baldasseroni Cancelliere della Sanità, e della Dogana di Livorno.

BLANK
PAGE

Corvo Imperiale. —— Corvus Calvus, seu Loripes.

All'Ill.mo Sig.re Antonio Quarantotto Cav.re Aureato, e Operaio del Duomo di Pisa.

BLANK
PAGE

Cornacchia. ——— Cornix Raj.

All.' Ill.mo Sig.re Cav.re Balì Francesco Roncioni Patrizio Pisano.

BLANK
PAGE

CXLV.

Cornacchia frugilega, volgarm.te Mulacchia. —— Cornix frugilega.

All'Eccll.mo Sig.re Dott.re Giuseppe M.a Sgazzi Pisano.

BLANK
PAGE

CXLVI.

Cornacchia detta Mulacchia nera. —— Cornix nigra; Monedula; Lupus. &.

All' Ill.mo Sig.re Lazzero Damiani Nobile Livornese.

BLANK
PAGE

CXLVII.

Cornacchia, o Mulacchia Scherzosa. —— Cornix altera, sive Monedula, Naturæ lusus.

All' Ill.^mo Sig.^re Conte Gio. Nerucci Patrizio Senese.

BLANK
PAGE

CXLVIII.

Cornacchia, o Mulacchia del capo di buona speranza. — *Cornix, sive Monedula capitis bonæ spei*

All'Ill.mo Sig.re Francesco Mei Timotei di Sinigaglia.

BLANK
PAGE

Coracia, o Corvo Corallino. ——— Coracias Aldrov.

All' Ill.mo Sig.re Conte Luca Gianini di Pergola.

BLANK
PAGE

Coracia col becco, e gambe di color carnicino. —— *Coracias rostro pedibusque carneo colore infectis.*

All' Ill.mo Sig.re Cav.re Giovanni Gabuccini di Fano.

BLANK
PAGE

Coracia col becco, e gambe nere. —— *Coraciàs rostro pedibusque nigris.*

Al Reñdiſs.^mo P. D. Antonio M.^a de Lugo Somasco Rettore del Collegio Clementino a Roma ec.

BLANK
PAGE

Coracia di Montagna. —— *Coracias Montana.*

All'Eccell.za Reñdiss.ma di Monsig.re Marco Cornaro Patrizio Veneto, Vescovo di Vicenza, molto versato nell'Istoria Naturale, e gran Mecenate degli Studiosi della medesima ec. ec.

BLANK
PAGE

Coracia cerulea. —— *Coracias cærulea.*

A Sua Eccell.za il Sig.re Ettone Thott Cav.re dell'Ord.ne dell'Elefante, Consigliere intimo di S.M. il Re di Danimarca, Gran Segretario della Cancelleria del Regno, Presidente dell'Università e della Società Reale delle Scienze di Coppenaghen ec. ec.

BLANK
PAGE

Coracia dell' Isole Filippine. —— *Coracias, sive Monedula Philippensis.*

Al M.R.P. Clemente Lampredi Lettor Giubbilato in Sacra Teologia e Provinciale de Minori Osservanti in Toscana.

BLANK
PAGE

Gazzera comune. —— Pica varia caudata.

All'Ill.mo Sig.re Barthes Sig.r di Marmorieres, incaricato degli affari di S.M. Cristianiss.ma appo il L.C. Elvetico, membro delle società economiche di Berna, Friburgo, Soletta, e Biena ec.ec.

BLANK
PAGE

Gazzera bianca. —— *Pica caudata alba.*

All'Ill.mo Sig.re Elia Bertrand Gentiluomo Svizzero d'Yverdon Consigliere intimo della Corte di Pollonia, e Membro di più Accademie d'Europa.

BLANK
PAGE

Gazzera minore di Bengala. —— Pica minor Bengalensis.

All'Ill.mo Sig.re Mõe Ab.te Antonio Niccolini Patrizio Fioren.no della Società Reale d'Inghilterra, Socio Bottanico, e di altre Accademie.

BLANK
PAGE

Pazzera Americana nera, e gialla. —— *Pica Americana luteo nigra varia.*

A Sua Eccell.za il Sig.re Don Federigo di Napoli, Barresi, Montaperto, Bellacera, e Bonfiglio, Principe di Resuttano, di Condrò, e di Monteleone, Duca di Campobello, e di Bassana, Sig.re della Città di Alessandria ec. Grande di Spagna ec. del Consiglio di S.M. Reale ec.

BLANK
PAGE

Passera Orientale. —— Pica Orientalis. Corvus Paradisi Linn.

All' Ill.mo Sig.re Gaetano Grifoni Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

Garrulo di Boemia. — Garrulus Bohemicus Gesn. et Aldrov.

All'Ill.mo Sig.re Mchē Cav.re Gino Capponi Ciamberlano delle LL.MM.II.e.RR.,
Generale Maggiore al servizio di S.A.R. il Serenissimo Arciduca Gran Duca
di Toscana, e Comandante del Corpo delle Guardie di Sanità ec. ec.

BLANK
PAGE

Ghiandaia comune. ——— *Pica glandaria vulgaris.*

All' Ill.mo Sig.re Mse Carlo Gerini Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

Ghiandaia bianca. —— Pica glandaria alba.

All'Ill.mo Sig.re Cavaliere Niccolò Ricciardi Serguidi Patrizio Fiorent.no

BLANK
PAGE

Ghiandaia Nucifraga, volgarm.te Nocciolaia. — Pica Nucifraga, Caryocatactes Willug.

All' Ill.mo Sig.re Domenico Moretti Custode dell' Argenteria di S.A.R. il Serenissimo Gran Duca di Toscana.

BLANK
PAGE

Ghiandaia marina. —— *Pica glandaria marina; Corvus Caryocatactes Linn.*

All'Ill.mo Sig.re Andrea Minerbetti Boni Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

Picchio verde. — Picus viridis Gesn.

All'Ill.mo e Clar.mo Sig.re Senator Balì Francesco Maria Buondelmonti Nobil Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

Picchio vario, volgarm.te Picchio Sarto. —— Picus varius ex albo, et nigro Gesn.

All'Ill.mo Sig.re Conte Cav.re Roberto Pandolfini Ciamberl.no delle LL. MM. II. RR. Apostol.che ec.

BLANK
PAGE

Picchio vario maggiore, volgarm.te Picchio Sarto maggiore. = Picus varius major Raj:

All' Ill.mo Sig.re Auditore Stefano Guerci.

BLANK
PAGE

CLXVIII.

Picchio vario maggiore con le penne del petto mutate. — *Picus varius major, pennis in pectore mutatis.*

All'Ill.mo Sig.re Mse Niccolò Guadagni Patrizio Fior. Mse di S. Locino, e Signore di Montepescali.

BLANK
PAGE

Picchio vario massimo volgarm.te Sarto massimo. — Picus varius maximus.

A Sua A. R. il Serenis.mo Infante di Spagna
Carlo Antonio Diego Principe d' Asturies. ec.ec.ec.

BLANK
PAGE

1. Picchio vario, o Sarto minore. ——— Picus varius minor.
2. Picchio vario, o Sarto minore bianco. ——— Picus varius minor albus.

1

2

A Sua Eccell.^va il Sig.^re Luigi Zenobio Conte del Sac.° Rom.° Imp.° Sig.^re e Possessore delle Giurisdiz.^ni d'Egna, Caldif, Salorno, Favogniа, e Koniksbergo ec.ec. Patrizio Veneto.

BLANK
PAGE

Picchio vario Indiano. —— Picus varius Indicus.

A Sua Eccell.za il Sig.re Francesco D'Iacinto de' Conti De La Tour En Voüvre Cav.re dell'Ord.ne di S. Stef.no Ciamberl.no delle LL. MM. II., e delle LL. AA. RR. Generale, e Capit.no Ten.te della Guardia Nobile di S. A. R. l'Arciduca Gran Duca di Toscana.

BLANK
PAGE

Picchio Corvo. ——— *Picus niger maximus. Raj.*

All'Ill.mo Sig.re Cav.re Priore Mse Ferdinando Ximenes d'Aragona Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

CLXXIII.

Picchio d'alto volo di Guinea. —— *Picus altivolans ex Guinea.*

All'Ill.ma Eccell.za il Sig.re D. Giovandomenico Maria Berio Patrizio Genovese Marchese di Salsa Sig.re della Città di Montemarone, e delle Terre di Vulturara, e di Parolisi &c.

BLANK
PAGE

Picchio nero col ciuffo di Caienna. —— *Picus niger Cayanensis cristatus. Briss.*

A Sua Reverenza il P. Don Gio. Benedetto Gamarra Davalos della Congreg.ne di S. Filippo Neri Nobile Patrizio Americano, e Profess.re di Filosofia nel Collegio Salesiano di S. Michele nella nuova Spagna.

BLANK
PAGE

CLXXV.

Picchio del Capo di buona Speranza. ——— Picus capitis bonæ Spei. Briss.

All' Ill.e Sig.r Cav.r Antonio Bonsignori Nobile Patriz.° Senese.

BLANK
PAGE

Picchio col capo, e collo rosso di Virginia = Picus capitis, colloque rubris Virginianus

Ill.^mo Sig.^re Marchese Andrea Tulaij di Belluno.

BLANK
PAGE

CLXXVII.

Picchio verde col capo grigio di Norvegia. — Picus viridis capite cinereo Norvegicus.

All' Ill.mo Sig.re Assessore Raffaello Mazzini.

BLANK
PAGE

Picchio maggiore variegato del Messico. —— *Picus varius Mexicanus maior.*

A Sua Eccellenza il Sig.re Iacopo Morosini Patrizio Veneto.

BLANK
PAGE

Picchio brizzolato di Bengala. —— *Picus Bengalensis maculatus.*

Al Sig.re Abate Giuseppe Domenico Filippo Ferretti.

BLANK
PAGE

Picchio con i piedi à trè dita. —— *Picus tridactylus albo nigroque varius. Linn.*

All'Ill.mo Sig.re Conte Abate Rinaldo da Rio Nobile Padovano.

BLANK
PAGE

Picchio Indiano in gran parte celeste. — *Pius Indicus magna ex parte caeruleus.*

All'Ill.mo Sig.re Mse Don Gio. Belisomi Ciamberl.e delle LL. MM. II., e Reali

BLANK
PAGE

Barbuto. —— Bucco. Briss.

All' Ill.mo Sig.re Abate Giuseppe Ganucci Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

1. *Barbuto di Caienna.* ——— *Bucco Cayanensis. Briss:*
2. *Barbuto di Caienna brizzolato.* ——— *Bucco Cayanensis nævius. Briss:*

A S. A. R. il Serenis:mo Infante di Spagna Don Gabbriello Antonio Gran Priore di Castiglia ec. ec. ec.

BLANK
PAGE

Galbula d.ª dai Brasiliani Iacamaciri. —— Galbula Brasiliensibus Iacamaciri.

All' Ill.mo e Clãmo Sig.re Senat.re Cav.re Prior Giulio Ranieri Orlandini Ciamb.no delle LL. MM. II. e RR. e delle LL. AA. RR. di Toscana.

BLANK
PAGE

Galbula di coda lunga del Surinam. —— *Galbula longicauda Surinamensis.*

All'Ill.mo Sig.re Don Federigo Ruccellai Patriz.° Fior.° Colonn.lo degl'Eserciti di S.M. Cattolica

BLANK
PAGE

Torcicollo altrove Collotorto, e Verticella. = Torquilla. Gesn. = Iynx Torquilla. Aldr.

Al Ill.mo e Mño Sig.re Can.co Lodrigo Zanchini da Castiglione Patriz.o Fior.
e Bolognese, Can.co della Metropol.a di Bologna, Dott.re Collegiato di Sacra Teologia,
Consultore di S. Ufizio, e Commiss.o Gente per la Santa Casa di Loreto in Bologna

BLANK
PAGE

CLXXXVII.

Curucuì del Braſile. —— *Trogon Braſiliensis viridiſ. Briſs:*

Alla Sig:ra Arcangiola Senigher Manetti

BLANK
PAGE

Curucuì cenerino di Caienna. — Trogon Cayanensis cinereus. Briss.

All' Ill.mo e Rmo Sig.re Ruberto Antinori Can.co della Metrop.na e Patriz.o Fiorent.

BLANK
PAGE

Curucù verde di Caienna. —— *Irogon Cayanensis viridis. Briss.*

All' Ill.mo Sig.re Marchese Luigi Capponi Patrizio Fiorentino.

BLANK
PAGE

Cortofago. Cortophagus. Briss.

All'Ill.mo Sig.re Conte Egidio Negri Nobile Vicentino.

BLANK
PAGE

Crotofago maggiore. ——— Crotophagus maior. Briss.

Al Reverend.mo P. Don Rodesindo Cateni Abate del Monastero degl' Angeli di Firenze, e Vicario in Toscana.

BLANK
PAGE

CLXXXXII.

Crotofago vario Indiano. —— Crotophagus varius Indicus.

Al Sig.re Francesco Bartolozzi Fiorentino Celebre Disegnatore, e Incisore in Rame.

BLANK
PAGE

1. Peciotto, altrimenti Picchio piccolo grigio. = Sitta, seu Picus minor cinereus.
2. Peciotto del Canadà. == Sitta Canadensis.

1

2

Alla Regia e Celeberrima Accademia Istorica di Madrid.

BLANK
PAGE

1. Peciotto altrimenti Picchio minimo celeste di Ceilan. = Sitta sive Picus minimus cæruleus Ceylanensis.
2. Peciotto, o Picchio minimo dell' Indie. = Sitta vel Picus minimus Indicus.

A Sua Eccell.za il Sig.re Marchese di Monte Reale Regio Consigliere nel Supremo, e Real Consiglio di Castiglia ec.

BLANK
PAGE

1. Cerzia cenerina altrimenti Picchio Paſserino. = Certhia griſea, ſeu Picus cinereus minimus.
2. Cerzia scura minore Indiana. = = Certhia fusca minor Indica.

1

2

All' Ill.mo Sig.re Marchese Carlo Gerini Patrizio Fiorentino
Ciamberlano delle LL. AA. RR.

BLANK
PAGE

1. Cerzia volgare maggiore altrimenti Picchio rampichino maggiore. = Certhia vulgaris maior.
2. Cerzia blù del Surinam. ——— Certhia Surinamensis caerulea.

1

2

All' Ill.mo Sig.re Conte, e Cav. Andrea Ondedei Patrizio Pesarese.

BLANK
PAGE

Cerzia muraiola, o Picchio muraiolo. ——— *Certhia muralis.*

All' Ill.mo e Rēmo Sig.re Don Garzia Samaniega Cav.re di S. Giacomo, Arcidiac.no della Metrop.na di Pamplona, Censore dell' Accad.a degli Arcadi, e nominato fra essi Calestano Megalopolitense.

BLANK
PAGE

1. *Cerzia minore Indiana, bianca, nera, e rossa.* — *Certhia minor ex albo niger, et rubro varia Indica.*
2. *Cerzia saura, e gialla d' America.* — *Certhia ex fusco et luteo varia Americana.*

All' Ill.^mo Sig.^re Marchese Luigi Sale Nobile di Vicenza.

BLANK
PAGE

1. *Cerzia minore dell' Isole Filippine.* ═══ *Certhia Philippensis minor.*
2. *Cerzia di color violetto del Senagal.* ═══ *Certhia Senagalensis violacea.*

1

2

All'Ill.mo Sig.re Conte, e Cav.re Orlando del Benino Malavolti Ciamb.no delle A.A. L.L. Q.Q. e attualm.te Presidente della R. Società Fisico Botanica Fiorent.no

BLANK
PAGE

1. *Cerzia dell' Isole Filippine porporina; maschio.* — *Certhia Philippensis purpurea mas.*
2. *Cerzia delle Filippine porporina; femmina.* — *Certhia Philippensis purpurea fœmina.*

All' Eccll.mo Sig.re Dott.re Giuseppe Sonsis Medico Cremonese, Accademico Onorario della Società R. Fisico-Botanica Fiorentina, siccome dell' Accad.a Bot.ca di Cortona, della Sacra Fiorent.na di quella degli Apatisti ec.

BLANK
PAGE

1. Cerzia di coda lunga del capo di buona speranza. = Certhia longicauda capitis bonæ spei.
2. Cerzia di coda lunga del Senegal. = Certhia longicauda Senegalensis.

All' Ill.mo Sig.re Dott.re Francesco Barbò Patrizio Cremonese.

BLANK
PAGE

1. Cerzia neraſtra del Braſile. —— Certhia Braſilienſis nigricans.
2. Cerzia porporina di Virginia. —— Certhia Virginiana purpurea.

All' Ill.mo, e Dendiſs.mo Sig.re il Sig.re Don Giuſeppe Gerenzani Patrizio Cremoneſe, e Canonico della Cattedrale di Cremona.

BLANK
PAGE

Tucano mangiapepe. ——— Tucana piperivora.

All' Ill.mo Sig.re Roberto Ramplaij Scozzese, Membro del Collegio di Medicina d' Edinburgo, e Accad.co Onorario della Società R. Fisico-Botanica Fior.no

BLANK
PAGE

Tucano del Braſile d.° Aracari. —— Tucana Aracari Braſilenſibus.

Al Reverendiſs.^mo P. Don Gio: Batta Lota Patrizio Veneto, e Abate Caſinenſe.

BLANK
PAGE

Ippupa volgarmente Bubbola. ——— Upupa Gesn. et Aldrov.

All' Ill.mo Sig.re Cav.re Alessandro Adami Patrizio Pistoiese,
Direttore delle Reali Finanze in Livorno.

BLANK
PAGE

Uppupa Americana gialla. ——— Upupa Americana lutea.

All' Ill.mo Sig.re il Sig.re Don Lorenzo Dieguez Senat.re della Città di Murcia, e Segret.rio della Regia Accad.a d'Istoria di Madrid.

BLANK
PAGE

CCVII.

Gallo comune. —— Gallus vulgaris, sive Gallus Gallinaceus

All' Ill.mo Sig.re il Sig.re Don Paolo Olavide Soprintendente
delle Fabbriche di S. M. Cattolica a Madrid.

BLANK
PAGE

Gallo con la creſta a paniera. — *Gallus Gallinaceus criſta in calathi modum efformata.*

All' Ill.^mo Sig.^re Dottore Giovanni Videmar Medico Milaneſe

BLANK
PAGE

Gallo Padovano. —— *Gallus Patavinus.*

All'Ill.mo Sig.re Girolamo Benassai Senatore, e Patrizio Lucchese.

BLANK
PAGE

Gallina Padovana barbuta. —— *Gallina Pataerina barbuta.*

All'Ill.mo e Dño Sig.re Marzio Micheli Can.co della Metropolitana, e Patrizio Lucchese.

BLANK
PAGE

Gallina detta la vergognosa. —— Gallina vereunda dicta.

All' Ill.mo e Dñndiss.mo Monsig.re Antonio Sbarra Patrizio Lucch.se
Cav.re della Sacra Milit.re Deliaione dei Santi Maurizio, e Lazzaro,
Cameriere segreto della Santità di Nostro Sig.re Papa Clemente XIII.

BLANK
PAGE

Gallo calzato. ——— Gallus pedibus hirsutis, sive pizomojis.

Al Ill.mo Sig.re Domenico Campofiorito Primo Ufiziale del Commissariato di Guerra di S. A. R.

BLANK
PAGE

Gallo cornuto. ——— *Gallus cornutus.*

All' Ill.mo Sig.re Conte Egidio Negri Nobile Vicentino.

BLANK
PAGE

Gallo nano. ——— *Gallus pumilio.*

Al Molto Reñdo Sig.re Giuseppe Leſsi Cappellano Fiorentino

BLANK
PAGE

Gallo ricciuto. —— *Gallus cincinnatus.*

All'Ill.mo Sig.re D. Filippo M.a Doffia Cav.re dell'Ord.ne di S. Stefano Patrizio Fior.no Colonn.lo del Regg.to Wallone di Borgogna al Servizio del Re delle due Sicilie.

BLANK
PAGE

Gallo scherzoso. — Gallus naturæ lusus.

Al Sig.re Domenico Bartolini.

BLANK
PAGE

Pavone maſchio. —— *Pavo cauda longa plumis uropygii pulcherrimis. Brow.*

A Sua Ecc.za il Sig.re Mse Giovanni Corsi Cav.re del S. Milit.re Ord.n di S. Stefano Ciamberl.no e Consigliere Intimo Attuale di Stato delle L.L. M.M. I.I. R.R. Apoſtolica, e Cacciatore Maggiore di S. A. R.

BLANK
PAGE

Pavone bianco. —— *Pavo albus. Gesn., et Aldrov.*

All'Ill.mo Sig.re Nicolò Richard de Lesse Provved.re dell'Ufizio del Sale della Città di Firenze.

BLANK
PAGE

Pavone della China maschio. —— Pavo Sinensis mas.

All'Ill.mo Sig.re Giacomo de Sauboin, Consigl.re Aulico di S. M. I. e R. Apostolica, Segretario di Gabinetto, e Tesoriere Intimo di S. A. R.

BLANK
PAGE

Pavone della China femmina. — Pavo Sinensis foemina.

All'Ill.mo Sig.re Dottor Girolamo Fedele Bonini Medico a Cesena

BLANK
PAGE

Pavone del Regno di Tibet. —— Pavo Tibetanus.

Al Sig.r Giovanni Fantastici eccellente Giojelliere Fiorentino.

BLANK
PAGE

Gallo Pavone volgarm.te Pollo d'India col ciuffo. —— Gallo - Pavo cristatus.

All'Ill.mo Sig.re Cav.re Vincenzio Vettori Patrizio Fioren.o Commendatore dell'Ordine Gerosolimitano, e Capitano nel Reggimento Real Toscano.

BLANK
PAGE

Gallo Pavone, o Pollo d'India bianco con macchie nere. = Gallo-Pavo albus maculis nigris conspersus.

All'Ill^mo Sig.re Dott.re Gio: Batista Borsieri Medico primario della Città di Faenza, e Socio Ocrario dell'Accademia Fisico-Botanica Fiorentina —,

BLANK
PAGE

CCXXIV.

Gallo Pavone, o Pollo d'India bianco con macchie bionde. — *Gallo-Pavo albus fulvo maculatus.*

All'Ill.mo Sig.re Carlo Fazzuoli Provved.re dell'Ufizio dei Fossi della Città di Pisa

BLANK
PAGE

Gallo Pavone, o Pollo d'India nero. —— Gallo Pavo niger.

All'Ill.mo Sig.re Aver.to Cosimo Puccini Lettore delle Istituzioni del Giur.to Civile, e Canonico, e degli Elementi della Geometria nella Real Paggeria, e Aver.te dei Rei del S. Ufizio di Toscana.

BLANK
PAGE

Pallo Pavone, o Pollo d'India nero con macchie bianche. = Gallo-Pavo niger.

All'Ill.mo Sig.re Conte Orlando Malavolti del Benino Patriz.o Fior.o Cav.e dell'Ord.e di S. Stefano, Ciamber.no delle L.L. M.M. I.I., e R. Apostolica, e delle L.L. A.A. Q.Q.

BLANK
PAGE

Gallo Pavone del Brasile. —— Gallo - Pavo Brasiliensis.

All'Ill.mo Sig.re Dott.re Carlo Allione Profess.re di Botanica nella Regia Univers.tà di Turino Accademico della Società Fisico-Botanica Fiorentina, e di altre di Europa

BLANK
PAGE

Mitu, ovvero Mutu del Braſile. —— Mitu, vel Mutu Braſilienſium. Willug.

A Sua Eccell.^za Donna Felice di Napoli, e Bonfiglio, Principeſſa di Resuttano, Condrò, e Monteleone.

BLANK
PAGE

Mituporanga. ——— *Mituporanga. Marcgr., et Raj.*

All'Ill.mo Sig.re Barone de Raye Signore di Breukelerveraert Cav.re Olandese ec.

BLANK
PAGE

Meleagride, o Gallina di Guinea. —— Meleagris, sive Gallina Guinea, vel Numidica.

All'Ill.mo e Rev.mo Sig.re Cav.re Giachino Giachini de' Conti Sandonnini Pubblico Profes.e di Sacri Canoni nell'Univers.tà di Pisa, e Canonico Penitenziere di quella Chiesa Primaziale.

BLANK
PAGE

Meleagride, o Gallina di Guinea bianca. — Meleagris, sive Gallina Guinea, vel Numidica alba.

All' Ill.mo Sig.re Andrea Bologhini Nobile di Cesena

BLANK
PAGE

CCXXXII.

Meleagride diversa d. Gallina d'Egitto. —— *Meleagris altera Gallina Ægyptiaca dicta.*

All' Ill.mo Sig.re Barone Francesco Ancaiani Nobile di Spoleti.

BLANK
PAGE

Gallo di Monte minore. = Tetrao, seu Urogallus minor, mas Raj. = Tetrao Tetrix. Linn.

Il Sig.re Giuseppe Bracci Giojelliere Fiorentino.

BLANK
PAGE

CCXXXIV.

Gallo di Monte minore femmina. —— *Tetrao, sive Urogallus minor fœmina. Raj.*

* *fig. 2. Correctio Tab.ae 198. fig. 2. est.*

All'Ill.mo Sig.re Martino Brunnich Profess.re d'Istoria naturale, e d'Agricoltura nell'Univers.tà di Coppenaghen Accad.co Onorario della Società Botanica Fiorèntina ec.

BLANK
PAGE

Gallo di Monte della ſpecie minore, diverſo. = *Tetrao, ſive Urogallus minor alter. Ger. Ornith.*

A Sua Eccll:za il Sig:re Cav:re de Breteuil Balì, Commend:re e gran Croce dell' Ordine di Malta, Priore Commend:rio del Regio Priorato d'Aumont, Ambaſciat:re Ord:ne della Relig:ria di Malta appo Sua Sant:tà eſente delle Guardie del Corpo di S. M. Criſtian:ma Maeſtro di Campo di Cavall:ria ec.

BLANK
PAGE

Gallo di Monte, propriamente d.° Urogallo, e volgarm.te Cedrone, maschio. = Urogallus, sive Tetrao major, mas.

All'Ill.mo Sig.re Dott.re Don Giuseppe Bovi Medico primario di Scilla, Medico Ordinario dei Principi di Scilla, e Accademico Fiorentino.

BLANK
PAGE

Gallo di Monte, o Urogallo maggiore femmina. —— *Urogallus, sive Tetrao maior foemina.*

Al Sig.re Giacomo Veroli Professore di Musica all' Attual Servizio di S. A. R. il Gran-Duca di Toscana ec. ec. ec.

BLANK
PAGE

Roncaso, detto comunemente Francolino di Monte = Lagopus, alijs Attagen, vel Francolinus Montanus.

All' Ill.mo Sig.re Carlo Rossi Segretario del Consolato di Mare

BLANK
PAGE

Roncaso, o Lagopo d'anco altrimenti Pernice alpestre. = Lagopus vulgaris, sive Lagopus varia.

All'Eccll.mo Sig.re Dott.re Franco Pagnini Socio dell'Accad.a Botanica Fioren.na, e Medico della Comunità, e Paese di Bientina.

BLANK
PAGE

CCXXXX.

Roncasso, o Lagopo bianco. —— Lagopus alba.

All'Ill.mo Sig.re Mse Giuseppe Bonifazio Locattelli Orsini Nobile di Cesena, Spoleti, e Ancona, Ciamb.no delle LL. MM. II. QQ. Aposta. Tesoriere dell' Umbria ec.

BLANK
PAGE